

Hướng dẫn làm bài thi lý thuyết Sản Phụ khoa, chương trình năm thứ tư, hệ chính qui dài hạn.

Đây là một bài lượng giá cuối kỳ dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, tổ lớp, ngày thi, mã số sinh viên và mã đề thi bằng bút mực vào các vị trí tương ứng trên phiếu làm bài. Mã số sinh viên là mã số đã được ban quản lý đào tạo cấp cho sinh viên, dùng cho tất cả các kỳ thi diễn ra suốt 6 năm học. Mã đề là mã số được thể hiện trên đầu trang.
2. Dùng bút chì tô mã số sinh viên và mã đề vào các vòng tròn tương ứng.
3. Đề thi gồm 24 câu hỏi về nội kiến thức đã học trong 12 chủ đề, và 12 tình huống, mỗi tình huống gồm 3 câu nhỏ. Phần đầu chung của mỗi tình huống được dùng chung cho tất cả các câu nhỏ thuộc tình huống đó. Mỗi câu nhỏ trong tình huống sẽ có những chi tiết riêng, được dùng riêng cho câu nhỏ đó. Thời gian làm bài là 60 phút.
4. Thí sinh sẽ phải chọn một câu trả lời duy nhất cho mỗi câu hỏi. Thí sinh dùng bút chì để tô đen tròn hình tròn tương ứng với lựa chọn của mình. Câu trả lời không tô bất cứ lựa chọn nào hoặc tô nhiều hơn một lựa chọn là các câu trả lời không hợp lệ, và do đó sẽ không được chấm điểm.

Mong các thí sinh lưu ý thực hiện tốt. Cảm ơn sự hợp tác của các thí sinh.

Giáo vụ bộ môn Sản Phụ khoa.

MÃ ĐỀ THI: 411

PHẦN I: LÝ THUYẾT (GỢI NHỚ VÀ HIỂU)

1. Trong chu kỳ buồng trứng, cơ chế nào đảm bảo việc chọn lọc được một noãn nang vượt trội? Chọn một câu đúng
☒ a. Feed-back thứ nhất của estradiol
☐ b. Feed-back thứ nhì của estradiol
☐ c. Cả hai feed-back của estradiol
☐ d. Feed-back của progesterone
2. Trong quá trình làm tổ, hiện tượng nào đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài đời sống hoàng thể? Chọn một câu đúng
☐ a. Đối thoại hoá học giữa phôi và nội mạc tử cung
☐ b. Đáp ứng miễn dịch tế bào ở nội mạc tử cung
☒ c. Hội bào nuôi xâm nhập, phá vỡ mạch máu màng rụng
☐ d. Sự hiện diện của progesterone ở nồng độ cao cần thiết
3. Ở đối tượng có nguy cơ nền tảng thấp, khảo sát nào là cần bản nhất để tầm soát lệch bội ở tam cá nguyệt I? Chọn một câu đúng
☐ a. Chính bản thân nguy cơ nền tảng
☒ b. Nồng độ β -hCG tự do và PAPP-A
☐ c. Độ dày của khoảng thấu âm sau gáy
☐ d. Mảnh vỡ DNA nhau thai ngoài tử bào
4. Khi test tầm soát dương tính, test nào là tiêu chuẩn vàng cho phép kết luận lệch bội ở bào thai? Chọn một câu đúng
☐ a. Mảnh vỡ DNA nhau thai ngoài tử bào
☐ b. Giải trình tự gen của mẫu sinh thiết
☐ c. Lai huỳnh quang tại chỗ mẫu sinh thiết
☒ d. Nuôi cấy tế bào karyotype mẫu sinh thiết
5. Khi có xuất huyết 3 tháng đầu thai kỳ, khái niệm ngưỡng phân định β -hCG được thể hiện ra sao? Chọn một câu đúng
☐ a. Nồng độ của β -hCG sau 48 giờ phải đạt một ngưỡng tối thiểu, thường là gấp đôi ($\times 2$)
☐ b. Là ngưỡng tối thiểu mà nồng độ β -hCG buộc phải đạt được so với tuổi thai đã biết
☒ c. Là ngưỡng tối thiểu mà nồng độ β -hCG buộc phải đạt được so với hình ảnh siêu âm đã có
☐ d. Hình ảnh siêu âm buộc phải thấy khi nồng độ β -hCG đã vượt một ngưỡng tối thiểu định trước
6. Để theo dõi một trường hợp thai trong tử cung nghi là trứng không phôi, khảo sát nào là quan trọng nhất? Chọn một câu đúng
☐ a. Định lượng β -hCG một lần và đối chiếu với hình ảnh siêu âm hiện tại
☐ b. Định lượng β -hCG nhiều lần và đối chiếu các kết quả với nhau
☒ c. Siêu âm một lần và đối chiếu với các kết quả β -hCG đã có
☐ d. Siêu âm nhiều lần và đối chiếu các kết quả siêu âm với nhau
7. Đem giai đoạn hoạt động của biểu đồ Friedman chồng lên sản đồ WHO 1993, bạn ghi nhận điều gì? Chọn một câu đúng
☒ a. Phần lớn biểu đồ Friedman nằm ở bên trái đường báo động của sản đồ WHO 1993
☐ b. Phần lớn biểu đồ Friedman nằm trùng với đường báo động của sản đồ WHO 1993
☐ c. Phần lớn biểu đồ Friedman nằm ở bên phải đường báo động của sản đồ WHO 1993
☐ d. Phần đầu của biểu đồ Friedman ở bên phải, phần sau ở bên trái đường báo động của sản đồ WHO 1993

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN SẢN PHỤ KHOA
Học kỳ I, niên khóa 2015-2016, khóa ngày 16/01/2016

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y - BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA

8. Chuyển dạ nguy cơ thấp, không làm gây tê giảm đau, nên theo dõi tình trạng bằng cách nào? Chọn một câu đúng
- Nghe tim thai bằng Doppler, gián đoạn. Nghe thường xuyên hơn khi đã vào giai đoạn hoạt động
 - Thực hiện monitoring thường qui đầu chuyển dạ. Chọn cách theo dõi tiếp tục theo kết quả đầu tiên
 - Thực hiện monitoring sản khoa, gián đoạn. Monitoring thường xuyên hơn khi đã vào giai đoạn hoạt động
 - Thực hiện monitoring sản khoa, liên tục trong suốt thời gian chuyển dạ
9. Trong thai kỳ nguy cơ thấp, khảo sát nào được xem là biện pháp tầm soát sơ cấp bất thường sức khỏe thai? Chọn một câu đúng
- Đếm cử động thai
 - Non-stress test
 - Siêu âm đo chỉ số đôi
 - Velocimetry Doppler
10. Trong thai kỳ nguy cơ thấp, thực hiện non-stress test kết quả không an tâm làm gì trước tiên? Chọn một câu đúng
- Thực hiện lại non-stress test
 - Thực hiện thêm siêu âm
 - Thực hiện velocimetry Doppler
 - Thực hiện contraction stress test
11. Chọn test nào để chẩn đoán khi nghi có đái tháo đường thai kỳ ở một thai phụ đang ở tuần thứ 29? Chọn một test phù hợp
- Đường huyết đói và sau ăn 2 giờ
 - Test dung nạp đường huyết 50 gram
 - Test dung nạp đường huyết 75 gram
 - Test dung nạp đường huyết 100 gram
12. Khi đã xác định có đái tháo đường thai kỳ, biện pháp điều trị nào là quan trọng nhất? Chọn một câu đúng
- Giám khẩu phần glucose hằng ngày
 - Điều trị nội khoa bằng tiết chế
 - Chất tăng nhạy insulin đường uống
 - Insuline phối hợp thường và chậm
13. Các hỗn loạn dẫn đến phát sinh tiền sản giật bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Chọn một câu đúng
- Rất sớm trong thai kỳ, ngay từ thời điểm xảy ra sự làm tổ của trứng thụ tinh
 - Trong ba tháng đầu thai kỳ, khi là nhau đã được hình thành đầy đủ
 - Sau đợt xâm nhập thứ nhì của tế bào nuôi, vào thứ tuần 20 của thai kỳ
 - Thay đổi. Thường là khoảng vài tuần trước triệu chứng lâm sàng đầu tiên
14. Chỉ báo có ý nghĩa thực hành quan trọng nhất trong xử lý và tiên lượng tiền sản giật là chỉ báo nào? Chọn một câu đúng
- Trị số huyết áp
 - Tình trạng đàm niệu
 - Tình trạng tăng trưởng bào thai
 - Các dấu hiệu của tình trạng nặng
15. Đái tháo đường xuất hiện sớm trong 3 tháng đầu thai kỳ thường liên quan đến tình trạng nào? Chọn một câu đúng
- Đái tháo đường thai kỳ
 - Viêm các màng ối
 - Dị tật bào thai
 - Nhiễm trùng bào thai: rubella, CMV...
16. Khi có dấu hiệu tích đối xuất hiện rất muộn gần ngày dự sinh, bạn làm gì trước tiên? Chọn một câu đúng
- Non-stress test
 - Contraction stress test
 - Nitrazine test
 - Velocimetry Doppler
17. Được chất nào được chọn như biện pháp đầu tay trong dự phòng và điều trị bằng huyết sau sanh? Chọn một câu đúng
- Oxytocin
 - Ergot alkaloid
 - Prostaglandin E₁
 - Prostaglandine E₂
18. Khi đã nghĩ đến có chuyển dạ tắc nghẽn, bạn quan tâm và lo lắng nhất đến dấu hiệu nào? Chọn một câu đúng
- Tình trạng xoá m ở cửa cổ tử cung

ĐẠI HỌC Y
KHOA Y - B

- Vị trí
 - Biến
 - Các c
19. Khi đang...
- Mạch
 - Huyết
 - Hema
 - Nồng
20. Bản chất c...
- Tăng t
 - Giảm t
 - Tiểu s
 - Kết hợp
21. Lợi ích lớn...
- Giảm n
 - Giảm n
 - Giảm n
 - Giảm n
22. Nguyên nhân...
- Bức xạ
 - Bay hơi
 - Truyền t
 - Khuếch
23. Vàng da do s...
- Thời đi
 - Mức độ
 - Khả năng
 - Đáp ứng
24. Kháng sinh n...
- Metronid
 - Quinolon
 - Aminogly
 - Sulfamide
- PHẦN II: CÂU H
- TÌNH HUỐNG 1:
- Bà A. 34 tuổi, PAR...
- sanh đến nay, do v...
- bạo cao su. Từ vài...
- thường lần cuối các...
- bình thường, mặt độ...
25. Trong trường h...
- Định lượng
 - Định lượng
 - Định lượng
 - Siêu âm gre
26. Kết quả khảo sá...
- thường, nhưng n...
- thường. Định lượ...
- nhận nội mạc tử...
- kinh? Chọn một...
- Vị vùng hạ d

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y - BỘ MÔN PHỤ SẢN

ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN SẢN PHỤ KH
Học kỳ I, niên khóa 2015-2016, khóa ngày 16.01.20

- b. Vị trí và tính chất của ngôi thai
(c) Biến động của tim thai trên EFM
d. Các đặc tính của của cơn co tử cung
19. Khi đang bù thể tích trong băng huyết sau sanh, chỉ báo nào là trung thành nhất về hiệu quả hồi sức? Chọn một câu đúng
a. Mạch
b. Huyết áp
c. Hematocrite
(d) Nồng độ hemoglobin
20. Bản chất của rối loạn đông máu trong nhau bong non là gì? Chọn một câu đúng
a. Tăng tiêu thụ yếu tố đông máu thứ phát
b. Giảm sản xuất yếu tố đông máu
c. Tiêu sợi huyết nguyên phát
(d) Kết hợp cả ba tình trạng trên
21. Lợi ích lớn nhất của việc khuyến sản phụ hậu sản bình thường nên vận động sớm là gì? Chọn một câu đúng
(a) Giảm nguy cơ xảy ra bí tiểu
b. Giảm nguy cơ xảy ra nhiễm trùng
(c) Giảm nguy cơ xảy ra tắc mạch
d. Giảm nguy cơ xảy ra liệt ruột
22. Nguyên nhân quan trọng nhất làm trẻ sơ sinh vừa sanh xong bị hạ thân nhiệt là gì? Chọn một câu đúng
a. Bức xạ
b. Bay hơi
c. Truyền nhiệt
(d) Khuếch tán
23. Vàng da do sữa mẹ và vàng da do cách thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ khác nhau ở điểm nào? Chọn một câu đúng
a. Thời điểm xuất hiện: vàng da do cách thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ xảy ra sớm. Vàng da do sữa mẹ xảy ra muộn hơn
b. Mức độ vàng da: vàng da do cách thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ thường nhẹ. Vàng da do sữa mẹ thường nặng hơn
c. Khả năng xảy ra biến chứng bệnh não do bilirubin thường cao trong trường hợp thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ sai
(d) Đáp ứng với quang trị liệu: vàng da do sữa mẹ chỉ hết nếu ngưng sữa mẹ. Vàng da do cách nuôi nhay với quang trị liệu
24. Kháng sinh nào có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh nếu mẹ dùng khi đang cho con bú? Chọn một câu đúng
a. Metronidazole
b. Quinolone
(c) Aminoglycoside
d. Sulfamide

PHẦN II: CÂU HỎI DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CONTEXT-BASED MCQs)

TÌNH HUỐNG 1: MẮT KINH (dùng chung cho các câu từ câu 25 đến câu 27)

Bà A. 34 tuổi, PARA 3002, ^{30C9} con nhỏ 5 tuổi, sanh thường. Trong lần mang thai thứ nhì, bà ta mắc đái tháo đường thai kỳ. Từ sau sanh đến nay, do vòng kính trở nên không đều 30-40 ngày, nên bà ta phải tránh thai bằng cách xuất tinh ngoài âm đạo hay dùng bao cao su. Từ vài tháng nay, bà ta thấy chu kỳ càng lúc càng không đều. Hôm nay bà đến khám vì mắt kính. Lân có kính bình thường lần cuối cách nay gần 2 tháng. Khám lâm sàng ghi nhận chất nhầy cổ tử cung (trong, loãng, nhiều và dài; từ cung kích thước bình thường, mật độ chắc, di động bình thường. 2 phần phụ không sờ chạm.

25. Trong trường hợp này, khảo sát nào là khảo sát phải được thực hiện trước tiên? Chọn một câu đúng
(a) Định lượng nồng độ hormone protein yên và steroid sinh dục
b. Định lượng nồng độ Anti-Mullerian hormone và Inhibin B
(c) Định lượng nồng độ hormone human Chorionic Gonadotropin
(d) Siêu âm grey-scale phụ khoa thực hiện qua đường âm đạo
26. Kết quả khảo sát cho thấy nồng độ của các hormone protein tuyến yên trong giới hạn bình thường, nồng độ estradiol bình thường, nhưng nồng độ của progesterone = 0, Anti-Mullerian Hormone cao nhẹ, trong khi đó Inhibin B trong giới hạn bình thường. Định lượng human Chorionic Gonadotropin < 0.1 mIU/ml. Siêu âm grey scale phụ khoa thực hiện qua đường âm đạo ghi nhận nội mạc tử cung dày 12mm, trên hai buồng trứng có rất nhiều nang nang nhỏ, d # 10mm. Vì sao bà A. không có kinh? Chọn một câu đúng
a. Vì vùng hạ đồi của bà A. không phóng thích xung GnRH
b. A. không phóng thích xung GnRH

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

- b. Vì bà A. có khối u tuyến yên ức chế tiết gonadotropin
c. Vì bà A. không có phóng noãn, không liên quan đến trục /
d. Vì nội mạc tử cung của bà A. không tiếp nhận được steroid
27. Bà A. rất lo vì không có kinh. Bạn sẽ làm gì để cho bà A. có kinh lại ít nhất một lần sau lần khám này? Chọn một câu đúng
- a. Cho bà A. dùng đồng vận của GnRH
b. Cho bà A. dùng các gonadotropin
c. Cho bà A. dùng progesterone
d. Cho bà A. dùng estrogen

TÌNH HUỐNG 2: TÀM SOÁT LỆCH BỘI Ở TAM CẢ NGUYỆT ĐẦU (dùng chung cho các câu từ câu 28 đến câu 30)

Bà E. 45 tuổi, PARA 0000, có thai lần đầu sau khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm bằng noãn từ một người hiến trứng là em ruột của bà ta. Các dữ kiện lâm sàng và hình ảnh không định bà E. đang có thai ở tuần lễ vô kinh thứ 12. Hôm nay bà E. đi khám thai định kỳ cuối tam cá nguyệt thứ nhất. Tiền sử gia đình của bà E. không ghi nhận gì đặc biệt về phương diện lệch bội hay dị tật ở các thành viên khác. Siêu âm cho kết quả đơn thai sống trong tử cung, với các số liệu sinh trắc lần lượt là BPD 19mm, CRL 48mm, tương hợp với tuổi thai 11 tuần vô kinh. Khảo sát cũng ghi nhận độ dày khoảng thấu âm sau gáy (NT) là 1.1mm.

28. Dựa trên dữ kiện đã có, bạn kết luận như thế nào về nguy cơ nền tảng xảy ra lệch bội ở bà E.? Chọn một kết luận đúng

- a. Không đủ dữ kiện xác định nguy cơ nền tảng /
b. Nguy cơ nền tảng xảy ra lệch bội là cao /
c. Nguy cơ nền tảng xảy ra lệch bội là trung gian
d. Nguy cơ nền tảng xảy ra lệch bội là thấp

29. Double-test thực hiện sau đó cho nguy cơ tính toán với T₂₁ là 1:2. Bạn cần làm gì? Chọn một kết luận đúng
- a. Kiểm tra lại các thông tin đã được nhập vào chương trình chạy kết quả double-test và chạy lại với thông tin đã chỉnh /
b. Lấy mẫu máu mới và chạy lại chương trình chạy kết quả double-test với các thông tin mới có về mẫu máu lấy lại
c. Thực hiện lại siêu âm NT và chạy lại chương trình chạy kết quả double-test với các thông tin mới có về NT đo lại
d. Lấy mẫu máu mới, thực hiện lại siêu âm NT và chạy lại chương trình chạy kết quả double-test với thông tin mới có

30. Sau điều chỉnh, chạy lại chương trình double-test cho nguy cơ huyết thanh 1:252. Bạn làm gì? Chọn một phương án thích hợp
- a. Kết quả là an toàn. Tôi không thực hiện gì thêm
b. Tôi sẽ cho thực hiện ngay khảo sát cell-free DNA
c. Tôi sẽ chờ để thực hiện Triple-test và soft-markers
d. Tôi sẽ thực hiện test xâm lấn để có được chẩn đoán

TÌNH HUỐNG 3: PHÁT HIỆN CÓ THAI BẰNG TEST NHANH β -hCG (dùng chung cho các câu từ câu 31 đến câu 33)

Bà C. 24 tuổi, PARA 0000. Trước nay bà C. có vòng kinh không đều, 28-60 ngày. Đúng 2 tháng trước, bà C. thấy ra máu kinh và đặc tính giống như các lần hành kinh bình thường khác. 2 tuần trước, bà C. có thử test nhanh định tính β -hCG nước tiểu và có giác buồn nôn và nôn, với kết quả dương tính. Hôm nay, bà C. được cho thực hiện siêu âm, với kết quả tử cung mang thai, lòng tử cung có hình ảnh của túi thai, với GS = 5mm, chưa thấy yolk sac và phôi thai. Đặt mỏ vịt thấy âm đạo sạch, không ra huyết từ tử cung. Khám âm đạo ghi nhận tử cung to tương đương với tử cung mang thai 5 tuần, mặt độ mềm, eo tử cung mềm, 2 phần không sờ thấy.

31. Bằng các dữ kiện đã có, hãy định tuổi thai cho bà C.? Chọn một câu đúng

- a. Tuổi thai hiện tại là 5 tuần vô kinh
b. Tuổi thai hiện tại là 6 tuần vô kinh
c. Tuổi thai hiện tại là 8 tuần vô kinh
d. Không đủ dữ kiện để định tuổi thai

32. Tình trạng thai của bà C. hiện tại ra sao? Chọn một câu đúng

- a. Các dấu hiệu đã có gợi ý khả năng thai kỳ đang tiến triển bình thường
b. Có đầy đủ dữ kiện xác định thai kỳ đang tiến triển hoàn toàn bình thường
c. Các dấu hiệu đã có gợi ý khả năng của thai nghén thất bại sớm
d. Có đầy đủ dữ kiện xác định chắc chắn thai nghén thất bại sớm

33. Bạn cần làm thêm khảo sát nào để giúp bạn có quyết định cách xử trí? Chọn một câu đúng

- a. Định lượng β -hCG ngay, một lần rồi so sánh với kết quả siêu âm đã có
b. Định lượng β -hCG nhiều lần, cách nhau 48 giờ, so sánh tiến triển β -hCG
c. Siêu âm lại một hay nhiều lần, không cần thực hiện định lượng β -hCG

TÌNH HUỐNG 4:

Cho bảng ghi EFM

34. Hãy phân loại

- a. Loại I
b. Loại II
c. Loại III
d. Không đủ

35. Bảng ghi thể hiện

- a. Chèn ép trẻ
b. Chèn ép trẻ
c. Thiếu oxy
d. Toan hóa m

36. Can thiệp nào là

- a. Thở oxygen
b. Truyền tĩnh
c. Giảm cơ với
d. Châm dứt c

TÌNH HUỐNG 5: C

Bà H. 27 tuổi, PARA 1
Định không ghi nhận
110/70mmHg, bề cao từ
nghe với Doppler. Kết
Percentile trên kết qu
cung mứ 4th xỏá môn

37. Hãy xếp loại nguy

- a. Chuyển dạ k
b. Chuyển dạ n
c. Chuyển dạ n
d. Chưa đủ dữ k

38. Trong kế hoạch đ

- a. Sản đồ
b. Phá ối
c. EFM
d. Siêu âm

39. Ở bà H., hành động

- a. Phá ối
b. Tăng cơ
c. Cả hai đều có
d. Cả hai đều kh

TÌNH HUỐNG 6: NỮ

Bà K. 27 tuổi, PARA 10
K. không ghi nhận gì đ
một bé trai cân nặng 250
hiện tại, bà K. nặng 52
liệu sinh trắc thai tương
trở ứng thấy được bóng đ

10. Vấn đề hiện tại c

- a. Bất dung nạp đ

Đề thi gồm 8 trang, 60 c


d. Đã có đủ dữ kiện để ra quyết định xử trí, không cần khảo sát gì thêm

TÌNH HUỐNG 4: BĂNG GHI EFM ĐẦU CHUYÊN DẠ (dùng chung cho các câu từ câu 34 đến câu 36)

Cho băng ghi EFM sau, thực hiện ở bà L., một thai phụ bắt đầu vào chuyển dạ, thai 41 tuần. EFM được ghi vào đầu chuyển dạ.

34. Hãy phân loại băng ghi theo ACOG 2009? *Chọn một câu đúng*

- a. Loại I
- b. Loại II
- c. Loại III
- d. Không đủ tiêu chuẩn để xếp loại



35. Băng ghi thể hiện tình trạng gì? *Chọn một câu đúng*

- a. Chèn ép trên đầu thai
- b. Chèn ép trên dây rốn
- c. Thiếu oxygen máu thai
- d. Toan hóa máu thai

36. Can thiệp nào là cần thiết nhất? *Chọn một câu đúng*

- a. Thở oxygen qua sonde mũi hay qua mặt nạ
- b. Truyền tĩnh mạch nhanh Lactated Ringer
- c. Giảm co với beta-mimetic hoặc ức chế canxi
- d. Châm dứt chuyển dạ ngay, không chờ thêm

TÌNH HUỐNG 5: CHUYỂN DẠ (dùng chung cho các câu từ câu 37 đến câu 39)

Bà H. 27 tuổi, PARA 0000. Nhập viện vì chuyển dạ sanh ở tuần thứ 40 vô kinh. Thai kỳ không bất thường. Tiền sử bản thân và gia đình không ghi nhận bệnh lý nội, ngoại khoa. Khám lúc nhập viện ghi nhận bà H. cao 150cm, cân nặng 60kg. Mạch 82bpm, huyết áp 110/70mmHg, bề cao tử cung 30cm, có 1 con co tử cung trong 10 phút cường độ vừa, mỗi cơn dài 45 giây. Tim thai 140bpm đều rõ, nghe với Doppler. Kết quả khảo sát hình ảnh cho thấy sinh trực thai biến động từ 50th percentile lúc giữa thai kỳ, và trở thành 3rd Percentile trên kết quả khảo sát lần cuối cách nay 2 tuần. AFI ghi nhận qua lần khảo sát cuối là 5cm. Khám âm đạo ghi nhận cổ tử cung mở 4cm, xoà mỏng, ngôi chòm vị trí -2, chẩm: chậu chậu bình thường trên lâm sàng.

37. Hãy xếp loại nguy cơ của chuyển dạ? *Chọn một câu đúng*

- a. Chuyển dạ không có nguy cơ
- b. Chuyển dạ nguy cơ thấp
- c. Chuyển dạ nguy cơ cao
- d. Chưa đủ dữ kiện xếp loại nguy cơ

1500 1400 GS
1602/10
80% + 10d

38. Trong kế hoạch để theo dõi chuyển dạ này, yếu tố nào sẽ có vai trò quan trọng nhất? *Chọn một câu đúng*

- a. Sản đồ
- b. Phá ối
- c. EFM
- d. Siêu âm

39. Ở bà H., hành động nào của bạn cần cần nhắc trước thực hiện vì có thể gây nguy hiểm cho chuyển dạ? *Chọn một câu đúng*

- a. Phá ối
- b. Tăng co
- c. Cả hai đều có thể gây nguy hiểm
- d. Cả hai đều không gây nguy hiểm

TÌNH HUỐNG 6: NỬA SAU THAI KỲ (dùng chung cho các câu từ câu 40 đến câu 42)

Bà K. 27 tuổi, PARA 1001. Đến Khám vì cảm thấy căng tức bụng và khó thở, kèm một nhiều từ 2 tuần nay. Tiền sử gia đình của bà K. Không ghi nhận gì đặc biệt. Kinh nguyệt của bà K. đều, 28 ngày, không ghi nhận gì đặc biệt. 2 năm trước, bà K. đã sinh thường một bé trai cân nặng 2500g, lúc rưỡi thai được 36 tuần vô kinh. Hiện tại bà K. đang có thai 22 tuần vô kinh. Cao 1.55m, ở thời điểm hiện tại, bà K. nặng 52kg, núc đã tăng 4kg so với trước khi mang thai. Siêu âm hình thái học 2-D thực hiện hôm nay cho thấy các số liệu sinh trắc thai tương ứng với bách phân vị thứ 50 của tuổi thai tương ứng, riêng chỉ số đo AFI nằm ở trên bách phân vị thứ 92. Không thấy được bóng dẹt dây, ngoài ra không ghi nhận bất thường hình thái học bào thai nào khác.

40. Vấn đề hiện tại của bà K. là gì? *Chọn một câu đúng*

- a. Bất dung nạp đường thai kỳ

ĐK 01

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN SẢN PHỤ KHOA
 Học kỳ I, niên khóa 2015-2016, khóa ngày 16.01.201

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y - BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA

41. Hãy đề nghị một khảo sát cận lâm sàng có ý nghĩa quan trọng nhất cho định hướng chẩn đoán? *Chọn một câu đúng*
- Bất thường thể tích nước ối
 - Bất thường tăng trưởng bào thai
 - Cùng lúc cả ba vấn đề nêu trên
42. Hãy cho biết các triệu chứng căng tức bụng, mệt và khó thở sẽ diễn tiến ra sao? *Chọn một câu đúng*
- Các triệu chứng lâm sàng sẽ diễn tiến nặng hơn một cách rất nhanh chóng
 - Các triệu chứng lâm sàng sẽ diễn tiến nặng hơn, nhưng một cách chậm chạp
 - Các triệu chứng lâm sàng sẽ ổn định như tình trạng hiện tại, không xấu hơn
 - Các triệu chứng lâm sàng sẽ ổn định hay giảm đi nếu thực hiện tiết chế tốt


TÌNH HUỐNG 7: NỬA SAU THAI KỲ (dùng chung cho các câu từ câu 43 đến câu 45)

Bà L. 27 tuổi, PARA 0000, thai 34 tuần vô kinh, nhập viện vì khí đầy nhiều, xuất hiện 2 ngày nay. Tuổi thai là chính xác căn cứ trên dữ kiện sinh trắc thực hiện trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ. Theo thông tin từ sổ khám thai, thai phát triển bình thường trong suốt thai kỳ. Lần siêu âm cuối thực hiện lúc 32 tuần vô kinh cho thấy số liệu sinh trắc tương thích với bách phân vị thứ 50 của sinh trắc của tuổi thai tương ứng. Khám ghi nhận M(84)^{cm}, HA 155/110^{mmHg}, phù toàn thân, phản xạ gân xương tăng mạnh. Bề cơ tử cung 28^{cm}, cơn co tử cung (-), tim thai 155^{bpm} đều rõ. Vết của ụm niếu với que nhúng. Chưa có kết quả định lượng ụm niếu.

43. Hãy cho biết chẩn đoán của bạn. *Chọn một câu đúng*
- Tăng huyết áp thai kỳ
 - Tiền sản giật không có dấu hiệu nặng
 - Tiền sản giật có dấu hiệu nặng
 - Chưa đủ yếu tố để kết luận
44. Khi nào bạn có thể bắt đầu thực hiện các điều trị đầu tiên của kế hoạch điều trị của bạn? *Chọn một câu đúng*
- Ngay tại thời điểm này do đã ở đủ kiện để ra quyết định
 - Cần chờ thêm các khảo sát ụm niếu, ren gan, huyết đồ
 - Cần chờ thêm các khảo sát dấu giá sức khỏe thai
 - Cần chờ thêm dữ kiện lâm sàng như lưu lượng nước tiểu
45. Người ta quyết định chưa chấm dứt, kỳ ngay thời điểm hiện tại. Khi nào bạn sẽ chấm dứt thai kỳ? *Chọn một câu đúng*
- Trong vòng từ 12 đến 48 giờ
 - Khi tình trạng huyết áp ổn định toàn
 - Khi không ổn định được huyết
 - Khi tuổi thai đạt tối thiểu 36

TÌNH HUỐNG 8: PARTOGRAM (dùng chung cho các câu từ câu 46 đến câu 48)

Sân đồ sau ghi lại chuyển dạ ở bà M., so, thời 39 tuần vô kinh, vào chuyển dạ tự nhiên. Các thông tin từ thai kỳ cho thấy đây là một chuyển dạ nguy cơ thấp. Khám thời chờ 3m, lưng trái. Bằng ghi EFM được xếp loại I theo ACOG. Ước lượng trọng lượng thai khoảng 3000g. Kiểu thể cửu ngôi lợi 1. Châm chày phải trước. Khung chậu bình thường trên bình.



46. Hãy lý giải vì sao sản đồ chuyển dạ *Chọn một câu đúng*
- Do đầu ối cản trở
 - Do yếu tố cơn co
 - Do yếu tố ngôi thai
 - Do bất xứng đầu chậu
47. Các can thiệp đã làm có hiệu quả? *Chọn một câu đúng*
- Không, vì sau đó biểu đồ vẫn phải
 - Không, vì sau đó biểu đồ vẫn song đường hành động
 - Có, vì sau đó biểu đồ trở về song đường bảo động
 - Có, vì ngôi thai có xuống th có t ử cung mở chậm

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

Trang

ĐẠI HỌC Y DƯỢC
KHOA Y - BỘ MÔN

48. Tiên lượng khi n
- Nhiều nhất
 - Sớm nhất là
 - Dự kiến có
 - Do sản đồ d

TÌNH HUỐNG 9: C

Bà O. 32 tuổi, PARA 0101, thai 34 tuần vô kinh, nhập viện vì khí đầy nhiều, xuất hiện 2 ngày nay. Tuổi thai là chính xác căn cứ trên dữ kiện sinh trắc thực hiện trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ. Theo thông tin từ sổ khám thai, thai phát triển bình thường trong suốt thai kỳ. Lần siêu âm cuối thực hiện lúc 32 tuần vô kinh cho thấy số liệu sinh trắc tương thích với bách phân vị thứ 50 của sinh trắc của tuổi thai tương ứng. Khám ghi nhận M(84)^{cm}, HA 155/110^{mmHg}, phù toàn thân, phản xạ gân xương tăng mạnh. Bề cơ tử cung 28^{cm}, cơn co tử cung (-), tim thai 155^{bpm} đều rõ. Vết của ụm niếu với que nhúng. Chưa có kết quả định lượng ụm niếu.

49. Khả năng cao nh
- Đờ tử cung
 - Sang chấn s
 - Sang chấn s
 - Do nhau ch

50. Bạn làm gì trước
- Dùng oxytoc
 - Dùng ergot
 - Làm trống
 - Mở đường

51. Tại thời điểm n
- Dung dịch
 - Dung dịch
 - Dung dịch
 - Máu hay c

TÌNH HUỐNG 10:

Bé P. con bà O. vào viện vì khí đầy nhiều, xuất hiện 2 ngày nay. Tuổi thai là chính xác căn cứ trên dữ kiện sinh trắc thực hiện trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ. Theo thông tin từ sổ khám thai, thai phát triển bình thường trong suốt thai kỳ. Lần siêu âm cuối thực hiện lúc 32 tuần vô kinh cho thấy số liệu sinh trắc tương thích với bách phân vị thứ 50 của sinh trắc của tuổi thai tương ứng. Khám ghi nhận M(84)^{cm}, HA 155/110^{mmHg}, phù toàn thân, phản xạ gân xương tăng mạnh. Bề cơ tử cung 28^{cm}, cơn co tử cung (-), tim thai 155^{bpm} đều rõ. Vết của ụm niếu với que nhúng. Chưa có kết quả định lượng ụm niếu.

52. Hãy đánh điểm
- 0 điểm
 - 1 điểm
 - 2 điểm
 - 3 điểm

53. Phải làm gì tr
- Xoa bóp
 - Chỉnh tư
 - Đặt nội k
 - Bóp bóp

54. Nếu hồi sức c
- 10 điểm
 - 8 điểm
 - 6 điểm
 - 4 điểm

TÌNH HUỐNG 11:

Ở trại hậu sản, bà O. vào viện vì khí đầy nhiều, xuất hiện 2 ngày nay. Tuổi thai là chính xác căn cứ trên dữ kiện sinh trắc thực hiện trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ. Theo thông tin từ sổ khám thai, thai phát triển bình thường trong suốt thai kỳ. Lần siêu âm cuối thực hiện lúc 32 tuần vô kinh cho thấy số liệu sinh trắc tương thích với bách phân vị thứ 50 của sinh trắc của tuổi thai tương ứng. Khám ghi nhận M(84)^{cm}, HA 155/110^{mmHg}, phù toàn thân, phản xạ gân xương tăng mạnh. Bề cơ tử cung 28^{cm}, cơn co tử cung (-), tim thai 155^{bpm} đều rõ. Vết của ụm niếu với que nhúng. Chưa có kết quả định lượng ụm niếu.

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y - BỘ MÔN SẢN SÁN

ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN SẢN SÁN PHỤ KHOA
Học kỳ I, niên khóa 2015-2016, khóa ngày 16.01.2016

48. Tiền lượng khí nào cổ tử cung sẽ mở trọn? Chọn một câu đúng

- a. Nhiều nhất là 3 giờ nữa
- b. ☒ Sớm nhất là 3 giờ nữa
- c. Dự kiến có nhiều khó khăn, chưa chắc cổ tử cung sẽ trọn
- d. Do sản đồ đã ở rất xa về bên phải, tôi không chờ thêm

TÌNH HUỐNG 9: GIAI ĐOẠN III CỦA CHUYỂN ĐẠ (dùng chung cho các câu từ câu 49 đến câu 51)

Bà O. 32 tuổi, PARA 1001, vừa sanh xong. Đó là một cuộc chuyển dạ xảy ra tự nhiên vào tuần thứ 30 vô kinh. Bà O. Nhập viện khi ối vừa vỡ, cổ tử cung mở 4cm. Cuộc chuyển dạ diễn tiến rất nhanh sau vỡ ối. 2 giờ sau nhập viện, bà M. sanh được qua ngã âm đạo một bé trai 1800g. Ngay sau khi bé vừa ra, bà O. rơi ngay vào tình trạng chảy máu ở âm, máu đỏ tươi, 300ml.

49. Khả năng cao nhất của nguyên nhân gây băng huyết cho bà O. là yếu tố gì? Chọn một câu đúng

- a. Đờ tử cung
- b. ☒ Sang chấn sinh dục dưới
- c. Sang chấn sinh dục trên
- d. Do nhau chưa bong

50. Bạn làm gì trước tiên? Chọn một câu đúng

- a. ☒ Dùng oxytocin
- b. Dùng ergot alkaloides
- c. Làm trống buồng tử cung
- d. Mở đường truyền tĩnh mạch

51. Tại thời điểm này, khi cần truyền dịch, dung dịch truyền ưu tiên được dùng là gì? Chọn một câu đúng

- a. Dung dịch đường đẳng trương
- b. Dung dịch tinh thể đẳng trương
- c. ☒ Dung dịch cao phân tử
- d. Máu hay các chế phẩm máu

TÌNH HUỐNG 10: HỒI SỨC SƠ SINH (dùng chung cho các câu từ câu 52 đến câu 54)

Bà P. con bà O. vừa sanh xong (xem tình huống 9). Khám bé ở thời điểm 1 phút sau sanh: tím toàn thân, thân mềm nhũn, không phản xạ sặc khi hít nhất, thở hớt hơ rồi rạc, nhịp tim 120 lần/phút, da xanh.

52. Hãy đánh điểm số Apgar của bé P. Chọn một câu đúng

- a. 0 điểm
- b. 1 điểm
- c. 2 điểm
- d. ☒ 3 điểm

53. Phải làm gì trước tiên cho bé P.? Chọn một câu đúng

- a. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực
- b. Chính toán chuyển hóa
- c. Đặt nội khí quản giúp thở
- d. ☒ Bóp bóng giúp thở

54. Nếu hồi sức cho kết quả tốt nhất thì điểm số Apgar cao nhất mà bé P. có thể có là bao nhiêu? Chọn một câu đúng

- a. 10 điểm
- b. ☒ 8 điểm
- c. 6 điểm
- d. 4 điểm

TÌNH HUỐNG 11: CHĂM SÓC SẢN PHỤ TRONG THỜI KỲ HẬU SẢN (dùng chung cho các câu từ câu 55 đến câu 57)

Ở trại hậu sản, bạn đang theo dõi chăm sóc cho bà Q. Bà ta đã sanh được 2 ngày. Bà Q. được khởi phát chuyển dạ vì ối vỡ non vào tuần thứ 36 vô kinh. Khởi đầu của khởi phát chuyển dạ khá khó khăn, và Q. chỉ vào được giai đoạn hoạt động 13 giờ sau khi bắt đầu oxytocin. Sau sanh, Q. còn bị băng huyết do đờ tử cung. Băng huyết chỉ được khống chế sau khi đã dùng 400mg oxytocin, kiểm tra toàn bộ đường sanh bằng tay và dụng cụ, 2 lần tiêm ergometrin, và 4 đơn vị máu đông nhón. Con của Q. hiện còn đang phải nằm ở sân số: tăng cường nhủ vì nghi có nhiễm trùng sơ sinh. Hôm nay, bà Q. than phiền rằng bà cảm thấy sốt, đồng thời đau nhức ở một bên chi dưới. Khám không tìm thấy ổ nhiễm trùng nội khoa. vú cứng, nặn ra ít sữa non, kèm theo mỗi bên nách có một khối

- Định lượng β -hCG một lần và đối chiếu với kết quả không phải, khảo sát nào là quan trọng nhất? Chọn một câu đúng
- Sieu âm một lần và đối chiếu với các kết quả β -hCG đã có
- Sieu âm nhiều lần và đối chiếu các kết quả siêu âm với nhau
7. Đem giai đoạn hoạt động của biểu đồ Friedman: chồng lên sản đồ WHO 1973, bạn ghi nhận điều gì? Chọn một câu đúng
- a. Phần lớn biểu đồ Friedman nằm ở bên trái đường báo động của sản đồ WHO 1993
- b. Phần lớn biểu đồ Friedman nằm trùng với đường báo động của sản đồ WHO 1993
- c. Phần lớn biểu đồ Friedman nằm ở bên phải đường báo động của sản đồ WHO 1993
- d. Phần đầu của biểu đồ Friedman ở bên phải, phần sau ở bên trái đường báo động của sản đồ WHO 1993

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y - BỘ MÔN PHỤ SẢN

ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN SẢN PHỤ KHOA

Học kỳ I, niên khóa 2015-2016, khóa ngày 16.01.2016

nhỏ kích thước $3 \times 3 \times 2$, căng chắc và đau. Bụng mềm, tử cung mềm, ấn đau. Sản dịch ít, đỏ sẫm, nặng mùi. Vết may tầng sinh môn khô, mềm, không đau. Càng gần phải sờ ấm hơn và hơi to hơn chân trái, nằm bấp chân sản phụ kêu đau.

55. Triệu chứng nghiêm trọng nhất của bà Q. ở thời điểm hiện tại là triệu chứng nào? Chọn một câu đúng

- a. Đau tử cung
- b. Đau vú
- c. Đau chân
- d. Sản dịch bất thường

56. Bạn giải quyết vấn đề nghiêm trọng đó ra sao? Chọn một giải pháp đặc thù có vai trò quan trọng nhất

- a. Kháng sinh
- b. Kháng đông
- c. Kháng viêm
- d. Cắt sữa

57. Bạn giải quyết vấn đề liên quan đến khối ở nách ở Q. như thế nào? Chọn một giải pháp hợp lý

- a. Không làm gì cả
- b. Kháng sinh
- c. Giảm đau
- d. Ngoại khoa

TÌNH HUỐNG 12: NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ (dùng chung cho các câu từ câu 58 đến câu 60)

Bà T. 38 tuổi, PARA 0000. Bà ta vừa sinh mổ một bé trai 2000g lúc 36 tuần vô kinh sau khi phát khởi chuyển dạ thất bại vì ối vỡ non, nhiễm trùng đi. Sau sinh bé được cho theo mẹ. T. Đang dùng kháng sinh và muốn nuôi con bằng sữa mẹ.

58. T. đang dùng cephalosporin thế hệ 3, kèm gentamycin và metronidazole. T. Sẽ cho con bú ra sao? Chọn một câu đúng

- a. Tình trạng của bà ta không cho phép thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ
- b. Cần thay đổi kháng sinh nếu như bà ta muốn nuôi con bằng sữa mẹ
- c. Tạm thời hút sữa bỏ, để duy trì nguồn sữa để bú mẹ sau ngưng kháng sinh
- d. Có thể cho con bú sữa mẹ hoàn toàn dù bà ta đang phải dùng kháng sinh

59. Kết quả vi sinh *S. aureus* kháng gentamycin, nhạy kanamycine. Đối kháng sinh có làm thay đổi quyết định ở câu 58 không? Chọn một câu đúng

- a. Việc đối kháng sinh không ảnh hưởng gì đến quyết định trong câu 58
- b. Có khác câu 58. Do kanamycine qua được sữa mẹ, còn gentamycine thì không
- c. Có khác câu 58. Do kanamycine có độc tính cao hơn gentamycine rất nhiều, đặc biệt trên ốc tai
- d. Có khác câu 58. Do bé không bị ảnh hưởng bởi kanamycine, nhưng bị ảnh hưởng bởi gentamycine

60. Kết quả vi sinh *S. aureus* kháng metronidazole, nhạy bactrim. Đối kháng sinh có làm thay đổi quyết định ở câu 58 không? Chọn một câu đúng

- a. Việc đối kháng sinh không ảnh hưởng gì đến quyết định trong câu 58
- b. Có khác câu 58. Do bactrim qua được sữa mẹ, còn metronidazole thì không
- c. Có khác câu 58. Do bactrim có độc tính cao hơn metronidazole rất nhiều
- d. Có khác câu 58. Do bé không bị ảnh hưởng bởi sulfamide, nhưng bị ảnh hưởng bởi metronidazole

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y - BỘ MÔN PHỤ SẢN

Hướng dẫn làm bài thi lý thuyết Sản Phụ khoa, c

Đây là một bài lượng giá cuối kỳ dưới hình thức c

- Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, tổ lớp, ngày lý sinh viên là mã số đã được dùng trong thờ
- Điền bút chỉ từ mã số quản lý sinh viên và n
- Đề thi gồm 20 tình huống, mỗi tình huống g
- Mỗi câu hỏi trong tình huống sẽ có những c

Mong các thí sinh lưu ý thực hiện tốt. Cảm ơn sự

Giáo vụ bộ môn Sản Phụ khoa.

TÌNH HUỐNG 1: SINH LÝ CHU K

Bà A. 34 tuổi, PARA 2002, con nhỏ 1 nội tiết ngoại sinh phối hợp có chứa hành kinh hàng tháng càng ngày càng

- Nếu bạn thực hiện định lượng nội tiết
 - FSH thấp, LH thấp
 - FSH thấp, LH cao
 - FSH cao, LH thấp
 - FSH cao, LH cao
- Bà A. muốn đổi sang loại thuốc
 - Đổi sang thuốc có hàm lượng
 - Đổi sang thuốc có hàm lượng
 - Đổi sang thuốc có hàm lượng
 - Đổi sang thuốc có hàm lượng
- Bà A. hỏi bạn rằng nếu dùng th
 - Tuổi mãn kinh tự nhiên khi
 - Khi uống thuốc tránh thai
 - Khi uống thuốc tránh thai
 - Tuổi mãn kinh sẽ lệ thuộc

TÌNH HUỐNG 2: TAM CÁ NG

Bà B. 24 tuổi, PARA 0000. Trước đặc tình giống như các lần hành máu chỉ ra có 2 ngày, lượng rất hCG quick test, với kết quả dương không ra huyết từ lỗ cổ tử cung. cung mềm, 2 phần phụ không sờ

- Bạn giải thích hiện tượng b
 - Đó là dấu hiệu của ph
 - Đó là một lần hành kir
 - Đó là dấu hiệu của tha
 - Đó là triệu chứng của
- Bạn cần thực hiện khảo sá
 - Định lượng β -hCG m
 - Định lượng β -hCG h
 - Siêu âm qua đường a
 - Hẹn 4 tuần nữa sẽ si
- 1 tuần sau, B. khám lại v
 - Dọa sảy thai
 - Sảy thai đang tiến tr
 - Thai ngoài tử cung
 - Bệnh nguyên bào n

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. Thời gian làm bài 60 phút

Đề thi gồm 8 trang, 60 câu. T