



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ►

Tiếp cận điều trị hội chứng tắc nghẽn hô hấp dưới-15/11/2021

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhập khoa cấp cứu vì khó thở, khô khè, nói từng câu, tỉnh, mạch: 115 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, SpO2 92%. Tiền căn hen cách đây 4 năm, chỉ dùng salbutamol xịt khi khó thở. Phân độ cơn hen cấp nào sau đây đúng?

- ☐ a. Nhẹ
- ☒ b. Trung bình
- ☐ c. Nặng
- ☐ d. Đe dọa tính mạng

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhập khoa cấp cứu vì khó thở, khò khè, nói từng câu, tỉnh, mạch: 115 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, SpO2 92%. Tiền căn hen cách đây 4 năm, chỉ dùng salbutamol xịt khi khó thở. Xử trí cấp cứu nào phù hợp cho bệnh nhân trên?

- ☐ a. Salbutamol phun khí dung mỗi 3-5 phút
- ☐ b. Methylprednisolone 16 mg 1 viên uống
- ☒ c. Salbutamol phun khí dung mỗi 20 phút
- ☐ d. Methylprednisolone 8 mg 1 viên uống

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhập khoa cấp cứu vì khó thở, khò khè, nói từng câu, tỉnh, mạch: 115 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, SpO2 92%. Tiền căn hen cách đây 4 năm, chỉ dùng salbutamol xịt khi khó thở. Liều prednisolone nào phù hợp cho bệnh nhân?

1mg/kg

- ☐ a. 10-20 mg
- ☐ b. 20-30 mg
- ☐ c. 30-40 mg
- ☒ d. 40-50 mg

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhập khoa cấp cứu vì khó thở, khò khè, nói từng câu, tỉnh, mạch: 115 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, SpO2 92%. Tiền căn hen cách đây 4 năm, chỉ dùng salbutamol xịt khi khó thở. Liều corticoid toàn thân đợt cấp hen dùng trong bao lâu?

hen là 5-7 ngày
COPD là 5 ngày

- ☐ a. 2-3 ngày
- ☐ b. 3-4 ngày
- ☒ c. 5-7 ngày
- ☐ d. 7-9 ngày

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhập khoa cấp cứu vì khó thở, khô khè, nói từng câu, tỉnh, mạch: 115 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, SpO2 92%. Tiền căn hen cách đây 4 năm, chỉ dùng salbutamol xịt khi khó thở. Mục tiêu oxy (SpO2) bao nhiêu có thể xem xét xuất viện?

- ☒ a. > 94%
- ☐ b. > 95%
- ☐ c. > 96%
- ☐ d. > 97%

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhập khoa cấp cứu vì khó thở, khô khè, nói từng câu, tỉnh, mạch: 115 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, SpO2 92%. Tiền căn hen cách đây 4 năm, chỉ dùng salbutamol xịt khi khó thở. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sử dụng budesonide/formoterol (160/4,5) để duy trì, liều hít sáng - chiều phù hợp trên bệnh nhân này là bao nhiêu lần?

- ☐ a. 1-1
- ☐ b. 2-1
- ☒ c. 2-2
- ☐ d. 3-3

trước đây chỉ sử dụng SABA khi cần -> mức độ nhẹ.

Hiện tại, không có tiền căn, chỉ có một đợt cấp mới vào viện -> điều trị duy trì là ICS liều cao
Hoặc ICS TB và LABA (400-800)
thường xài liều giống nhau hoặc đêm>ngày

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Liều budesonide trong điều trị hen > 12 tuổi bao nhiêu được coi là liều thấp?

- ☐ a. 100-200
- ☒ b. 200-400
- ☐ c. 400-800
- ☐ d. 800-1000

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Yếu tố nào đúng về nguy cơ đợt cấp trong tương lai của bệnh nhân hen?

- ☒ a. Sử dụng SABA liều cao trên 200 liều trong 1 tháng
- ☐ b. Có dùng ICS trong điều trị nền của hen **1 chai là 200 liều**
- ☐ c. Chưa từng nhập viện vì cơn cấp trong 12 tháng qua
- ☐ d. Chưa ghi nhận bệnh đồng mắc như GERD, viêm mũi dị ứng

