

ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGOẠI THẦN KINH Y5 2014

THỜI GIẠN: 45 PHÚT (45')

nh nhân kích thích đau mô mắt, đáp ứng đau chính xác, nói những từ vô nghĩa, có thang điểm Glasgow

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- ☒ D. 10
- E. 11

Chỉ định chụp CT-Scan sọ não trong CTXN, điều nào sau đây không đúng
nh nhân lơ mơ, nói nhảm

- ☒ A. Có giết sau chấn thương
- ☒ B. Chảy máu mũi
- C. Có dấu hiệu bầm máu sau tai
- D. Đau đầu nhiều và liên tục

Chỉ định lâm sàng (dùng cho câu 3&4&5):

Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, được đưa đến bệnh viện sau một tai nạn giao thông. Khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân hôn mê, GCS=10 điểm, yếu 1/2 người phải dần nhẹ đồng tử bên trái sưng to vùng thái dương trái.

Chỉ định lâm sàng được nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này

- A. Chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng cấp tính thái dương phải
- B. Chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu phải
- ☒ C. Chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng cấp tính thái dương trái
- D. Chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu trái
- E. Chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng cấp tính tiểu não phải

Chỉ định cận lâm sàng hợp lý nhất trên bệnh nhân này

- ☒ A. CT-Scanner sọ não không bơm thuốc cản quang.
- B. MRI sọ não
- C. XQ sọ
- D. CT-Scanner sọ não có bơm thuốc cản quang
- E. Chụp mạch máu não (Angiography)

Kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân này ghi nhận có khối máu tụ ngoài màng cứng trán-thái dương trái nặng 40 gram kèm lớp máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải bề dày ~5mm, đường giữa di lệch sang phải 1cm, sọ não thất bên trái. Chỉ định điều trị đúng nhất.

- ☒ A. Phẫu thuật cấp cứu, mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng
- B. Điều trị tại khoa hồi sức, cho thở máy, chống phù não, theo dõi tri giác và dấu thần kinh khu trú
- C. Theo dõi, chụp lại CT-Scanner sau 2 giờ Phẫu thuật cấp cứu, mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng
- D. Phẫu thuật cấp cứu, mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng bên trái và máu tụ dưới màng cứng bên phải
- E. Phẫu thuật sau 24 giờ

8. Máu tụ ngoài màng cứng cấp tính do chấn thương sọ não, điều nào sau đây đúng:
Thường kèm theo dập não

- ☒ A. Có tiên lượng tốt hơn các loại máu tụ khác do chấn thương sọ não
- ☐ B. Liên quan đến cơ chế chấn động dội
- ☐ C. Thường có máu trong DNT
- ☐ D. Do đứt các tĩnh mạch liên lạc

9. Bệnh nhân nam 28 tuổi được đưa vào bệnh viện sau một tai nạn giao thông. Khám lâm sàng ghi nhận: hôn mê GCS=7d, đã đặt nội khí quản và đang bóp bóng giúp thở, đồng tử hai bên 4 mm, phản xạ ánh sáng (+), còn phản xạ mắt búp bê.

Mạch: 60 lần/phút, HA: 140/90 mmHg

Sưng nề vùng chàm 2 bên.
BN được chụp CT-Scanner sọ não có kết quả như sau: dập não kèm máu tụ trong não trán hai bên, phù não lan tỏa, xóa các bể dịch não tủy trước cầu não.
Phương pháp điều trị đúng nhất

- ☒ A. Phẫu thuật cấp cứu: mở sọ trán hai bên lấy máu tụ và giải ẹp
- ☐ B. Điều trị tại khoa hồi sức, cho thở máy, chống phù não, theo dõi tri giác và dấu thần kinh khu trú
- ☐ C. Theo dõi, chụp lại CT-Scanner sau 24 giờ.
- ☐ D. Theo dõi, chụp lại CT-Scanner sau 2 giờ.
- ☐ E. Phẫu thuật sau 24 giờ.

10. Sau một CTSN, có máu trong chảy ra từ mũi là do:

- ☒ A. Viêm xoang sau chấn thương
- ☐ B. Vỡ sụn sọ trước
- ☐ C. Vỡ xương thái dương
- ☐ D. Tắc lệ đạo sau chấn thương
- ☐ E. Viêm mũi

Tình huống lâm sàng (đùng cho câu 11&12&13):

Bệnh nhân nữ, 30 tuổi vào cấp cứu sau một tai nạn giao thông. Khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân lú đờ, GCS=14 điểm, không dấu thần kinh khu trú, có vết thương da đầu khoảng 6cm ở vùng đỉnh trái phức tạp, thâm sát vết thương thấy có vỡ xương sọ bên dưới và một ít nhu mô não.

11. Chẩn đoán lâm sàng trên bệnh nhân này:

- ☒ A. Vết thương sọ não
- ☐ B. Lún sọ hở
- ☐ C. Vết thương sọ não hở
- ☐ D. Chưa đủ dữ kiện lâm sàng để chẩn đoán xác định

12. Sau khi có chẩn đoán xác định là vết thương sọ não, điều trị đúng trên bệnh nhân này là:

- ☐ A. Khâu vết thương tại phòng cấp cứu, dùng kháng sinh và cho về nhà
- ☐ B. Nhập viện, dùng kháng sinh dự phòng viêm màng não
- ☐ C. Nhập viện theo dõi và phẫu thuật khi có biến chứng
- ☐ D. Nhập viện, dùng kháng sinh dự phòng và phẫu thuật sau 1 tuần.
- ☒ E. Nhập viện, phẫu thuật cấp cứu và dùng kháng sinh dự phòng viêm màng não.

13. Trong những ngày đầu, biến chứng thương gấp và nguy hiểm đối với bệnh nhân này là:

- ☐ A. Abscess não
- ☒ B. Viêm màng não
- ☐ C. Nhiễm trùng huyết
- ☐ D. Viêm não thất
- ☐ E. Động kinh

câu này anh Mạnh review có trong đề NT 2019
so sánh với câu 9 trong đề _ngoại tk y12 không có đáp án Viêm màng não
mà câu đó là "sau điều trị", còn câu này là "trong những ngày đầu" => sợ VMN???

in hướng lâm sàng (dùng cho câu 14&15):

Bệnh nhân nam 40 tuổi được đưa vào bệnh viện sau một tai nạn giao thông. Khám lâm sàng ghi nhận: mê
GCS 4/15, đã đặt nội khí quản và đang bóp bóng giúp thở, đồng tử bên trái 5 mm, mắt phản xạ ánh sáng, đồng tử
phải 3 mm, còn đáp ứng với ánh sáng.

Mạch: 60 lần/phút, HA: 140/90 mmHg

Song ngữ vùng trán-thai dương trái

BX được chụp CT-Scanner sọ não có kết quả như sau: máu tụ ngoài màng cứng cấp tính trán-thai dương trái,
khoảng 40 gram, đẩy lệch đường giữa sang phải 8 mm

14. Phương pháp điều trị đúng nhất

A. Theo dõi, chụp lại CT-Scanner sau 4 giờ

B. Điều trị tại khoa hồi sức, cho thở máy, chống phù não, theo dõi tri giác và dấu thần kinh khu trú

☒ C. Phẫu thuật cấp cứu mở sọ lấy máu tụ

D. Theo dõi, chụp lại CT-Scanner sau 2 giờ

E. Phẫu thuật sau 24 giờ

15. Bệnh nhân này được phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ. Sau mổ 6 giờ, thêm khám lại bệnh nhân ghi nhận: mê,
GCS 3/15, đồng tử hai bên dãn to, mắt phản xạ ánh sáng. Mạch nhanh, HA không ổn định. Thai độ xử trí lúc
này

☒ A. Điều trị hồi sức nội khoa

B. Phẫu thuật lại

C. Chụp MRI não để xem có tổn thương sợi trục lan tỏa hay không

D. Đặt hệ thống theo dõi áp lực nội sọ

19. Các biến chứng muộn sau chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

A. Động kinh

B. Đau nước (Hydrocephalus)

C. Đau đầu

D. Sa sút trí tuệ, khó tập trung

☒ E. Tất cả đều đúng

20. Theo thang điểm Glasgow, chấn thương sọ não được xem là nặng khi số điểm là, chọn câu đúng:

A. 12-14

B. 13-15

C. 9-12

D. 5-8

E. 6-14













