

NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ► Pretest - Bệnh tiêu hóa liên quan axít dịch vị - Đợt 1

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp trong nhiều năm, thường xuyên sử dụng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID). Cách nhập viện 6 giờ, bệnh nhân đau bụng dữ dội vùng trên rốn, không tư thế giảm đau, đau tăng khi thay đổi tư thế, sau đó lan khắp bụng và sốt. Chẩn đoán nào phù hợp nhất ở bệnh nhân này ?:

Select one:

☐

a. Túi thực quản

☒

b. Túi dạ dày

☐

c. Túi ruột non

☐

d. Túi đại tràng

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân có tiền sử bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD) cách đây 10 năm. Khoảng 1 tháng nay, bệnh nhân ăn uống kém, chủ yếu ăn thức ăn lỏng, thường bị nôn ọe sau ăn, nuốt có cảm giác vướng, sụt cân 3 kg trong 2 tháng. Chẩn đoán nào phù hợp nhất ở bệnh nhân này ?:

Select one:

☐

a. Thực quản Barrett

☐

b. Thoát vị hoành

☐

c. Hẹp môn vị

☒

d. Ung thư thực quản

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân đã điều trị tiệt trừ H.pylori 2 lần đều bị thất bại. Xét nghiệm nào sau đây phải làm cho bệnh nhân này trước khi muốn điều trị lại ?:

Select one:

☐

a. Mô bệnh học

☐

b. Kháng nguyên H.pylori trong phân

☒

c. Nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ

☐

d. Giải trình tự gen của H.pylori

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân đã được điều trị diệt trừ H.pylori và đến khám để kiểm tra lại H.pylori. Tuy nhiên, cách 2 tuần trước, bệnh nhân có uống Amoxicillin trong vòng 1 tuần do bị viêm họng. Bệnh nhân này cần phải chờ thêm ít nhất bao lâu để kiểm tra lại xét nghiệm tìm H.pylori ?:

Select one:

- ☐ a. 1 tuần
- ☐ b. 2 tuần
- ☒ c. 3 tuần
- ☐ d. 4 tuần



Đáp án đúng là: