

Câu hỏi

- 1 TÌNH HUỐNG 1: U XƠ CƠ TỬ CUNG PHÁT HIỆN MỘT CÁCH TÌNH CỜ Một phụ nữ 45 tuổi, PARA 2002, con nhỏ 10 tuổi, chu kỳ kinh đều, không bất thường, đang tránh thai bằng dụng cụ tử cung tránh thai chứa đồng loại TCu 380A, đặt từ 10 năm nay. Từ lúc đặt dụng cụ tử cung đến nay, bà chưa hề đi khám lại. Hôm nay, bà ta đi khám sức khỏe theo cơ quan và siêu âm, phát hiện thấy tử cung có một nhân xơ d=20mmx25mmx20mm, trong cơ thành sau tử cung, gần đáy tử cung. Dụng cụ tử cung nằm đúng vị trí. Phết mỏng cổ tử cung tầm soát ung thư đã được thực hiện với kết quả bình thường. Ban làm gì cho bà ta? Chon 3 câu đúng.
 - A. Đề nghị bà ta tháo dụng cụ tử cung đang dùng và chuyển sang một tránh thai khác
 - **B**. Nói rằng bà ta vẫn có thể tiếp tục tránh thai bằng dụng cụ tử cung hiện đang mang
 - C. Đề nghị bà ta nên dùng dụng cụ tử cung loại phóng thích chậm progestogen cho muc đích tránh thai và điều tri
 - **D**. Nói rằng hiện tại không cần phải thực hiện một phương pháp phòng ngừa tiến triển của u xơ hay điều trị gì khác
 - **E.** Đề nghị bà ta thực hiện thêm một khảo sát chẩn đoán khác như siêu âm Doppler chẳng hạn
 - F. Không cần thực hiện thêm test nào khác, cho về và căn dặn lịch tái khám G. •
- **2** TÌNH HUỐNG 2: XUẤT HUYẾT TỬ CUNG BẤT THƯỜNG VÀ U XƠ TỬ CUNG Một phụ nữ 48 tuổi, PARA 2002, con nhỏ 15 tuổi, hiện đang tránh thai bằng bao cao su, đến khám vì xuất huyết tử cung bất thường. Từ nhiều tháng nay, bà thường thấy vòng kinh bị ngắn đi, kèm theo ra kinh dây dưa kéo dài đến 10 ngày. Khám mỏ vịt thấy cổ tử cung trơn láng, có huyết đỏ sậm chảy ra từ lỗ cổ tử cung. Tử cung to bằng tử cung mang thai 12 tuần, mật độ chắc, di động bình thường. 2 phần phụ không sờ thấy. Túi cùng trống.

 Siêu âm thấy tử cung dAP = 65mm, có một nhân xơ trong cơ thành sau, d=50mmx55mmx50mm, giới han rõ. Nôi mac tử cung mỏng, 3mm. 2 phần phụ

Thời gian còn lại 1:59:55 Số báo danh 20170116_18290



	IF AT							
C1	A	В	С	D	E	F	G	0
C2	A	В	С	D	E	F	G	0
C3	A	В	С	D	E	F	G	0
C4	A	В	С	D	E	F	G	0
C5	A	В	С	D	E	F	G	0
C6	A	В	С	D	E	F	G	0
	SCORE: 0							

không bất thường trên siêu âm.

Bạn làm gì cho bà ta? Hãy chọn 2 câu đúng

- A. O Có chỉ định phẫu thuật cắt tử cung
- **B**. Có chỉ định phẫu thuật bóc nhân xơ
- C. Có chỉ định thuyên tắc động mạch tử cung
- D. Ocó chỉ định của Gonadotropin Releasing Hormone agonist
- E. Có chỉ định của dụng cụ tử cung phóng thích Progestogen
- F. O Có chỉ định của Progestogen đường uống
- **G**. •
- **3** TÌNH HUỐNG 3: XUẤT HUYẾT TỬ CUNG BẤT THƯỜNG VÀ U XƠ TỬ CUNG Một phụ nữ 45 tuổi, to béo, PARA 1001, con nhỏ 15 tuổi. 10 năm nay không có thai tự nhiên dù không tránh thai, đến khám vì xuất huyết tử cung bất thường. Từ nhiều năm nay, bà thường thấy vòng kinh rất dài, 3-6 tháng, kèm theo ra kinh dây dưa kéo dài đến 10 ngày. Khám mỏ vịt thấy cổ tử cung trơn láng, có huyết đỏ sậm chảy ra từ lỗ cổ tử cung. Tử cung to bằng tử cung mang thai 12 tuần, mật độ chắc, di động bình thường. 2 phần phụ không sờ thấy. Túi cùng trống.

Siêu âm thấy tử cung dAP = 65mm, có một nhân xơ trong cơ thành sau, d=50mmx55mmx50mm, giới hạn rõ. Nội mạc tử cung mỏng, 18mm. Trên siêu âm thấy 2 buồng trứng có nhiều nang nhỏ, dạng đa nang. Nạo sinh thiết với kết quả tăng sinh đơn giản điển hình của nội mạc tử cung.

Bạn làm gì cho bà ta? Hãy chọn 1 điều trị thích hợp nhất

- A. O Có chỉ định phẫu thuật cắt tử cung
- **B.** Có chỉ định phẫu thuật bóc nhân xơ
- C. O Có chỉ định thuyên tắc động mạch tử cung
- **D.** Có chỉ định của Gonadotropin Releasing Hormone agonist
- E. Có chỉ định của dụng cụ tử cung phóng thích Progestogen
- F. Có chỉ định của Selective Progesterone Receptor Modulator
- **G**. •
- 4 TÌNH HUỐNG 4: THỐNG KINH

Một phụ nữ trẻ, 30 tuổi, đã lập gia đình 5 năm nhưng chưa thấy có thai dù không dùng bất cứ phương pháp tránh thai nào. Cô thường xuyên bị đau bụng kinh, ngày càng tăng. Mỗi tháng, cô bắt đầu thấy đau bụng từ ngay ngày đầu

	IF AT							
C1	Α	В	С	D	E	F	G	0
C2	A	В	С	D	E	F	G	0
C3	Α	В	С	D	E	F	G	0
C4	Α	В	С	D	E	F	G	0
C5	Α	В	С	D	E	F	G	0
C6	Α	В	С	D	E	F	G	0
	SCORE: 0							

tiên của kỳ kinh, kéo dài đến khi sạch hẳn kinh mới khỏi đau. Khám lâm sàng thấy tử cung cứng chắc, to khoảng tử cung mang thai 8 tuần, ngã sau, di động kém. Túi cùng sau chạm đau. Siêu âm vào ngày thứ 5 của chu kỳ thấy tử cung to, dAP=50mm, có một nhân xơ tử cung d=20mmx25mmx30mm, giới hạn không rõ. 2 phần phụ không bất thường trên siêu âm.

Bạn làm gì để giải quyết triệu chứng đau? Chọn 1 giải pháp thích hợp nhất với tình huống

- A. Dùng thuốc kháng viêm không steroid
- B. Dùng thuốc viên tránh thai nội tiết estro-progestogen phối hợp
- C. Dùng chất ức chế men aromatase
- **D**. Có chỉ định của Gonadotropin Releasing Hormone agonist
- E. OCó chỉ định của dụng cụ tử cung phóng thích Progestogen
- F. Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung
- **G**. •

5 TÌNH HUỐNG 5: TỬ CUNG TO

Một phụ nữ 38 tuổi, PARA 1031, con nhỏ 5 tuổi, 3 lần phá thai ngoại khoa bằng hút chân không, dự định sanh con thứ nhì trong năm nay, đến khám vì phát hiện có khối u xơ tử cung. Từ hơn một năm nay, bà thường thấy kinh bị ra dây dưa, đôi khi kéo dài đến hơn 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ khi có kinh. Khám mỏ vịt thấy cổ tử cung trơn láng, có huyết đỏ sậm chảy ra từ lỗ cổ tử cung. Tử cung to bằng tử cung mang thai 12 tuần, mật độ cứng chắc, di động kém, chạm đau. 2 phần phụ không sờ thấy. Túi cùng trống.

Siêu âm thấy tử cung dAP = 65mm, có một vùng phản âm kém thành sau, vị trí trong cơ sát niêm mạc, kích thước u xơ d=30mmx55mmx30mm, giới hạn không rõ. Nội mạc tử cung 12mm. 2 phần phụ không bất thường trên siêu âm. Bạn sẽ làm gì để giải quyết vấn đề của bà ta. Chọn 2 câu đúng.

- A. OCòn thiếu dữ kiện lâm sàng để quyết định điều trị
- B. Och thiếu dữ kiện hình ảnh để quyết định điều trị
- C. Đã có chỉ định phẫu thuật bóc nhân xơ
- D. Đã có chỉ định thuyên tắc động mạch tử cung
- E. Đã có chỉ định điều trị với dụng cụ tử cung phóng thích progestogen
- F. Đã có chỉ định điều trị đồng vận Gonadotropin Releasing hormone
- **G**. 0

IF AT								
C1	Α	В	С	D	E	F	G	0
C2	Α	В	С	D	E	F	G	0
C3	A	В	С	D	E	F	G	0
C4	A	В	С	D	E	F	G	0
C5	A	В	С	D	E	F	G	0
C6	A	В	С	D	E	F	G	0
	SCORE: 0							

- **6** TÌNH HUỐNG 6: BỆNH TUYẾN CƠ TỬ CUNG KHÔNG TRIỆU CHỨNG Một phụ nữ 40 tuổi, đã sanh 2 con, hiện không dùng bất cứ phương pháp tránh thai nào. Bà không có bất cứ triệu chứng lâm sàng nào đặc biệt. Bà đi khám phụ khoa định kỳ. Khám lâm sàng thấy tử cung cứng chắc, to khoảng tử cung mang thai 8 tuần, ngã sau, di động kém. Túi cùng sau chạm đau nhẹ. Siêu âm vào ngày thứ 5 của chu kỳ thấy tử cung to, dAP=47mm, có một vùng phản âm kém d=20mmx25mmx30mm, giới hạn không rõ, bên trong có mạch máu khi thực hiện siêu âm Doppler. 2 phần phụ không bất thường trên siêu âm. Bạn đã làm thêm cộng hưởng từ, xác nhận chẩn đoán bệnh tuyến cơ tử cung. Bạn cần làm gì để giải quyết tình trạng bệnh tuyến cơ tử cung? Chọn 1 phương án thích hợp nhất với tình huống
 - A. Không có chỉ định điều trị
 - B. Dùng thuốc viên tránh thai nội tiết estro-progestogen phối hợp
 - C. Có chỉ định của Gonadotropin Releasing Hormone agonist
 - D. O Có chỉ định của dụng cụ tử cung phóng thích Progestogen
 - E. Có chỉ định của thuyên tắc động mạch tử cung
 - F. OCó chỉ định của phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung
 - **G**. •

	IF AT							
C1	Α	В	С	D	E	F	G	0
C2	A	В	С	D	E	F	G	0
C3	A	В	С	D	E	F	G	0
C4	A	В	С	D	E	F	G	0
C5	A	В	С	D	E	F	G	0
C6	Α	В	С	D	E	F	G	0
	SCORE: 0							