



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST ĐỢT 2-2021 ►

Tiếp cận điều trị bệnh lý tiêu hóa liên quan acid dịch vị - Pretest đợt 2 (8/12/2021)

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Thành phần chính của bữa ăn như thế nào để PPI có tác dụng tốt nhất?

- ☐ a. Nhiều mỡ
- ☐ b. Nhiều tinh bột
- ☒ c. Nhiều đạm
- ☐ d. Nhiều rau

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 40 tuổi, được chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày - thực quản dựa vào triệu chứng ợ nóng và ợ trớ > 2 ngày/tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị với PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 12 tuần. Bệnh nhân vẫn than phiền triệu chứng ợ nóng và ợ trớ, nhiều nhất về đêm. Hướng xử trí nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. Chụp X-Quang thực quản cản quang
- ☐ b. Chụp cắt lớp vùng ngực có cản quang
- ☒ c. Đo pH và trớ kháng thực quản
- ☐ d. Nội soi siêu âm

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Nên sử dụng PPI đường uống như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

- ☒ a. Trước ăn 30 phút
- ☐ b. Ngay trước khi ăn
- ☐ c. Trong khi ăn
- ☐ d. Sau khi ăn 60 phút

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 66 tuổi, tiền căn nhồi máu não đang điều trị Aspirin và loét dạ dày Forrest III. Đánh giá nguy cơ loét dạ dày tá tràng của bệnh nhân này nếu sử dụng thuốc kháng viêm không steroid?

- ☐ a. Nguy cơ thấp
- ☐ b. Nguy cơ trung bình
- ☒ c. Nguy cơ cao
- ☐ d. Nguy cơ rất cao

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Nhóm bệnh nhân nào sau đây có NGUY CƠ CAO loét dạ dày tá tràng do sử dụng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID)?

- ☐ a. Tuổi > 60, NSAID liều cao và sử dụng đồng thời thuốc chống đông
- ☒ b. Tuổi > 65, NSAID liều cao và tiền căn loét dạ dày tá tràng không biến chứng
- ☐ c. Tuổi > 60, sử dụng đồng thời corticoid và tiền căn loét dạ dày tá tràng không biến chứng
- ☐ d. Tuổi > 65, NSAID liều thấp và sử dụng đồng thời Aspirin liều thấp

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, triệu chứng ợ nóng và ợ trớ 4 – 5 lần/tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm thực quản do trào ngược độ LA-A và viêm trợt dạ dày. Điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. Antacid trong 12 tuần
- ☒ b. PPI trong 8 tuần
- ☐ c. Alginate trong 12 tuần
- ☐ d. Phẫu thuật chống trào ngược

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Cách phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng phù hợp khi cần sử dụng kháng viêm không steroid (NSAID) cho bệnh nhân có nguy cơ loét dạ dày - tá tràng mức độ trung bình và nguy cơ tim mạch thấp là gì?

- ☐ a. Phối hợp Naproxen và PPI
- ☐ b. NSAID chọn lọc COX2
- ☒ c. Phối hợp NSAID và PPI
- ☐ d. NSAID liều thấp hiệu quả

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, đến khám vì triệu chứng ợ nóng và cảm giác nuốt nghẹn. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm thực quản do trào ngược độ LA-D. Điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. AntiH2 trong 8 – 12 tuần
- ☐ b. Antacid trong 8 – 12 tuần
- ☒ c. PPI trong 8 – 12 tuần
- ☐ d. Phẫu thuật

