

Pretest CBL sốc 2/12/21

...

* Bắt buộc


1. Họ và tên

*

Nhập câu trả lời của bạn

2. Ở bệnh nhi sốc, mục tiêu ScvO₂ cần đạt được là bao nhiêu?
(1 Điểm)

- ☐ D. 60% - 70%
- ☒ C. 70% - 80%
- ☐ B. 80% - 90%
- ☐ A. 90% - 100%

3. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu? 
(1 Điểm)

- ☐ B. 9 g/dL
- ☒ A. 10 g/dL
- ☐ C. 8 g/dL

☐ D. 7 g/dL

4. Trong chẩn đoán sốc ở trẻ em, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?
(1 Điểm)

- ☐ A. Chi mát
- ☒ B. Huyết áp giảm
- ☐ D. Lactate tăng
- ☐ C. CRT kéo dài

5. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc phản vệ là gì?
(1 Điểm)

- ☐ A. Dịch chống sốc
- ☐ D. Thở oxy
- ☒ C. Tăng co mạch
- ☐ B. Tăng co bóp cơ tim

6. Tổ - lớp

*

Nhập câu trả lời của bạn

7. Ở bệnh nhi sốc, khí máu động mạch có bất thường sau là phù hợp tình trạng giảm tưới máu?
(1 Điểm)

- ☐ C. Toan hô hấp
- ☐ A. Toan chuyển hoá, anion gap bình thường

☐ B. loạn chuyển hoá, anion gap tăng

☐ D. Kiềm chuyển hoá

8. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc giảm thể tích là gì?
(1 Điểm)

☐ A. Dịch chống sốc

☐ C. Tăng co mạch

☐ D. Thở oxy

☐ B. Tăng co bóp cơ tim

9. Triệu chứng nào sau đây cần nhập cấp cứu?
(1 Điểm)

☐ D. Ói nhiều không uống được

☐ B. Thở co lõm

☐ C. Tím trung ương

☐ A. Thở nhanh

10. Triệu chứng lâm sàng nào là quan trọng nhất trong chẩn đoán sốc?
(1 Điểm)

☐ B. Huyết áp giảm

☐ D. Chi mát

☐ C. Giảm tưới máu

☐ A. Mạch tăng

11. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng – nhọt da vùng cẳng chân (P), nhiễm từ cộng đồng, kháng sinh đầu tay thích hợp là gì?

ương, kháng sinh đầu tay thích hợp là gì?
(1 Điểm)

- ☐ A. Ceftriaxone
- ☐ D. Ceftazidim
- ☒ B. Vancomycin
- ☐ C. Meropenem

12. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu?
(1 Điểm)

- ☐ C. Albumin
- ☐ B. Natriclorua 3%
- ☒ A. Natriclorua 0,9%
- ☐ D. Dextrose 5% in lactate

13. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc nhiễm trùng là gì?
(1 Điểm)

- ☐ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☐ A. Đặt nội khí quản sớm
- ☐ D. Thở oxy
- ☒ C. Tăng co mạch

14. Trong các trẻ sau, trẻ nào nên được nhập cấp cứu?
(1 Điểm)

- ☐ B. Trẻ bị bỏng ở bàn tay (P)
- ☒ D. Trẻ bị hóc dị vật đường thở

- ☐ C. Trẻ bị gãy xương
- ☐ A. Trẻ 2 tuổi sốt co giật cách 1h, hiện hết giật còn sốt, ba trẻ lo lắng vì tiền căn có sốt co giật

15. Phân giai đoạn sốc dựa vào triệu chứng nào?

(1 Điểm)

- ☐ A. Mạch nhanh
- ☐ D. Huyết áp trung bình
- ☐ B. Huyết áp tâm thu
- ☐ C. Huyết áp tâm trương

16. Trong các xét nghiệm sau, xét nghiệm nào giúp chẩn đoán sốc?

(1 Điểm)

- ☐ D. Cây máu có vi khuẩn
- ☐ C. Khí máu toan chuyển hoá anion gap tăng
- ☐ A. Công thức máu có bạch cầu tăng
- ☐ B. CRP tăng

17. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu?

(1 Điểm)

- ☐ B. Natriclorua 3%
- ☐ D. Dextrose 5% in saline
- ☐ C. Albumin
- ☐ A. Lactate Ringer

18. Bệnh nhi sốc phản vệ, vận mạch đầu tay là gì?
(1 Điểm)

- ☒ A. Adrenalin
- ☐ D. Dobutamin
- ☐ C. Dopamin
- ☐ B. Noradrenaline

19. Bệnh nhi bị **sốc xuất huyết**, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu?
(1 Điểm)

- ☐ B. 9 g/dL
- ☐ C. 8 g/dL
- ☐ D. 7 g/dL
- ☒ A. 10 g/dL

20. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc tim là gì?
(1 Điểm)

- ☒ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☐ A. Dịch chống sốc
- ☐ D. Thở oxy
- ☐ C. Tăng co mạch

21. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, xét nghiệm nào cần theo dõi sát để đánh giá tình trạng tưới máu?
(1 Điểm)

- ☐ A. Công thức máu

☐ D. Khí máu động mạch

☐ B. Ure, creatinin

☐ C. AST, ALT

22. Tại sao bệnh nhi sốc cần thở oxy?
(1 Điểm)

☐ A. Bệnh nhân sốc có suy hô hấp kèm

☐ D. Tăng oxy hoà tan

☐ C. Tăng tưới máu

☐ B. Tăng liên kết của hồng cầu với oxy

Gửi

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | [Quyền riêng tư và cookie](#) | [Điều khoản sử dụng](#)