



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP DỊ TẬT LỖ TIỂU THẤP ĐẾN PHẪU THUẬT MUỘN TRÊN 3 TUỔI

*Báo cáo viên: Phạm Thị Thanh Tâm*



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# NỘI DUNG

---

**1. Đặt vấn đề**

**2. Mục tiêu nghiên cứu**

**3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu**

**4. Kết quả và bàn luận**


**5. Kết luận**

**6. Kiến nghị**



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐẶT VẤN ĐỀ



- Tỷ lệ 1/300 bé trai
- Phẫu thuật khó, dễ rò, hẹp niệu đạo → ảnh hưởng tâm lý trẻ và thân nhân
- Chọn thời điểm PT thích hợp



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐẶT VẤN ĐỀ

- Trước đây:  
Thời điểm phẫu thuật thích hợp:  
1- 3 tuổi
- Hiện nay:  
Thời điểm phẫu thuật thích hợp:  
6 - 18 tháng tuổi



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Phẫu thuật:

- Tuổi càng lớn biến chứng càng cao
- Càng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý trẻ

Tuổi càng lớn:

Sự lành mô càng kém

Tuổi bắt đầu dậy thì:

- Dương vật cương cứng
- Tiết dịch niệu đạo



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐẶT VẤN ĐỀ

- Tại Việt Nam, theo tác giả Châu Văn Việt và CS (2018): 41 bn (2 – 12T): Tỷ lệ rò và hẹp niệu đạo ở nhóm 6 – 15 tuổi > 2 – 3 tuổi, Nhóm trẻ đến phẫu thuật sau 3 tuổi > nhóm trước 3 tuổi.
- Tại khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 vẫn còn khá nhiều bệnh nhi đến phẫu thuật lỗ tiểu thấp sau 3 tuổi



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

## Mục tiêu tổng quát:

Đặc điểm các trường hợp dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn sau 3 tuổi tại khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 05/2019 đến tháng 09/2019



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

## Mục tiêu cụ thể:

1. Xác định tỉ lệ biến chứng sớm sau phẫu thuật lỗ tiểu thấp ở trẻ trên 3 tuổi
2. Xác định lý do trẻ dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn sau 3 tuổi





Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## Phương pháp nghiên cứu

Tiến cứu mô tả các trường hợp bệnh.

## Đối tượng nghiên cứu

Tất cả bệnh nhi được chẩn đoán tật lỗ tiểu thấp có thời điểm phẫu thuật lần đầu trên 3 tuổi nhập viện vào khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019.



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

---

- Thông tin thân nhân qua bảng thu thập số liệu

## **Tiêu chuẩn loại ra:**

- Bệnh nhi đã phẫu thuật tạo hình niệu đạo thì một
- Bệnh nhi không đầy đủ thông tin thu thập theo bảng thu thập số liệu



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## **Cỡ mẫu:**

Lấy trọn mẫu trong thời gian nghiên cứu

## **Thu thập số liệu:**

Theo bệnh án mẫu thiết kế sẵn



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

---

**Từ 5/2019 - 09/2019 có 62 bệnh nhi  
tham gia nghiên cứu (3 – 14 tuổi)**




# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

## Đặc điểm

## Nhóm tuổi




■ 3 - 6t ■ 6 - 10t ■ 10 - 15t



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

## Nơi cư trú



■ Tỉnh ■ Tp.HCM



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

## Biến chứng sớm sau phẫu thuật

Biến chứng sớm	Số BN có biến chứng	Tỉ lệ
Chảy máu vết mổ	0	0%
Nhiễm trùng vết mổ	2	3%
Rò niệu đạo	18	29%
Hẹp miệng sáo	0	0%
Hẹp niệu đạo	2	3%
Túi thừa niệu đạo	0	0%

Garnier.S & CS (2017):  
501BN(1– 16 tuổi):  
BN > 2 tuổi tỉ lệ biến chứng cao, BN > 13T chậm lành vết thương


Lê Công Thắng & CS:  
Rò sớm 21,8%, rò muộn 34,5%



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

## Tỉ lệ rò theo nhóm tuổi



Ali Ziada & cs (2011):  
61BN(6 tháng – 19tuổi):  
6BN (9,8%) biến chứng  
đều > 2 tuổi,  
>3T: 3 BN rò (15,8%)

Lê Thanh Hùng (1997 -  
2019)  
26 BN (2 – 15T) 23% rò






# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

## Biến chứng



Rò niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

## Biến chứng







# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

Trước phẫu thuật

Sau phẫu thuật



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

---

Có 62 thân nhân là cha (mẹ) của 62 bệnh nhi trong nghiên cứu được:


- Thu thập thông tin
- Tham gia trả lời câu hỏi



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

*Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn*

## Trình độ học vấn của cha (mẹ) trẻ



■ Cấp 1

■ Cấp 2

■ Cấp 3

■ Đại học



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

## Lý do gia đình đưa trẻ đến mổ sau 3 tuổi

Lý do đưa trẻ đến mổ sau 3 tuổi	Số Thân nhân	Tỉ lệ (%)
Không nhận thấy sự bất thường (không biết trẻ bị lỗi tiểu thấp)	19	30,6%
Biết nhưng chưa muốn trẻ phẫu thuật	11	17,7%
Nhân viên y tế hướng dẫn chưa đúng	8	12,9%
Chưa đủ chi phí	7	11,3%
Bệnh lý đi kèm phải điều trị trước đó	7	11,3%
Hoãn mổ do trẻ hay bị bệnh	7	11,3%
Khác (lịch mổ xếp xa)	3	4,8%

Châu văn Việt & CS (2018): Nhóm trẻ đến phẫu thuật sau 3 tuổi > nhóm trước 3 tuổi, có thể do gia đình không biết, tình cờ phát hiện khi đi khám bệnh.



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

## Tỉ lệ nhận biết dị tật ở trẻ theo trình độ học vấn của cha (mẹ)

Trình độ	Không biết trẻ bất thường lỗi tiểu (N=19)	Tỷ lệ %
<b>Cấp 1</b>	<b>8</b>	<b>42,1%</b>
Cấp 2	6	31,6%
Cấp 3	4	21%
Đại học	1	5,3%



# KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

Nơi cư trú:

- Có 50/62 gia đình trẻ (80,6%) : Ở tỉnh
- Có 12 gia đình ở thành phố (19,4%).

➡ Phụ huynh cư trú ở thành phố có điều kiện tiếp cận đến việc chăm sóc sức khỏe cho con cháu dễ dàng hơn khi cư trú ở xa thành phố.





Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# KẾT LUẬN

- Biến chứng rò sau phẫu thuật ở trẻ dị tật lỗ tiểu thấp trên 3 tuổi 28%, đặc biệt tuổi càng lớn biến chứng càng cao (nhóm 6 – 10 tuổi rò 36,3%; 10 -15 tuổi rò 45,4%).
- Lý do thân nhân đưa trẻ đến phẫu thuật sau 3 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là: không phát hiện bệnh của con 30,6%.



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# KẾT LUẬN

- Biết bệnh nhưng thiếu thông tin chính xác về bệnh, không được tư vấn về độ tuổi phẫu thuật 17,7%.
- Ngoài ra nơi cư trú cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc điều trị sớm ở trẻ bệnh.



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

# KIẾN NGHỊ

- Tổ chức tập huấn công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho:
  - Nhân viên trong khoa & NV phòng khám
  - Học viên tuyến tỉnh
- Nhân rộng việc phát tờ rơi về bệnh lổ tiểu thấp khi thân nhân đưa trẻ đến khám
- Truyền thông giáo dục cho thân nhân qua các kênh dễ tiếp cận: Ti vi, báo điện tử...



Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn

---

