



SẢN KHOA (OBSTETRICS)

Dashboard ► My courses ► SK ► CHUYÊN ĐỀ 5: QUẢN LÝ CUỘC CHUYỂN DẠ ► PRETEST chuyên đề 5 phần 2

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

A

Tại thời điểm bắt đầu có chuyển dạ, yếu tố nào cho phép dự báo rằng cuộc chuyển dạ sẽ diễn biến thuận lợi?

Select one:

- ☐ a. Ngôi là một ngôi chòm cúi tốt, trình diện trước eo trên bằng kiểu thể trước
- ☐ b. Chuyển dạ được đánh giá là nguy cơ thấp dựa theo check-list của WHO
- ☐ c. Tần số, cường độ cơn co tử cung phù hợp với giai đoạn của chuyển dạ
- ☐ d. Kết quả khám lâm sàng khung chậu tương hợp với ước lượng cân thai

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

D

Liên quan đến đường kính lọt lí thuyết và đường kính lọt thực hành của ngôi chòm trong cơ chế sanh bình thường, phát biểu nào là chính xác?

Select one:

- ☐ a. Hai đường kính này cắt nhau, tạo ra một mặt phẳng
- ☐ b. Số đo của hai đường kính này xấp xỉ nhau # 9.5 cm
- ☐ c. Phương của hai đường kính này vuông góc với nhau
- ☐ d. Cả 3 phát biểu trên về hai đường kính lọt cùng đúng

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

A

Số đo của hai đường kính lọt lí thuyết và thực hành của ngôi chỏm thay đổi ra sao khi ngôi lọt khó khăn?

Select one:

- ☐ a. Ngôi sẽ cố gắng để lọt bằng cách thay đổi số đo của đường kính lọt thực hành
- ☐ b. Ngôi sẽ cố gắng để lọt bằng cách thay đổi số đo của đường kính lọt lí thuyết
- ☐ c. Ngôi sẽ cố gắng để lọt bằng cách thay đổi số đo của cả hai đường kính lọt
- ☐ d. Dù gặp khó khăn khi lọt, nhưng số đo của 2 đường kính lọt vẫn bất biến

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

C

Khi chuyển dạ đang diễn tiến, yếu tố nào cho phép dự báo rằng cuộc chuyển dạ sẽ có chiều hướng bất lợi?

Select one:

- ☐ a. Khám lâm sàng ghi nhận màng ối đã vỡ trước thời điểm cổ tử cung mở trọn
- ☐ b. Khám lâm sàng ghi nhận ngôi chỏm có bướu huyết thanh, bất kể vị trí ngôi
- ☐ c. Sản đồ cho thấy vị trí của ngôi thai đi xuống không thỏa đáng theo thời gian
- ☐ d. Sản đồ cho thấy đường biểu diễn cổ tử cung nằm ở bên phải của đường báo động

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

C

Khám một chuyển dạ ngôi chỏm, dấu hiệu nào gợi ý ngôi có thể đã gặp khó khăn khi nỗ lực để lọt qua eo trên?

Select one:

- ☐ a. Xác định rõ được thóp sau ở vị trí 7 giờ
- ☐ b. Chỉ sờ được một phần của thóp trước
- ☐ c. Sờ thấy một phần vành tai của thai
- ☐ d. Sờ thấy đầu có bướu huyết thanh

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

B

Trong cuộc sanh ngôi chỏm, khi nào thì trị tuyệt đối của góc xoay ngoài thì 2nd là 45° ?

Select one:

- ☐ a. Trong mọi trường hợp, trị tuyệt đối của góc này luôn khác 45°
- ☐ b. Trong mọi trường hợp, trị tuyệt đối của góc này luôn bằng 45°
- ☐ c. Trong trường hợp ngôi chỏm đã lợt theo kiểu thể chéo trước
- ☐ d. Trong trường hợp ngôi chỏm đã lợt theo kiểu thể chéo sau

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

A

Trong cuộc sanh ngôi chỏm, khi nào thì ngôi sẽ ở kiểu thể chằm ngang sau khi hoàn tất xoay ngoài thì 2nd?

Select one:

- ☐ a. Ngôi chỏm luôn ở thể ngang sau hoàn thành xoay ngoài thì 2nd
- ☐ b. Trong trường hợp ngôi chỏm đã lợt theo kiểu thể chéo trước
- ☐ c. Trong trường hợp ngôi chỏm đã lợt theo kiểu thể chéo sau
- ☐ d. Trong trường hợp ngôi chỏm đã lợt theo kiểu thể ngang

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

D

Trong cơ chế sanh ngôi chỏm, thành tố nào là động lực của hiện tượng xoay trong của ngôi?

Select one:

- ☐ a. Trở kháng của đường sanh
- ☐ b. Lực đẩy của cơ co tử cung
- ☐ c. Phản lực của tầng sinh môn
- ☐ d. Tổng mô-men lực lên ngôi thai

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

A

Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào gợi ý mạnh nhất một chuyển dạ đang bị tắc nghẽn?

Select one:

- ☐ a. Ngồi không lọt hay lọt không đối xứng hay không xuống
- ☐ b. Đường biểu diễn mở cổ tử cung đã chạm đường hành động
- ☐ c. Cơ co tử cung tăng về tần số, cường độ và trương lực căn bản
- ☐ d. Có bất thường kích thước khung chậu trên lâm sàng hay quang kích

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

D

Mục đích chủ yếu của việc thực hiện phá ối là gì?

Select one:

- ☐ a. Nhằm xé bỏ các màng ối, là yếu tố ngăn cản thì lọt và xuống
- ☐ b. Nhằm làm giảm áp lực trong buồng ối, giúp tăng hiệu quả cơn co
- ☐ c. Nhằm kích thích cổ tử cung, gây tăng tiết oxytocin, giúp tăng cơn co
- ☐ d. Nhằm thay yếu tố nong cổ tử cung, để đầu thai nong trực tiếp thay vì đầu ối

Question 11

Not yet
answered

Marked out of
1.00

B

Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam xếp Oxytocin vào nhóm thuốc nào?

Select one:

- ☐ a. Thuốc độc bảng A
- ☐ b. Thuốc độc bảng B
- ☐ c. Thuốc cần kê toa
- ☐ d. Thuốc giảm độc

Question 12

Not yet
answered

Marked out of
1.00

D

Chuyển dạ giai đoạn I, nếu bắt đầu truyền lại oxytocin sau một khoảng tạm nghỉ vì một lí do nào đó, cần lưu ý gì?

Select one:

- ☐ a. Bắt đầu lại với tốc độ truyền chậm hơn tốc độ trước khi tạm ngưng
- ☐ b. Bắt đầu lại với tốc độ truyền bằng với tốc độ trước khi tạm ngưng
- ☐ c. Bắt đầu lại với tốc độ truyền cao hơn tốc độ trước khi tạm ngưng
- ☐ d. Bắt đầu với liều **tối thiểu**, như chưa từng dùng oxytocin trước đó

Question 13

Not yet
answered

Marked out of
1.00

C

Gây tê ngoài màng cứng giảm đau sản khoa có thể gây ảnh hưởng bất lợi lên giai đoạn nào của chuyển dạ?

Select one:

- ☐ a. Xóa mở cổ tử cung ở giai đoạn I
- ☐ b. Thì xuống của ngôi ở giai đoạn II
- ☐ c. Thì xoay và sổ thai ở giai đoạn II
- ☐ d. Tất cả các thì xảy ra ở giai đoạn III

Question 14

Not yet
answered

Marked out of
1.00

A

Làm gì trước tiên khi thấy cơn co cường tính ở thai phụ đang chuyển dạ và đang được truyền oxytocin?

Select one:

- ☐ a. Phải ngưng ngay tức khắc oxytocin, trước khi thực hiện bất cứ hành động nào khác
- ☐ b. Dừng ngay thuốc giảm co truyền tĩnh mạch, trước khi thực hiện mọi can thiệp khác
- ☐ c. Thực hiện ngay việc đi tìm, xác định hay loại bỏ khả năng có chuyển dạ bị tắc nghẽn
- ☐ d. Thực hiện mổ sanh trong điều kiện tối khẩn, đồng thời chuẩn bị máu, hồi sức trẻ ngạt

Question 15

Not yet
answered

Marked out of
1.00

C

Trong chuyển dạ, yếu tố nào gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình xuống của một ngôi chỏm đã lọt thành công?

Select one:

- ☐ a. Có thực hiện gây tê ngoài màng cứng
- ☐ b. Lực cản của tầng sinh môn quá lớn
- ☐ c. Bất thường của cơ co tử cung
- ☐ d. Ngôi chỏm, đầu cúi không tốt

Question 16

Not yet
answered

Marked out of
1.00

A

Sản đồ vừa chạm/cắt đường hành động, và cổ tử cung đã mở trọn, thái độ nào là phù hợp nhất?

Select one:

- ☐ a. Khám đánh giá tình trạng ngôi để có quyết định
- ☐ b. Hướng dẫn và bắt đầu cho thai phụ rặn sanh
- ☐ c. Chấm dứt ngay chuyển dạ bằng giúp sanh
- ☐ d. Chấm dứt ngay chuyển dạ bằng mổ sanh

Question 17

Not yet
answered

Marked out of
1.00

D

Ý nghĩa của triệu chứng "vòng Bandl" là gì?

Select one:

- ☐ a. Là triệu chứng xuất hiện sớm nhất khi có dọa vỡ tử cung
- ☐ b. Là triệu chứng xuất hiện muộn khi tử cung sắp bị vỡ
- ☐ c. Là dấu hiệu sinh lí, thấy rõ khi ngôi ở kiểu thể sau
- ☐ d. Ý nghĩa của nó thay đổi theo triệu chứng đi kèm

Question 18

Not yet
answered

Marked out of
1.00

B

Khi có băng huyết sau sanh nhưng chưa xác định nguyên nhân, lựa chọn nào là ưu tiên để thực hiện cầm máu?

Select one:

- ☐ a. Thuốc chống li giải fibrin
- ☐ b. Oxytocin truyền tĩnh mạch
- ☐ c. Các chế phẩm ergot alkaloid
- ☐ d. Các chất tương tự prostaglandin

Question 19

Not yet
answered

Marked out of
1.00

D

Khi điều chỉnh huyết áp sau sinh bằng oxytocin, chọn đường dùng nào để có được hiệu quả tối ưu?

Select one:

- ☐ a. Tiêm bắp (mông)
- ☐ b. Tiêm cơ tử cung
- ☐ c. Tiêm tĩnh mạch
- ☐ d. Truyền tĩnh mạch

Question 20

Not yet
answered

Marked out of
1.00

B

Điểm số Apgar được tính từ 5 yếu tố. Nếu bạn rút gọn xuống còn 2 yếu tố, bạn sẽ chọn 2 yếu tố nào?

Select one:

- ☐ a. Màu da và hô hấp
- ☐ b. Hô hấp và nhịp tim
- ☐ c. Nhịp tim và phản xạ
- ☐ d. Phản xạ và màu da

