

Đề thi ngoại thần kinh

1. Những thương tổn nào sau đây là thương tổn nguyên phát ngoại trừ:

- A. Nứt sọ
- B. Dập não
- C. Tổn thương sợi trục lan tỏa
- D. Đứt tĩnh mạch liên lạc

☒ E. Máu tụ ngoài màng cứng

2. Những thương tổn nào sau đây là thương tổn thứ phát ngoại trừ:

☒ A. Máu tụ dưới màng cứng

Ủa là sao? tóm lại mấy cái tụ máu là nguyên phát hay thứ phát?

- B. Phù não
- C. Tăng áp lực nội sọ
- D. Thiếu oxy não
- E. Máu tụ trong sọ

3. Máu tụ ngoài màng cứng thường được giới hạn bởi:

- A. Vỏ não
- B. Đám rối mạch mạc
- C. Lều tiểu não
- D. Liềm đại não

☒ E. Đường khớp sọ

4. Máu tụ dưới màng cứng, nguồn chảy máu thường là:

A. Động mạch và tĩnh mạch não

☒ B. Tĩnh mạch màng mềm

- C. Đám rối mạch não thất bên
- D. Đám rối mạch não thất IV
- E. A và B đúng

5. Máu tụ ngoài màng cứng, nguồn chảy máu thường là:

☒ A. Xương sọ và động mạch màng não giữa

B. Tĩnh mạch Gales

- C. Đám rối mạch mạc
- D. Động mạch não trước
- E. Động mạch và tĩnh mạch vỏ não

6. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là máu tụ trong khoảng thời gian:

- A. Trong vòng 5 ngày đầu
- ☒ B. Trong vòng 3 ngày đầu
- C. Trong vòng 10 ngày đầu
- D. Trong vòng 16 ngày đầu
- E. Không xác định thời gian

7. Máu tụ dưới màng cứng mãn tính là máu tụ trong khoảng thời gian:

- ☒ A. Sau 21 ngày
- B. Từ 3 đến 21 ngày
- C. Từ 7 đến 20 ngày
- D. Từ 10 đến 14 ngày
- E. Từ 5 đến 14 ngày

8. Trong tổn thương sợi trục lan tỏa, CT Scan có thể phát hiện tổn thương ở vị trí nào sau đây?

- A. Xuất huyết não thùy trán
- ☒ B. Chấm xuất huyết ở chất trắng dưới vỏ, thè chai, thân não
- C. Xuất huyết thùy thái dương và chẩm
- D. Tất cả các vị trí kể trên
- ☒ E. Không vị trí nào kể trên

9. Dựa vào thang điểm Glasgow, chấn thương sọ não nặng có Glasgow:

- A. Dưới 2đ
- ☒ B. Từ 3- 8đ
- C. Từ 3- 9đ
- D. Từ 6- 9 đ
- E. Từ 3-12 đ

1

5

1

10. Bệnh nhân kích thích đau mở mắt, đáp ứng đau chính xác, không đáp ứng lời nói có thang điểm Glasgow:

- A. 11
- B. 10
- C. 9
- D. 8**
- E. 7

11. Chỉ định phẫu thuật ở máu tụ ngoài màng cứng: chọn A

- A. Thể tích khối máu tụ trên 30 cm^3
- B. Bề dày khối máu tụ trên 15mm
- C. Đường giữa lệch trên 5mm
- D. A,B,C đúng**
- E. A,B đúng

12. Chỉ định phẫu thuật của máu tụ dưới màng cứng cấp tính: chọn E

- A. Bề dày khối máu tụ trên 1 cm
- B. Thể tích khối máu tụ trên 30 cm^3
- C. Lệch đường giữa trên 5 mm/ dây trên 5 mm
- D. A, B , C đúng

10

có 1 slide ghi 5, có slide ghi 10

E. A, C đúng

13. Bệnh nhân nam 35 tuổi, nhập cấp cứu BV CR, vì tai nạn giao thông, không có đội mũ bảo hiểm, trong tình trạng tỉnh, Glasgow 14đ, sung nề thái dương P. Trong lúc chờ chụp CT Scan sọ não, Glasgow giảm còn 10đ. Dẫn đồng tử mắt P 4mm, phản xạ ánh sáng yếu, Xử trí của bạn:

A. Truyền manitol, chảy nhanh, liều lượng 1 mg/ kg và chụp CT Scan sọ não khẩn

B. Truyền manitol, chảy nhanh, liều lượng 1g/kg và chụp CT Scan sọ não khẩn

C. Truyền nhanh dung dịch NaCl 0,9 % và chụp CT Scan sọ não khẩn

D. Truyền manitol, 30 giọt/ phút, liều lượng 1 g/kg và chụp CT Scan sọ não khẩn

E. Tiếp tục theo dõi tri giác chưa cần xử trí gì thêm

XÓA PAGE TỪ ĐÂY TRỞ XUỐNG ĐI UYÊN