


Uyên: khoanh tròn xanh

# THI LÝ THUYẾT UNG BƯỚU ĐỢT 2

Đề: gồm 100 câu thi trong 75 phút

- Câu 1: Bn thấy 1 khối ở cổ cạnh khí quản, bạn sẽ làm gì đầu:
- A. Cho bệnh nhân nuốt xem liên quan đến khí quản
  - B. Khám hạch cổ di can
  - ☒ C. Siêu âm cổ
  - D. FNA



#### 7.1.5 Sinh thiết các tổn thương vú không sờ thấy

Các tổn thương ở vú không sờ thấy thường được phát hiện qua siêu âm, hoặc nhũ ảnh hoặc MRI vú từ BIRADS IV trở lên cần sinh thiết xác định bản chất sang thương.

Các phương pháp sinh thiết này được hướng dẫn bởi các phương tiện chẩn đoán hình ảnh cho phép sinh thiết trọn sang thương dưới định vị siêu âm, nhũ ảnh hoặc MRI bằng VABB hoặc cắt rộng sang thương mô hờ dưới định vị bằng chất màu, định vị qua dây kim hoặc đồng vị phóng xạ.

Các phương pháp định vị này có thể giúp chẩn đoán hoặc đôi khi là điều trị nếu lấy đủ rộng sang thương qua sinh thiết. Cần phải chụp bệnh phẩm kiểm tra để đảm bảo lấy hết sang thương cũng như để đánh giá rìa diện cắt.

Câu 11: Bệnh nhân nữ, tầm soát ung thư vú, khám lâm sàng không thấy bất thường, nhũ ảnh có 1 nang thông đến đầu núm, birads 4A, FNA ra viêm vú dạng nhú, sẽ làm

- A. Theo dõi
- B. Sinh thiết lại
- C. MRI vú

☒ D. Sinh thiết áp lực. ←

Câu 12: Chuẩn đoán trong ung thư vú, chọn câu đúng:

- A. Giải phẫu bệnh là quan trọng nhất
- ☒ B. Sự tương thích giữa các test chẩn đoán quan trọng nhất
- C. Khám lâm sàng quan trọng nhất
- D. Hình ảnh là quan trọng nhất

Câu 13: Nhóm hạch thường di căn nhất trong UT vú

- ☒ A. Hạch nhóm I
- B. Hạch nhóm II
- C. Roter ←
- D. Vú trong

Câu 14: Nguy cơ một người phụ nữ suốt cả cuộc đời bị ung thư vú là?

- A. 10%
- ☒ B. 12% 12,4%
- C. 14%
- D. 16%

Câu 15: Bệnh nhân đã được chẩn đoán là ung thư vú trái, dạo gần đây thấy mắt nhìn mờ, yếu liệt 1 bên người. Dạng ung thư vú được nghĩ nhiều nhất là?

- A. Luminal A
- B. Luminal B
- ☒ C. Tam âm giống đày hay Her 2+
- D. Cả 3 loại trên.

crop đoạn đó vô nhe Uyên

Di căn xa có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào trong diễn tiến tự nhiên của bệnh, thậm chí ở giai đoạn bệnh rất sớm. Phân nhóm luminal thường cho di căn muộn (5-10 năm sau chẩn đoán), do đó thời gian sống kéo dài. Ngược lại, các phân nhóm giống đày thường di căn trong vòng 2 năm sau chẩn đoán dẫn đến tiên lượng kém. Di căn nào lại thường gặp ở nhóm tam âm hoặc HER2 (+). Trong khi đó, phân nhóm luminal thường cho di căn xương nhiều hơn di căn tạng.

Câu 16: Bệnh nhân được chẩn đoán Ung thư vú trái T1N0M0 giai đoạn I, luminal A xử trí không thích hợp trên bệnh nhân là?

Nội tiết (+), HER2 (-), Ki67 thấp

- A. Nội tiết
- B. Nạo hạch nách
- ☒ C. Liệu phát trúng đích
- D. Hoá trị

Câu 17: Bệnh nhân đến khám vì ra huyết âm đạo, khám phụ khoa thấy bướu 3cm gần mép sau, phương pháp lấy mô bệnh học là?

- A. Khoét chóp
- ☒ B. Sinh thiết bằng kiềm
- C. FNA
- D. Core biopsy

Câu 18: Ung thư cổ tử cung thường xuất phát từ phần nào?

- A. Vùng thận tử cung
- ☒ B. Vùng chuyển tiếp
- C. Cổ trong
- D. Cổ ngoài

Câu 19: Triệu chứng thường gặp nhất của ung thư cổ tử cung

- ☒ A. Xuất huyết âm đạo bất thường.
- B. Ra dịch âm đạo bất thường.
- C. Khối u ở bụng.
- D. Đau hạ vị.


Câu 20: Cận lâm sàng hình ảnh nào đánh giá tốt nhất xâm lấn trong ung thư cổ tử cung?

- A. CT bụng chậu có cản quang.
- ☒ B. MRI bụng chậu.
- C. PET-CT
- D. Siêu âm bụng chậu


Câu 21: Diễn tiến tự nhiên ung thư cổ tử cung ÍT gặp nhất?


- A. Xâm lấn chu cung gây siết chặt niệu quản
- ☒ B. Xâm lấn trực tràng
- C. Xâm lấn thân tử cung
- D. Xâm lấn âm đạo-cùng đồ

Câu 24: Bn nữ, 57 tuổi bị xuất huyết âm đạo sau mãn kinh, khám phụ không thấy bất thường, việc đầu tiên nên làm cho bệnh nhân?

- ☒ A. Siêu âm bụng
  - B. Chức năng đông máu
  - C. MRI chậu
  - D. Nạo sinh thiết lòng tử cung
- 

Câu 28: Bà X có mẹ bị ung thư vú và cô không muốn đoạn nhũ phòng ngừa, tái tạo như diễn viên Angelina Jolie, cô quyết định khám theo lịch tầm soát UT vú, đây là ví dụ dự phòng bậc mấy?

- A. Bậc 1
  - ☒ B. Bậc 2
  - C. Bậc 3
  - D. Bậc 4
- 







Câu 58: Xét nghiệm nào cần làm đầu tiên khi nghi ngờ bệnh nhân có K tuyến giáp?

- ☒ A. Siêu âm
- ☐ B. CT scan vùng cổ
- ☒ C. FNA
- ☐ D. TSH



Nghi ngờ trên Is hay nghi ngờ sau khi có kết quả SA?