

Mã số sinh viên \*

111170299

Email UMP \*

ptthao.y17@ump.edu.vn

**Câu 1:** Điều trị nội khoa đơn thuần viêm thận bể thận sinh hơi có tỉ lệ tử vong vào khoảng? \*

- ☐ 10 - 20%
- ☐ 20 - 40%
- ☐ 40 - 60%
- ☒ 60 - 80%

**Câu 2:** Thời gian điều trị viêm bàng quang không biến chứng là bao lâu? \*

- ☒ 3 - 7 ngày
- ☐ 7 - 10 ngày
- ☐ 10 - 14 ngày
- ☐ 14 - 21 ngày



**Câu 3:** Để phòng ngừa nhiễm trùng tiểu do đặt thông niệu đạo, câu nào sau đây \* đúng?

- ☐ Có thể sử dụng hệ thống dẫn lưu hở
- ☒ Đặt thông niệu đạo nên được nhân viên y tế được đào tạo thuần thực thực hiện
- ☐ Đối với thông niệu đạo đặt lâu dài, cần thiết thay thông niệu đạo mỗi 2 tuần
- ☐ Chăm sóc thông niệu đạo 4 lần/ngày

**Câu 4:** Các cơ quan thuộc đường tiết niệu sau đây có các cơ chế giải phẫu và sinh \* lý giúp bảo vệ đường tiết niệu khỏi nhiễm trùng tiểu, **NGOẠI TRỪ?**

- ☐ Bàng quang
- ☐ Niệu quản
- ☒ Tuyến tiền liệt
- ☐ Âm đạo

**Câu 5:** Thời gian điều trị viêm tiền liệt tuyến cấp là bao nhiêu lâu? \*

- ☐ 03 ngày
- ☐ 07 ngày
- ☐ 10 ngày
- ☒ 30 ngày



**Tình huống lâm sàng sau đây sử dụng cho câu 6,7:**

\*

Bệnh nhân nữ 28 tuổi, đã lập gia đình. Bệnh nhân rất lo lắng vì nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát nhiều lần.

**Câu 6:** Các biện pháp không dùng thuốc nào sau đây nên được áp dụng để phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát?

- ☐ Uống ít nước
- ☐ Nên dùng thuốc diệt tinh trùng
- ☒ Tiểu sạch trước và sau khi giao hợp
- ☐ Dùng nước rửa vệ sinh phụ nữ có tính acid

**Câu 7:** Kháng sinh dự phòng sau giao hợp sau đây đều có thể sử dụng **NGOẠI TRỪ** một loại nào sau đây?

\*

- ☐ Nitrofurantoin
- ☒ Ceftriaxone
- ☐ Ciprofloxacin
- ☐ Trimethoprim-sulfamethoxazole



**Câu 8:** Bệnh nhân nam, 63 tuổi, nhập viện vì sốt cao. Khoảng 3 ngày nay, bệnh nhân sốt cao, tiểu khó, ít dần và bí tiểu. Tiền căn 06 tháng nay bệnh nhân tiểu đêm, tiểu khó phải rặn, dòng nước tiểu yếu. Khám: tỉnh tiếp xúc được, vẻ đờ. Mạch 120 lần/phút, huyết áp 90/70 mmHg, nhiệt độ 39°C, nhịp thở 20 lần/phút. Tim đều, nhanh, không âm thổi. Phổi phế âm đều hai bên, không ran bệnh lý. Bụng mềm, sờ được khối cầu bàng quang ở vùng hạ vị.

Sau biện pháp can thiệp kể trên, bệnh nhân được cấy máu và nước tiểu. Kháng sinh nào sau đây có thể sử dụng cho bệnh nhân thích hợp nhất?

- ☐ Cefpodoxim
- ☐ Cefixim
- ☐ Nitrofurantoin
- ☒ Levofloxacin

Gửi

Xóa hết câu trả lời

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. [Báo cáo lạm dụng](#) - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)

Google Biểu mẫu

