

NGOẠI NHI - PEDIATRIC SURGERY (Trưởng BM: PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh - Phó BM: TS. Trương Đình Khải)

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► Pediatric Surgery ► PRE-TEST ► CBL Thân nước - Pretest

Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chọn câu đúng đối với thận ứ nước.

- a. Là một bệnh đường tiết niệu mắc phải ở trẻ em
- O b. Có thể do hẹp khúc nối bể thận niệu quản bẩm sinh
- c. Có thể do sỏi bể thận hay sỏi niệu quản hay do những nguyên nhân khác
- 🔾 🎜 âu b.c đúng

Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thận ứ nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản

- a. Là một vấn đề cấp cứu cần chuyển viện ngay càng sớm càng tốt
- b. Kháng sinh đóng vai trò quan trọng trường hợp có nhiễm tiểu
- c. Nhiễm trùng tiểu nếu có là nhiễm trùng tiểu thông thường đáp ứng kháng sinh
- d. Phẫu thuật luôn là điều trị tiêu chuẩn cho mọi trường hợp thận ứ nước

| Question 3 Not yet answered Marked out of 1.00 | Với những phương tiện hình ảnh học ngày càng tiến bộ. Thận ứ nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản được chẩn đoán dựa vào a. Tình huống thường gặp nhất trên lâm sàng là nhiễm trùng tiểu b. Tình huống thường gặp nhất trên lâm sàng là đau bụng c. huống thường gặp nhất là siêu âm phát hiện trong bào thai |
|--|--|
| | d. Tình huống nào thì cũng phải can thiệp phẫu thuật giải quyết tắc nghẽn |
| | |
| Question 4 Not yet answered | Thận nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản |
| Marked out of | a. Là bất thường bẩm sinh đường tiết niệu |
| 1.00 | b. Nguyên nhân do tắc nghẽn trong lòng niệu quản |
| | c. Nguyên nhân do chèn ép từ ngoài vào |
| | od. các câu trên đều đúng |
| | |
| Question 5 Not yet answered | Thận ứ nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản |
| Marked out of | a. thể tự giới hạn theo thời gian |
| 1.00 | b. Phẫu thuật chỉ đặt ra trong trường hợp thận ứ nước kéo dài không thay đổi |
| | c. Đau bụng là triệu chứng quan trong nhất cần phải có để chỉ định phẫu thuật |
| | od. Không câu nào đúng |

