

**ĐỀ KIỂM TRA NGOẠI LẦN 1**  
**YLT NĂM 4 TP HCM - NGÀY 6/03/2014 (60 PHÚT)**  
Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

- A. Trong chấn thương bụng kín, tạng đặc bị thương tổn ít hơn tạng rỗng
- B. Trong chấn thương bụng kín, tạng đặc bị thương tổn tương đương với tạng rỗng
- ☒ C. Trong vết thương bụng, tạng đặc bị thương tổn nhiều hơn tạng rỗng
- D. Trong vết thương bụng, tạng đặc bị thương tổn tương đương với tạng rỗng
- ☒ E. Trong vết thương bụng, tạng đặc bị thương tổn ít hơn tạng rỗng
57. Trong chấn thương bụng kín, phân độ tổn thương gan chủ yếu dựa vào:
- A. X quang bụng đứng không sửa soạn
- B. Siêu âm bụng
- C. Doppler bụng
- ☒ D. CT bụng
- E. Soi ổ bụng chẩn đoán
58. Trong chấn thương / vết thương bụng, vai trò chính của siêu âm:
- A. Chẩn đoán vỡ tạng rỗng
- B. Phân độ vỡ tạng đặc
- ☒ C. Là phương tiện đầu tay để chẩn đoán chảy máu trong
- D. Là phương tiện đầu tay để chẩn đoán viêm phúc mạc
- E. Xác định có thủng lá phúc mạc thành
59. Vai trò của CT trong chấn thương bụng kín. Chọn câu **KHÔNG PHÙ HỢP**
- A. Có giá trị trong chẩn đoán tụ máu sau phúc mạc
- B. Có thể khảo sát nhiều bộ phận ở bệnh nhân đa thương
- C. Chẩn đoán, phân loại tổn thương gan, lách, thận với độ đặc hiệu cao
- ☒ D. Là phương tiện đầu tay để chẩn đoán vỡ tạng rỗng
- E. Rất có giá trị chẩn đoán ở bệnh nhân mà thăm khám lâm sàng còn nghi ngờ
60. Trong chấn thương bụng kín, chỉ định chọc dò ổ bụng:
- A. Thường qui cho mọi trường hợp
- B. Khi lâm sàng có hội chứng chảy máu trong rõ rệt
- C. Khi siêu âm thấy rõ có máu trong xoang phúc mạc
- D. Khi CT thấy có vỡ gan hoặc lách
- ☒ E. Khi lâm sàng nghi ngờ có chảy máu trong và cơ sở y tế chưa được trang bị máy siêu âm

**HẾT**