



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ►

Pretest -Tiếp cận điều trị bệnh lý tiêu hóa liên quan đến acid dịch vị - Đợt 1 - 10/11/2021

Started on Wednesday, 10 November 2021, 6:00 PM

State Finished

Completed on Wednesday, 10 November 2021, 6:06 PM

Time taken 6 mins 30 secs

Question 1

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 28 tuổi, than phiền triệu chứng ợ nóng 3 – 4 lần/tuần

thường xuyên ≥ 2 lần/w

trong 4 tuần nay. Bệnh nhân mua antacid uống trong 2 tuần, triệu chứng

=> điều trị bằng PPI

không giảm. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm thực quản trào ngược độ LA-A.

Bệnh nhân nên được điều trị với PPI trong thời gian bao lâu?

8-12 tuần

triệu chứng thường xuyên, tại thực quản: PPI liều chuẩn, 1 lần/ ngày

- ☐ a. 2 tuần
- ☐ b. 4 tuần
- ☐ c. 6 tuần
- ☒ d. 8 tuần

Question 2

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, viêm thực quản do trào ngược độ LA-A. Bệnh nhân được điều trị với PPI 1 lần/ngày trong 8 tuần. Sau ngưng thuốc 12 tuần, bệnh nhân xuất hiện lại triệu chứng ợ nóng và ợ trớ 3 – 4 lần/ngày. Điều trị nào sau đây thích hợp cho bệnh nhân này?

tái phát sau ngưng >3 tháng => điều trị lại giống đợt trước mức đang hiệu quả

tái phát:

- điều trị từng đợt 2w

- hoặc điều trị khi có triệu chứng

- ☐ a. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 8 tuần
- ☐ b. PPI liều thấp 1 lần/ngày duy trì trong 12 tuần
- ☐ c. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 4 tuần
- ☒ d. PPI liều chuẩn theo nhu cầu

Question 3

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, mang thai 34 tuần, than phiền triệu chứng ợ nóng 3 lần/tuần. Điều trị nào sau đây phù hợp nhất?

- ☐ a. Nằm nghiêng phải
- ☐ b. Nên ăn bữa cuối trước khi ngủ đêm 1 giờ
- ☒ c. Sử dụng Alginate
- ☐ d. Sử dụng Sodium bicarbonate

Question 4

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, 38 tuổi đến khám vì triệu chứng ợ nóng. Nội soi ghi nhận viêm thực quản do trào ngược độ LA-C. Điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày phối hợp Alginate trong 4 tuần
- ☐ b. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 4 tuần
- ☒ c. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 8 tuần
- ☐ d. PPI liều thấp 1 lần/ngày duy trì trong 12 tuần

thầy nói chỉ cần PPI là được, không cần kết hợp Alginate.

Question 5

Complete

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, tiền căn tăng huyết áp điều trị ổn định với Amlodipin và viêm dạ dày H. pylori dương tính đã điều trị. Đánh giá nguy cơ loét dạ dày tá tràng của bệnh nhân này nếu sử dụng thuốc kháng viêm không steroid?

- ☒ a. Nguy cơ thấp
- ☐ b. Nguy cơ trung bình
- ☐ c. Nguy cơ cao
- ☐ d. Nguy cơ rất cao

Question 6

Complete

Marked out of
1.00

Trường hợp bệnh trào ngược dạ dày thực quản nào sau đây cần duy trì liên tục điều trị với PPI?

- ☐ a. Viêm thực quản do trào ngược độ LA-B
- ☐ b. Triệu chứng trào ngược tái phát sau khi ngưng thuốc 14 tuần
- ☒ c. Thực quản Barrett
- ☐ d. Triệu chứng trào ngược 1 lần/tuần

Question 7

Complete

Marked out of
1.00

Trường hợp bệnh trào ngược dạ dày thực quản nào sau đây có chỉ định phẫu thuật chống trào ngược?

- ☐ a. Viêm thực quản trào ngược độ LA-C
- ☐ b. Thực quản Barrett
- ☐ c. Triệu chứng trào ngược không kiểm soát được với PPI liều chuẩn 2 l/d
- ☒ d. Thoát vị hoành gây hít sặc

Question 8

Complete

Marked out of

1.00

Trường hợp nào sau đây KHÔNG cần điều trị PPI duy trì lâu dài?

- ☐ a. Thực quản Barrett
- ☐ b. Viêm thực quản do trào ngược độ LA-C
- ☒ c. Triệu chứng trào ngược tái phát sau 12 tuần
- ☐ d. Biến chứng hẹp thực quản do trào ngược

PPI liên tục khi:

- TC trào ngược thường xuyên
- biến chứng hẹp thực quản
- viêm thực quản trào ngược mức nặng (LA: C, D)
- thực quản Barrett



Elearning
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP. HỒ CHÍ MINH



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST ĐỢT 2-2021 ►

Tiếp cận điều trị bệnh lý tiêu hóa liên quan acid dịch vị - Pretest đợt 2 (8/12/2021)

Started on Wednesday, 8 December 2021, 6:12 PM

State Finished

Completed on Wednesday, 8 December 2021, 6:20 PM

Time taken 8 mins 40 secs

Grade 8.00 out of 8.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cách phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng phù hợp khi cần sử dụng kháng viêm không steroid (NSAID) cho bệnh nhân có nguy cơ loét dạ dày - tá tràng **mức độ trung bình** và **nguy cơ tim mạch thấp** là gì?

- ☐ a. Phối hợp Naproxen và PPI
- ☐ b. NSAID chọn lọc COX2
- ☒ c. Phối hợp NSAID và PPI
- ☐ d. NSAID liều thấp hiệu quả

Bảng 9.10. Chiến lược phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng ở người bệnh cần dùng NSAID

	Nguy cơ tiêu hóa		
	Thấp	Trung bình	Cao
Nguy cơ tim mạch	Thấp	NSAID ít gây loét và chi phí thấp nhất	NSAID + PPI/Misoprostol
			Tránh dùng nếu có thể Nếu cần dùng: Chọn lọc COX ₂ + PPI/Misoprostol
	Cao*	Naproxen + PPI/Misoprostol	
			Tránh dùng NSAID (kể cả chọn lọc COX ₂)

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, triệu chứng ợ nóng và ợ trớ 4 – 5 lần/tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm thực quản do trào ngược độ LA-A và viêm trợt dạ dày. Điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. Antacid trong 12 tuần
- ☒ b. PPI trong 8 tuần
- ☐ c. Alginate trong 12 tuần
- ☐ d. Phẫu thuật chống trào ngược

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Nhóm bệnh nhân nào sau đây có NGUY CƠ CAO loét dạ dày tá tràng do sử dụng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID)?

- ☐ a. Tuổi > 60, NSAID liều cao và sử dụng đồng thời thuốc chống đông
- ☒ b. Tuổi > 65, NSAID liều cao và tiền căn loét dạ dày tá tràng không biến chứng
- ☐ c. Tuổi > 60, sử dụng đồng thời corticoid và tiền căn loét dạ dày tá tràng không biến chứng
- ☐ d. Tuổi > 65, NSAID liều thấp và sử dụng đồng thời Aspirin liều thấp

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 40 tuổi, được chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày - thực quản dựa vào triệu chứng ợ nóng và ợ trớ > 2 ngày/tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị với PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 12 tuần. Bệnh nhân vẫn than phiền triệu chứng ợ nóng và ợ trớ, nhiều nhất về đêm. Hướng xử trí nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. Chụp X-Quang thực quản cản quang
- ☐ b. Chụp cắt lớp vùng ngực có cản quang
- ☒ c. Đo pH và trở kháng thực quản để xem có rối loạn vận động thực quản
- ☐ d. Nội soi siêu âm

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Thành phần chính của bữa ăn như thế nào để PPI có tác dụng tốt nhất?

- ☐ a. Nhiều mỡ
- ☐ b. Nhiều tinh bột
- ☒ c. Nhiều đạm
- ☐ d. Nhiều rau



Learning

NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST ĐỢT 3 ►

Pretest Tiếp cận điều trị bệnh lý tiêu hóa liên quan acid dịch vị - đợt 3 (5/1/2022)

Started on Wednesday, 5 January 2022, 6:12 PM

State Finished

Completed on Wednesday, 5 January 2022, 6:25 PM

Time taken 12 mins 48 secs

Grade 8.00 out of 8.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of

1.00

Chiến lược điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân cần điều trị thuốc **kháng viêm không steroid hoặc Aspirin kéo dài**?

- ☒ a. Tìm và diệt trừ *H. pylori*
- ☐ b. Phối hợp PPI khi bệnh nhân có triệu chứng đau thượng vị
- ☐ c. Phối hợp Misoprostol khi bệnh nhân có nguy cơ thấp loét dạ dày tá tràng
- ☐ d. Phối hợp AntiH2 kéo dài

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, đến khám vì triệu chứng đau tức vùng thượng vị. Nội soi tiêu hóa trên: 01 ổ loét hang vị, kích thước 10 mm, **Forrest III**, CLO-test âm tính. Mô bệnh học: Viêm loét niêm mạc hang vị, không có hình ảnh ác tính. **Sau điều trị PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 12 tuần**, nội soi tiêu hóa trên kiểm tra còn ghi nhận **loét hang vị, kích thước 4 – 5 mm**. Mô bệnh học: cũng không có hình ảnh ác tính. Điều trị tiếp theo nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này? Loét trơ

Loét trơ => dùng PPI 2 lần/ngày

2.4.2.2. Điều trị

Tiết trừ *H. pylori* nếu có và cần phải kiểm tra lại hiệu quả điều trị tiết trừ.
Tránh dùng NSAID và tránh hút thuốc lá.
Dùng PPI liều tiêu chuẩn × 2 lần/ngày trong 12 tuần (nếu đã kiểm tra thật sự người bệnh tuân thủ điều trị PPI trước đó). Thông thường 90% trường hợp loét sẽ lành sau 8 tuần.
Các người bệnh này sau khi lành loét nên được điều trị ức chế tiết acid lâu dài.

- ☐ a. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 4 – 6 tuần
- ☐ b. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày phối hợp AntiH2 trong 8 tuần
- ☒ c. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày x 8 – 12 tuần
- ☐ d. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày phối hợp AntiH2 trong 12 tuần

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, **mang thai 32 tuần**, than phiền triệu chứng ợ nóng về đêm 1 – 2 lần/tuần trong 2 tuần nay, được chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. **Điều trị ban đầu** nào sau đây phù hợp nhất cho bệnh nhân này?

- ☐ a. PPI
- ☒ b. Alginate
- ☐ c. AntiH2
- ☐ d. Sodium bicarbonate

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Thuốc kháng sinh nào sau đây **KHÔNG** sử dụng trong phác đồ điều trị tiết trừ *H. pylori*?

TMB
ACM
ALB

- ☐ a. Levofloxacin
- ☐ b. Clarithromycine
- ☐ c. Metronidazole
- ☒ d. Clindamycine

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản, điều trị PPI liều chuẩn 1 lần/ngày x 8 tuần, hết triệu chứng. Sau 6 tháng, bệnh nhân than phiền triệu chứng ợ trớ 1 lần/tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 1 tuần
- ☐ b. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 1 tuần
- ☐ c. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 2 tuần
- ☒ d. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 2 tuần

Dùng thuốc lại nếu triệu chứng tái phát:
- Sử dụng ngắt quãng (từng đợt 2 tuần) hoặc
- Chỉ sử dụng khi có triệu chứng
Với người bệnh tái phát triệu chứng

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cách phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng phù hợp khi cần sử dụng kháng viêm không steroid (NSAID) cho bệnh nhân có nguy cơ cao loét dạ dày tá tràng và nguy cơ tim mạch thấp là gì?

- ☐ a. Phối hợp NSAID và Misoprostol
- ☒ b. Phối hợp NSAID chọn lọc COX2 và PPI celecoxib, meloxicam
- ☐ c. Không sử dụng NSAID
- ☐ d. Phối hợp Naproxen và PPI

Bảng 9.10. Chiến lược phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng ở người bệnh cần dùng NSAID

Nguy cơ tim mạch	Nguy cơ tiêu hóa		
	Thấp	Trung bình	Cao
Thấp	NSAID ít gây loét và chi phí thấp nhất	NSAID + PPI/Misoprostol	Tránh dùng nếu có thể Nếu cần dùng: Chọn lọc COX ₂ + PPI/Misoprostol
Cao*	Naproxen + PPI/Misoprostol		Tránh dùng NSAID (kể cả chọn lọc COX ₂)

*Nguy cơ tim mạch cao: được định nghĩa là các người bệnh cần phải dùng Aspirin liều thấp để phòng ngừa biến chứng tim mạch

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Phác đồ nào sau đây nên được lựa chọn cho điều trị tiệt trừ H. pylori lần đầu?

- ☐ a. Phác đồ 3 thuốc
- ☒ b. Phác đồ 4 thuốc PPI + Tetra + Metro + Bismuth
- ☐ c. Phác đồ lai ghép
- ☐ d. Phác đồ nối tiếp

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cách phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng phù hợp khi cần sử dụng kháng viêm không steroid (NSAID) cho bệnh nhân có **nguy cơ loét** dạ dày - tá tràng mức độ **thấp** và **nguy cơ tim mạch cao** là gì?

- ☐ a. NSAID chọn lọc COX2
- ☐ b. NSAID liều thấp
- ☐ c. Phối hợp NSAID và PPI
- ☒ d. Phối hợp **Naproxen và PPI**



Elearning
HỌC VIỆN
DƯỢC
HÀNG TRẠNG



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST Y6 ĐỢT 4 2021 - 2022 ►

Tiếp cận điều trị bệnh lý tiêu hóa liên quan acid dịch vị - Pretest Y6 đợt 4 - 28/2/2022

Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trường hợp nào sau đây có chỉ định điều trị duy trì PPI sau khi lành loét?

- ☐ a. Loét dạ dày tái phát (< 2 lần/năm)
- ☐ b. Tiết trừ H. pylori kháng thuốc thành công
- ☐ c. Loét dạ dày tá tràng do thuốc kháng viêm không steroid
- ☒ d. Loét tá tràng không lành sau 8 tuần điều trị

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân có tần suất đầy bụng sau ăn hoặc ăn nhanh no như thế nào trong tiêu chuẩn chẩn đoán khó tiêu chức năng theo tiêu chuẩn ROME IV?

- ☐ a. Ít nhất 1 lần/tháng x 3 tháng
- ☒ b. Ít nhất 3 ngày/tuần
- ☐ c. Ít nhất 3 lần/ngày
- ☐ d. Ít nhất 1 lần/tuần x 3 tuần

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trường hợp nào sau đây KHÔNG cần sử dụng PPI liều cao?

- ☐ a. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản có triệu chứng dai dẳng
- ☐ b. Loét dạ dày không lành sau 12 tuần
- ☐ c. Loét tá tràng không lành sau 8 tuần
- ☒ d. Khó tiêu chức năng

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, than phiền đau thượng vị 3 - 4 ngày/tuần trong 12 tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết niêm mạc hang vị, CLO-test âm tính. Bệnh nhân được điều trị PPI liều chuẩn 1 lần/ngày x 8 tuần, hiện tại còn đau thượng vị 1 - 2 ngày/tuần. Điều trị tiếp theo nào sau đây phù hợp với bệnh nhân này?

- ☐ a. Phối hợp thêm AntiH2
- ☐ b. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày
- ☐ c. Phối hợp thêm thuốc trợ vận động **khó tiêu chức năng.**
- ☒ d. Phối hợp thêm thuốc điều hòa thần kinh

3.4.1. Thuốc điều hòa thần kinh

Thuốc được chỉ định trong trường hợp:

- Người bệnh khó tiêu chức năng có triệu chứng không cải thiện sau 8 tuần điều trị PPI
- Người bệnh có đáp ứng lâm sàng một phần với PPI.

Question 5

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, than phiền đau thượng vị 2 ngày/tuần trong 12 tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết niêm mạc hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị ban đầu nào sau đây phù hợp với bệnh nhân này?

- ☐ a. Thuốc điều hòa thần kinh trong 8 – 12 tuần
- ☒ b. PPI liều chuẩn trong 4 – 8 tuần
- ☐ c. AntiH2 trong 4 - 8 tuần
- ☐ d. Thuốc trợ vận động trong 4 – 8 tuần

Question 6

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thời gian điều trị thích hợp cho trường hợp loét tá tràng là bao lâu?

- ☐ a. Tối đa 4 tuần
- ☒ b. 4 – 8 tuần
- ☐ c. 12 – 16 tuần
- ☐ d. 8 – 12 tuần

Question 7

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 35 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, than phiền đầy bụng, ăn mau no 3 ngày/tuần trong 12 tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết niêm mạc hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị ban đầu nào sau đây phù hợp với bệnh nhân này?

- ☐ a. PPI
- ☒ b. Thuốc trợ vận động
- ☐ c. Thuốc điều hòa thần kinh
- ☐ d. AntiH2

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Thời gian điều trị thích hợp cho trường hợp loét dạ dày là bao lâu?

- ☐ a. 12 – 16 tuần
- ☐ b. 4 – 8 tuần
- ☐ c. 2 – 4 tuần
- ☒ d. 8 – 12 tuần



Elearning
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH