Y16F

5. Mốc phát triển nào sau đây thường bắt đầu xuất hiện ở trẻ 9 tháng tuổi? \* (1 Điểm)

	Ngồi	khi	có	điểm
\			$\sim$	G.C.

## MỘT SỐ MÓC SỬ DỤNG TRONG TÍNH DQ

	Đi	bô
$\bigcirc$	וטו	υĢ

Vịn để đứng lên



Mốc vận động	Tuổi đạt kỹ năng
Tự ngồi	7 tháng
Đứng có hỗ trợ	8 tháng
Bò	9 tháng
Đi có hỗ trợ	10 tháng
Tự đứng (không hỗ trợ)	12 tháng
Tự đi	13 tháng

6. Dựa trên quy tắc số 4, một trẻ 36 tháng thường có biểu hiện ngôn ngữ như thế nào? \*

(1 Điểm)


- Nói được cụm gồm ít nhất 2 từ, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu được khoảng 75%
- Nói được câu gồm ít nhất 3 từ, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu được khoảng 50%
- Nói được câu gồm ít nhất 3 từ, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu được khoảng 75%
- Nói được cụm gồm ít nhất 2 từ, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu khoảng 50%

7. Dựa trên quy tắc số 4, một trẻ 12 tháng thường có biểu hiện ngôn ngữ như thế nào? \*

(1 Điểm)

- Nói được cụm gồm ít nhất 2 từ, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu được khoảng 50%
- Nói được 1 đến 3 từ đơn, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu được khoảng 50%
- Nói được 1 đến 3 từ đơn, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu khoảng 25%
- Nói được cụm gồm ít nhất 2 từ, người lạ khi nghe trẻ nói có thể hiểu khoảng 25%

8. Đánh giá phát triển tâm thần - vận động của trẻ thường gồm bao nhiều lĩnh vực?



Hình 78.1. Năm lĩnh vực phát triển ở trẻ em

9. Triệu chứng nào sau đây gợi ý có khả năng bất thường ở một trẻ 10 tháng tuổi? \*

, , ,			
(1 Điểm)		Các dấu	hiệu báo động chậm phát triển ngôn ngữ/lời nói
		Tuổi	Mốc phát triển
		6 tháng	Không có tiếng gù
I/la â a a a la â a la a		10 tháng	Không bập bẹ
Không bập bẹ		12 tháng	Không có các điệu bộ cơ bản (vẫy chào tạm biệt, c ẵm)
		18 tháng	Không nói được từ nào khác ngoài ba/mẹ
<ul> <li>Không hiểu các yêu cầu đơn giản</li> </ul>			Không hiểu các yêu cầu đơn giản. Không chỉ vào v
		24 tháng	< 50 từ. Không nói được ngữ 2 từ. Người lạ hiểu < nói
(A)	a II II aa a II	20 45 4	Không nói được câu 3 từ
Không nói được từ nào khác ngoài từ "b	a mę	36 tháng	Người lạ hiểu <75% những gì trẻ nói
		4-5 tuổi	Không thể kể một câu chuyện đơn giản
		. ^	https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestone

nes/milestones-3yr.html

dang rộng tay chờ

vật mà trẻ muốn

- ) Không có các điệu bộ cơ bản (vẫy tay chào tạm biệt, dang rộng tay chờ ăm)
- 10. Triệu chứng nào sau đây gợi ý có khả năng bất thường ở một trẻ 12 tháng tuổi? \* (1 Điểm)
  - Không có các điệu bộ cơ bản (vẫy tay chào tạm biệt, dang rộng tay chờ ẵm)
  - Không hiểu các yêu cầu đơn giản
  - Không chỉ vào vật mà trẻ muốn
  - Không nói được từ nào khác ngoài từ "ba" "mẹ"
- 11. Triệu chứng nào sau đây gợi ý có khả năng bất thường ở một trẻ 18 tháng tuổi? \* (1 Điểm)
  - Không nói được từ nào khác ngoài từ "ba" "mẹ"

· - ·	
C Không nói được ngữ gồm ít nhất	2 từ
C Không phân biệt được giới tính	
C Không lên cầu thang với lần lượt	cả hai chân cho các bậc thang kế nhau

12. Bạn tiếp nhận khám một trẻ 36 tháng tuổi. Trẻ có thể bước lên cầu thang với trợ giúp, có thể vẽ nguệch ngoạc. Ước tính tuổi vận động thô là 18 tháng. Chỉ số phát triển (development quotient, DQ) về lĩnh vực vận động thô của trẻ là bao nhiêu? \*

(1 Điểm)	7		mę	
O 40	18 tháng	Nói 6-10 từ đơn	Có thể tự ăn	Bước lên cầu thang với trợ giúp (cầm một tay), vẽ nguệch ngoạc (bắt chước theo mẫu)
<ul><li>○ 40</li><li>○ 30</li></ul>	24 tháng	Nối từ (thường là hai từ), vốn từ vựng khoảng 250 từ	Biết kết hợp để cởi quần áo, lắng nghe những câu truyện với tranh	Chạy vững, vẽ được dạng hình tròn (một đường với hai đầu nối nhau), bắt chước vẽ được một đường thẳng ngang
<u> </u>	30 tháng	Dùng "tôi"/"con"/hay tên riêng để chỉ bản thân, biết tên đầy đủ	Biết chơi giả bộ, giúp cất đồ vật	Lên cầu thang với lần lượt cả hai chân, bắt chước vẽ đường thẳng đứng
50	36 tháng	Đếm đến 3, biết phân biệt tuổi và giới tính	Biết kết hợp để mặc quần áo	Lái xe ba bánh, đứng một chân trong khoảng thời gian ngắn, bắt chước vẽ hình tròn
<u> </u>	48 tháng	Đếm đến 4, kể một câu chuyện ngắn	Chơi với các trẻ khác, tự đi vệ sinh (biết cách sử dụng nhà vệ sinh)	Nhảy lò cò, sử dụng kéo để cắt hình có sẵn, bắt chước vẽ hình vuông và hình chữ thập
	60 tháng	Đếm đến 10, kể tên được 4 màu	Hỏi về nghĩa của từ, chơi bắt chước các công việc nhỏ trong gia đình	Nhảy chân sáo, bắt chước vẽ hình tam giác

13. Bạn tiếp nhận khám một trẻ 14 tháng tuổi. Trẻ có thể ngồi khi được trợ giúp, chuyển đồ vật giữa 2 tay. Ước tính tuổi vận động thô là 6 tháng. Chỉ số phát triển (development quotient, DQ) về lĩnh vực vận động thô của trẻ là bao nhiêu? \* (1 Điểm)

O 61,7

74,1

42,8

O 54,6

14. Trẻ có thể nói câu với ít nhất 3 từ. Người lạ nghe có thể hiểu khoảng 75% những gì trẻ nói. Theo quy tắc số 4, trẻ phát triển lời nói tương ứng mốc tuổi nào sau đây? \*

(1 Điểm)

Từ 4 tuổi trở lên

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-Miz6oh0D0aitEEurd6ovw6NRUY0oGFKkvPTR-iFTFNUQkpLSEg0TUFHU01HWEIVTk1RSF...

( ) Vận động tinh

Giao tiếp – chậm nói

	Thích nghi xã hội				
	Vận động thô				
18	Bạn tiếp nhận khám một trẻ 12 tháng tuổ bập bẹ chữ "ba" chưa đúng ngữa cảnh. Tr với banh. Có thể đứng một mình. Trẻ này	ẻ có	thể chơi	những t	rò chơi đơn giản
	(1 Điểm)	02 tháng 04 tháng	Đơn âm (ah, ooh) Cười và thét to (vui, sợ)	Cười khi tiếp xúc Duy trì tiếp xúc xã hội, giao tiếp mắt	Giữ đầu cao 45 <sup>0</sup> khi nằm sấp Nấm đồ vật, đứng với trợ giúp, lật
	Vận động tinh	06 tháng 08 tháng	Phát âm câu có ngữ điệu (dù không thành từ, vô nghĩa) Nói chuỗi từ (dadada) Nói chữ "bố"/"mẹ"	Thích gần mẹ, thích chơi gương Chơi có tương tác Chơi những trò đơn	Chuyển đồ vật giữa hai tay, ngồi với trợ giúp Tự ngồi, trườn, bò Đứng một minh, có thể bốc đồ
	Giao tiếp – chậm nói	12 tháng 14 tháng	đúng ngữ cảnh Nói 2-3 từ đơn	giản với banh, biết điều chỉnh tư thế khi được thay quần áo Biết chỉ vào đồ vật	vật bằng hai ngón tay Đi một mình, cúi người và đứng
	S dide tiep engin nor	18 tháng	Nói 6-10 từ đơn	ưa thích, ôm chặt bố mẹ Có thể tự ăn	thẳng lại  Bước lên cầu thang với trợ giúp (cầm một tay), về nguệch ngoạc
	Vận động thô	24 tháng	Nối từ (thường là hai từ), vốn từ vựng khoảng 250 từ	Biết kết hợp để cởi quần áo, lắng nghe những câu truyện với tranh	(bắt chước theo mâu)  Chạy vững, vẽ được dạng hình tròn (một đường với hai đầu nổi nhau), bắt chước vẽ được một đường tháng ngang
	Thích nghi xã hội	30 tháng 36 tháng	Dùng "tôi"/"con"/hay tên riêng để chỉ bản thân, biết tên đầy đủ Đếm đến 3, biết phân	Biết chơi giả bộ, giúp cất đồ vật Biết kết hợp để mặc	Lên cầu thang với lần lượt cả hai chân, bắt chước vẽ đường thắng đứng Lái xe ba bánh, đứng một chân
		48 tháng	biệt tuổi và giới tính Đếm đến 4, kể một câu chuyện ngắn	quần áo Chơi với các trẻ khác, tự đi vệ sinh	trong khoảng thời gian ngắn, bắt chước vẽ hình tròn Nhày lò cò, sử dụng kéo để cắt hình có sẵn. bắt chước vẽ hình
		60 tháng	Đếm đến 10, kể tên được 4 màu	(biết cách sử dụng nhà vệ sinh) Hỏi về nghĩa của từ, chơi bắt chước các công việc nhỏ trong	vuông và hình chữ thập Nhảy chân sáo, bắt chước vẽ hình tam giác
19	Bạn tiếp nhận khám một trẻ 22 tháng tuổ mình, cúi người và đứng thẳng lại. Ước tín trên kết quả tính chỉ số phát triển (develo động thô, xử trí phù hợp nhất cho trẻ là g (1 Điểm)	nh tu pmei	ổi vận đợ	ng thô l	à 14 tháng. Dựa
	Tư vấn cho cha/mẹ trẻ rằng trẻ chỉ bất thường	ı nhẹ,	không cần	ı lo lắng q	uá mức
	Tư vấn cho cha/mẹ về khả năng rối loạn phát	triển,	hẹn tái khá	ám 6 tháng	g
	Tư vấn cho cha/mẹ về khả năng rối loạn phát	triển,	hẹn tái khá	ám 3 tháng	g
	Chuyển tuyến trên để đánh giá rối loạn phát tr	riển			

20.	Trẻ 5 tuổi được mẹ đưa đến khám để đánh giá về phát triển ngôn ngữ. Trẻ nói được khoảng 70 từ đơn, nói được câu kết hợp 2 từ. Bác sĩ khám trẻ có thể hiểu được khoảng 50% những gì trẻ nói. Dựa vào quy tắc số 4 trong dự đoán rối loạn phát triển ngôn ngữ, mức phát triển ngôn ngữ của trẻ này tương đương với trẻ khoảng mấy tuổi? *  (1 Điểm)
	↓ 4 tuổi

∫ 5 tuổi

3 tuổi

2 tuổi

21. Bạn là bác sĩ tại bệnh viện huyện, tiếp nhận đánh giá phát triển ngôn ngữ một trẻ 5 tuổi được mẹ đưa đến khám. Trẻ nói được khoảng 70 từ đơn, nói được câu kết hợp 2 từ. Bạn có thể hiểu được khoảng 50% những gì trẻ nói. Sau khi dự đoán rối loạn phát triển ngôn ngữ dựa trên quy tắc số 4, bạn sẽ tư vấn gì với mẹ của trẻ? \* (1 Điểm)

🔵 Trẻ có chậm nói nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, hẹn tái khám 3 tháng

Trẻ cần được đánh giá chuyên khoa để xem xét can thiệp

Trẻ có chậm nói nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, hẹn tái khám 6 tháng

Các dấu hiệu báo động chậm phát triển ngôn ngữ/lời nói

Tuổi
6 tháng
10 tháng
10 tháng
12 tháng
22 tháng
36 Không có tiếng gù
12 tháng
4 Không có các điệu bộ cơ bản (vẫy chào tạm biệt, dang rộng tay chờ ẩm)
48 tháng
4 Không nói được từ nào khác ngoài ba/mẹ
4 Không hiểu các yêu cầu đơn giản. Không chỉ vào vật mà trẻ muốn
4 tháng
36 tháng
36 tháng
4-5 tuổi
4 Không thể kử một câu chuyện đơn giản
5 Không thể kử một câu chuyện đơn giản

 $\bigcirc$  Trẻ đang phát triển ngôn ngữ theo đúng lứa tuổi, không cần theo dõi gì thêm

22. Bạn là bác sĩ tại bệnh viện huyện, tiếp nhận đánh giá phát triển một trẻ 8 tháng tuổi được mẹ đưa đến khám. Trẻ có thể phát âm chuỗi từ (VD, "dadada"), bập bẹ chữ "ba" chưa đúng ngữ cảnh. Trẻ thích chơi cùng mẹ. Trẻ có thể tự ngồi và đang tập bò. Chưa biết vịn tường để đứng lên. Xử trí phù hợp nhất cho trẻ là qì? \*

(1 Điểm)

Trẻ đang phát triển theo đúng lứa tuổi, chưa cần xử trí gì thêm

Trẻ có chậm nói ở mức độ nhẹ, hẹn tái khám 3 tháng

Baley 72. Cle mich op that finded and pump freen out of block-replant of 40 min - 7 min) (4)

The block may be come to me, or the come of the come of

?SF...

13:54, 10/12	/2021 Pretest - CBL Nhi khoa Phát triển (Nhóm 1 - đợt 2)
	Trẻ cần được đánh giá chuyên khoa để xem xét can thiệp
	Trẻ có chậm phát triển vận động thô, hẹn tái khám 6 tháng
2:	3. Bạn là bác sĩ tại bệnh viện huyện, tiếp nhận khám một trẻ 24 tháng tuổi. Sau khi thăm khám, bạn ước tính tuổi vận động tinh là 26 tháng. Dựa trên kết quả tính chỉ số phát triển (development quotient, DQ) về lĩnh vực vận động tinh, xử trí phù hợp nhất cho trẻ là gì? *  (1 Điểm)
	Tư vấn cho cha/mẹ trẻ rằng trẻ chưa có gợi ý bất thường ở lĩnh vực vận động tinh
	Tư vấn cho cha/mẹ về khả năng rối loạn phát triển ở lĩnh vực vận động tinh, hẹn tái khám 6 tháng
	Tư vấn cho cha/mẹ về khả năng rối loạn phát triển ở lĩnh vực vận động tinh, hẹn tái khám 3 tháng
	Chuyển tuyến trên để đánh giá rối loạn phát triển
24	4. Bạn tiếp nhận khám một trẻ 13 tháng tuổi. Trẻ chưa thể bò, nhưng đã tự ngồi một mình. Ước tính tuổi vận động thô là 8 tháng. Dựa trên chỉ số phát triển (development quotient, DQ) về lĩnh vực vận động thô, xử trí nào là phù hợp cho trẻ? * 🖫 (1 Điểm)
	Trẻ có khả năng bất thường phát triển vận động thô nhẹ, hẹn tái khám 6 tháng
	Trẻ có khả năng bất thường phát triển vận động thô nhẹ, hẹn tái khám 3 tháng
	Trẻ cần được đánh giá chuyên khoa để xem xét can thiệp
	Trẻ đang phát triển vận động thô theo đúng lứa tuổi, không cần theo dõi gì thêm

Tính chỉ số phát triển cho từng lĩnh vực. Khi DQ nằm trong giới hạn từ 71-84, trẻ cần được theo dõi sát. Nếu DQ ≤ 70, trẻ cần được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa để tiếp tục đánh giá, theo dõi và điều trị.

366 ♦ Chương 8. THẦN KINH – NHIỄM

Bất kỳ một bệnh lý đi kèm nào cũng cần được chữa trị hoặc có thể chuyển trẻ đến bác sĩ chuyên khoa phù hợp.

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | Quyền riêng tư và cookie | Điều khoản sử dụng