

Thi lý thuyết Y6 lần 2

Trắc nghiệm

Chọn 1 câu đúng nhất

Triệu chứng nào sau đây gặp trong bệnh nhân tắc ruột giai đoạn trễ?

- ☐ Thăm trực tràng trống
- ☐ Nôn ra dịch phân
- ☐ Sốt cao lạnh run
- ☐ Chướng lệch bụng

Đặc điểm nào sau đây là của thoát vị bẹn trực tiếp?

- ☐ Thường xảy ra ở người trẻ
- ☐ Chặn lỗ bẹn sâu khối thoát vị không xuất hiện
- ☐ Dễ gây biến chứng nghẹt
- ☐ Nằm xuống biến mất dễ



Bạn thấy hình ảnh gì trên phim XQ này?



- ☐ Dịch ổ bụng lượng nhiều của xơ gan
- ☐ Hơi tự do ổ bụng của thủng tạng rỗng
- ☐ Hình ảnh 3 lớp của hẹp môn vị
- ☐ Mức nước hơi của tắc ruột non cơ học

Hình ảnh học ưu tiên thực hiện trên bệnh nhân nghi ngờ viêm ruột thừa cấp là gì?

- ☐ MRI bụng chậu có cản từ
- ☐ Siêu âm bụng thường quy
- ☐ X quang bụng đứng không sửa soạn
- ☐ CT scan bụng chậu có cản quang



Bệnh nhân nam, 36 tuổi, bị tai nạn giao thông không rõ cơ chế cách nhập viện 3h, tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân tỉnh, M 110l/p, HA 80/50mmHg, da niêm nhạt, bụng chướng, có dấu xây sát vùng hạ sườn (P). Cận lâm sàng nào tiếp theo là phù hợp?

- ☐ Xquang bụng đứng không sửa soạn
- ☐ Chụp CT bụng có cản quang
- ☐ Chọc dò hoặc chọc rửa ổ bụng
- ☐ Siêu âm bụng tại giường

Cận lâm sàng dùng để theo dõi diễn tiến của tắc ruột là gì?

- ☐ MSCT bụng chậu
- ☐ Công thức máu và CRP
- ☐ Siêu âm bụng
- ☐ XQ bụng đứng không sửa soạn

Thời điểm bắt đầu dùng kháng sinh dự phòng thường là khoảng nào?

- ☐ Trước mổ 12 tiếng
- ☐ Sau mổ 30-60ph
- ☐ Ngay khi PTV rách da
- ☐ Trước mổ 30-60ph



Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, đau bụng quặn cơn quanh rốn và nôn ói 2 ngày nay, bí trung đại tiện, không sốt. Tiền sử mổ cắt ruột thừa nội soi 3 năm trước, mổ bắt con 1 lần cách 5 năm. Khám: bụng trướng vừa, mềm, gõ vang, có dấu rắn bò, vết mổ cũ lành tốt, không đau. Thăm trực tràng thấy trực tràng trống, không u, rút gang không thấy máu. Chẩn đoán nghi nhiều trong trường hợp này?

- ☐ Tắc ruột do dính
- ☐ Tắc ruột do u đại tràng
- ☐ Liệt ruột do viêm phúc mạc
- ☐ Tắc ruột do xoắn ruột

Triệu chứng nào sau đây có giá trị trong chẩn đoán ung thư trực tràng ?

- ☐ Đi cầu phân nhỏ dẹt
- ☐ Đi cầu bón mạn tính
- ☐ Chảy dịch lõ hậu môn
- ☐ Đi cầu máu đỏ tươi thành tia

Trong tứ chứng kinh điển của hội chứng tắc ruột, triệu chứng nào là có ĐỘ ĐẶC HIỆU CAO NHẤT trong chẩn đoán hội chứng tắc ruột?

- ☐ Bí trung đại tiện
- ☐ Đau bụng quặn cơn
- ☐ Nôn ói
- ☐ Chướng bụng



Triệu chứng nào sau đây thường gặp trong bệnh U bóng Vater?

- ☐ Bí trung đại tiện
- ☐ Đau lan sau lưng
- ☐ Đi cầu phân đen
- ☐ Nôn ói sau ăn

Ung thư tế bào gan nguyên phát giai đoạn tiến xa thường gây tử vong nhiều nhất trong bệnh cảnh nào?

- ☐ Ho ra máu do di căn phổi
- ☐ Chảy máu ổ bụng do u gan vỡ
- ☐ Tắc ruột do u di căn ổ bụng
- ☐ Ói ra máu ồ ạt do vỡ dẫn tĩnh mạch thực quản

Một bệnh nhân đến khám vì than phiền cảm giác đầy nặng trong bụng, không đau. Khám sờ thấy có một khối u kích thước khoảng 2x2cm ở bên trái trên cách rốn 3cm. Làm cách nào tiếp theo để phân biệt khối u thành bụng hay trong ổ bụng ?

- ☐ Cố gắng ấn xẹp khối u vào trong bụng được hay không
- ☐ Cho bệnh nhân đi siêu âm bụng
- ☐ Sờ sâu bụng bằng hai tay
- ☐ Sờ bụng khi cho bệnh nhân gồng bụng



Yếu tố nào sau đây là yếu tố nguy cơ của ung thư đại tràng?

- ☐ Thói quen ăn cá sống
- ☐ Bệnh đa polyp gia đình
- ☐ Đái tháo đường
- ☐ Đại tràng dài bẩm sinh

Trong phim XQ bụng đứng không sửa soạn sau, các mũi tên đang chỉ vào cấu trúc gì?



- ☐ Hơi tự do ổ bụng
- ☐ Mức nước hơi ruột non
- ☐ Hơi trong khung tá tràng
- ☐ Mức nước hơi ruột già



Hội chứng vàng da trước gan có đặc điểm nào sau đây?

- ☐ Ngứa nhiều
- ☐ Thiếu máu
- ☐ Phân bạc màu
- ☐ Nước tiểu vàng nhạt

Diễn tiến nào sau đây là diễn hình của viêm túi thừa đại tràng Sigma ?

- ☐ Đau quặn cơn quanh rốn, sau chuyển hố chậu trái
- ☐ Đau đột ngột dữ dội ở hố chậu trái
- ☐ Đau quặn cơn ở hố chậu trái
- ☐ Đau âm ỉ tăng dần ở hố chậu trái

Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, nhập viện vì đau dưới sườn phải âm ỉ 3 ngày, sốt nhẹ, không ói, tiêu tiểu bình thường. Tiền căn: chưa từng phẫu thuật. Khám: bệnh tỉnh, sinh hiệu ổn, sốt nhẹ, bụng mềm, ấn đau dưới sườn phải. CLS: Bạch cầu: 12 K/ μ L, Bilirubin toàn phần: 2.4 mg/dL, Bilirubin trực tiếp: 1.5 mg/dL. Siêu âm bụng: túi mật vách mỏng, căng, có vài sỏi 5-7mm; đường mật trong gan 2 bên giãn, có vài sỏi trong gan. OMC 12mm, đoạn cuối khảo sát giới hạn do hơi. Hình ảnh học tiếp theo TỐT NHẤT nên được thực hiện trên bệnh nhân này là gì?

- ☐ MRCP
- ☐ MSCT
- ☐ ERCP
- ☐ PTC



Bệnh nhân nam, 21t, vào viện vì đau vùng bẹn (P). Bệnh sử: Bệnh nhân thấy có khối phồng ở vùng bẹn (P) khoảng 2 năm nay, lúc to hơn, lúc xẹp. Cách nhập viện khoảng 2 giờ bệnh nhân ho nhiều, và thấy khối phồng vùng bẹn (P) sưng to hơn, cảm giác đau tăng dần nên nhập viện. Tiền căn: Khỏe mạnh. Khám: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Bụng mềm, chướng nhẹ; khối phồng nằm trên dây chằng bẹn bên (P) kt khoảng 4x6cm, xuống đến bìu, không đẩy lên được, ấn đau chói. Xử trí phù hợp nhất là gì?

- ☐ Chỉ định mổ cấp cứu khẩn
- ☐ Dùng tay đẩy mạnh khối thoát vị lên
- ☐ Lên chương trình mổ vào ngày hôm sau
- ☐ Cho kháng sinh, giảm đau, giảm co thắt, nằm kê cao chân



Đây là hình ảnh vết mổ đường giữa trên-dưới rốn sau 4 ngày phẫu thuật cắt đại tràng (P). Xử trí nào là phù hợp trong trường hợp này?



- ☐ Cắt chỉ vết mổ
- ☐ Phải rửa vết mổ bằng Betadine đậm đặc
- ☐ Dùng kháng sinh uống tiếp tục
- ☐ Chỉ định mổ lại giải quyết áp xe tồn lưu

Nhiễm trùng vết mổ thường xảy ra vào thời gian nào sau mổ?

- ☐ Vào ngày hậu phẫu 1-2
- ☐ Vào ngày hậu phẫu 3-5
- ☐ Vào ngày hậu phẫu 5-7
- ☐ Sau ngày hậu phẫu 7



Nguyên nhân nào sau đây gây liệt ruột ?

- ☐ Lao ruột
- ☐ Lồng ruột
- ☐ Xoắn ruột
- ☐ Viêm phúc mạc

Hình ảnh trên mô tả kỹ thuật gì trong khám bụng ?



- ☐ Gõ đục vùng thấp
- ☐ Gõ tìm dấu sóng vồ
- ☐ Nhìn tìm bụng cân đối/ bụng chướng
- ☐ Sờ nông tìm cảm ứng phúc mạc



Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG THƯỜNG GẶP ở bệnh nhân đi tiêu ra máu?

- ☐ Polyp trực tràng
- ☐ Bệnh trĩ
- ☐ Rò hậu môn
- ☐ Ung thư trực tràng

Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, 1 năm nay xuất hiện nhọt cạnh hậu môn, tự vỡ mủ và tự lành. Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Chẩn đoán phù hợp nhất là gì?

- ☐ Nứt hậu môn
- ☐ Rò hậu môn
- ☐ Trĩ ngoại
- ☐ Nhọt mông

Bệnh nhân nam, 63 tuổi, nhập viện vì nuốt nghẹn. Khoảng 2 tháng nay, bệnh nhân nuốt nghẹn tăng dần, khởi đầu là thức ăn đặc sau đó đến thức ăn lỏng. 1 tuần nay, bệnh nhân chỉ uống sữa được, thỉnh thoảng nôn trớ ra sữa mới uống trước đó 1-2 giờ. Bệnh nhân không đau bụng, đi cầu phân vàng mỗi 1-2 ngày. Tiền căn: hút thuốc lá 30 gói x năm, ngoài ra chưa ghi nhận gì thêm. Với bệnh sử trên, chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất là gì?

- ☐ Viêm hẹp thực quản do hút thuốc lá
- ☐ Ung thư thực quản
- ☐ Trào ngược dạ dày thực quản
- ☐ Co thắt tâm vị



Nhiễm trùng hoại thư sinh hơi thường do tác nhân nào gây nên?

- ☐ Vi trùng gram dương
- ☐ Vi trùng kỵ khí
- ☐ Vi trùng gram âm
- ☐ Vi trùng lao

Sỏi túi mật dạng nào dễ gây biến chứng viêm tụy cấp?

- ☐ Sỏi trên 5 viên
- ☐ Sỏi nhỏ li ti
- ☐ Sỏi có kích thước > 2cm
- ☐ Sỏi kèm polyp túi mật

Khi tiếp xúc một bệnh nhân nam đi khám vì có khối ở vùng bẹn bìu khoảng 2 tháng nay, câu hỏi nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT?

- ☐ Khối này có khi nào giảm kích thước hoặc biến mất ?
- ☐ Khối này có hình dạng thế nào ?
- ☐ Tiền căn bản thân và gia đình có nhiễm lao ?
- ☐ Có triệu chứng tiểu mủ hay tiểu máu ?



Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, đến khám vì đau bụng vùng hạ sườn phải. Khoảng 5 ngày nay bệnh nhân thấy đau bụng âm ỉ liên tục hạ sườn phải, sốt nhẹ, ớn lạnh. Khám: sờ được một khối ở hạ sườn phải, khoảng 4x4cm, mật độ chắc, giới hạn rõ, ấn đau nhiều. Chẩn đoán nào sau đây KHÔNG PHÙ HỢP ?

- ☐ U đại tràng góc gan biến chứng viêm quanh u
- ☐ Viêm túi mật cấp
- ☐ U đầu tụy
- ☐ Áp xe túi thừa đại tràng

Bệnh nhân nam, 67 tuổi, vào viện vì đau bụng quặn cơn quanh rốn, bí trung và đại tiện 3 ngày, không nôn. Tiền căn: thay đổi thói quen đi tiêu 2 tháng nay, thỉnh thoảng đi tiêu phân nhỏ và dẹt. Chưa từng phẫu thuật trước đây. Khám: bụng chướng to, mềm, ấn không đau khu trú, nghe nhu động ruột khoảng 15 lần/phút. Chẩn đoán phù hợp nhất là gì?

- ☐ Tắc ruột do lao ruột
- ☐ Tắc ruột do dính
- ☐ Tắc ruột do xoắn đại tràng Sigma
- ☐ Tắc ruột do u trực tràng

Tam chứng Charcot của viêm đường mật do sỏi có các triệu chứng diễn ra theo thứ tự như thế nào?

- ☐ Đau bụng hạ sườn bên phải --> sốt --> vàng da
- ☐ Đau bụng hạ sườn bên phải --> sốt --> nôn ói
- ☐ Đau bụng hạ sườn bên phải --> vàng da --> nôn ói
- ☐ Đau bụng hạ sườn bên phải --> chướng bụng --> gan to



Nói về giá trị của CT scan trong chấn thương gan, câu nào sau đây là SAI?

- ☐ Phân độ nặng tổn thương
- ☐ Đánh giá mức độ mất máu để truyền
- ☐ Chẩn đoán tổn thương tạng khác kèm theo
- ☐ Hướng dẫn chọn lựa điều trị

Nói về điều trị nội khoa tắc ruột, câu nào sau đây là SAI?

- ☐ Đặt thông mũi – dạ dày
- ☐ Bù nước, điện giải
- ☐ Cho thuốc tăng nhu động
- ☐ Theo dõi nước tiểu

Hiện nay, quan điểm điều trị viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ như thế nào?

- ☐ Nên lấy sỏi qua nội soi mật tụy ngược dòng trong vòng 24-48h
- ☐ Nên dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da trong vòng 24-48h
- ☐ Nên điều trị nội khoa bảo tồn với PPI và Sandostatin
- ☐ Nên phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi càng sớm càng tốt



Viêm túi mật cấp không do sỏi thường gặp trên bệnh nhân nào?

- ☐ Tăng huyết áp không kiểm soát
- ☐ Nhiễm trùng huyết nặng
- ☐ Suy tim nặng
- ☐ Tuổi >60

Tính chất đau của u tụy thường như thế nào?

- ☐ Đau quặn cơn dưới sườn (P) lan lên vai (P)
- ☐ Đau quặn cơn quanh rốn không lan
- ☐ Đau âm ỉ quanh rốn lan sau lưng
- ☐ Đau âm ỉ $\frac{1}{4}$ trên (P) không lan

Nói về dấu hiệu lâm sàng của ung thư hang vị , câu nào sau đây là SAI?

- ☐ Ói ra máu
- ☐ Nuốt nghẹn
- ☐ Ăn uống kém
- ☐ Đau thượng vị



Khối u của tạng nào sau đây có thể có tính chất di động khi dùng tay lắc?

- ☐ Gan
- ☐ Đại tràng ngang
- ☐ Đại tràng lên
- ☐ Tá tràng

Ở bệnh nhân tắc ruột, dấu hiệu nào trên CT scan bụng chứng tỏ giai đoạn trễ?

- ☐ Khí tự do trong ổ bụng
- ☐ Manh tràng giãn trên 6cm
- ☐ Bóng trực tràng xẹp hoàn toàn
- ☐ Thành ruột non dày trên 4mm

Trong các cận lâm sàng sau đây, cận lâm sàng nào có giá trị nhất trong chẩn đoán sự xâm lấn tại chỗ của ung thư trực tràng thấp?

- ☐ Marker ung thư CEA
- ☐ Nội soi trực tràng sinh thiết
- ☐ Chụp cộng hưởng từ vùng chậu
- ☐ Chụp cắt lớp điện toán bụng chậu



Tính chất nôn nào sau đây điển hình trên bệnh nhân tắc đường thoát dạ dày?

- ☐ Nôn ra dịch phân
- ☐ Nôn ra máu đỏ tươi
- ☐ Nôn xong dễ chịu
- ☐ Nôn không liên quan bữa ăn

Biến chứng bực xì miệng nổi tiêu hóa hay xảy ra vào thời điểm nào ?

- ☐ 24h sau mổ
- ☐ 1-2 ngày sau mổ
- ☐ 3-5 ngày sau mổ
- ☐ Trên 7 ngày sau mổ

Bệnh nhân nam, 25 tuổi, nhập viện sau tai nạn giao thông 6 giờ, không rõ cơ chế té. Khám thấy tri giác tỉnh, mạch 100-110 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, sốt 39 độ C; bụng chướng, ấn đau khắp bụng, để kháng (+), nước tiểu vàng trong. Chẩn đoán ban đầu nghi ngờ nhiều trong trường hợp này là gì?

- ☐ Vỡ gan
- ☐ Vỡ lách
- ☐ Vỡ ruột
- ☐ Vỡ mạch máu



Hiện tại, phương pháp điều trị tiêu chuẩn được chọn lựa cho thủng ổ loét dạ dày tá tràng lành tính là gì?

- ☐ Khâu lỗ thủng
- ☐ Cắt bán phần dạ dày
- ☐ Nối vị tràng
- ☐ Hút liên tục kèm PPI

Trang 2 trong tổng số 2

[Quay lại](#)

Gửi

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. [Báo cáo lạm dụng](#) - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)

Google Biểu mẫu

