



# NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ►

Pretest Tiếp Cận Điều Trị Tăng Huyết Áp 21/11/2021

## Question 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Liều dùng thường ngày của các nhóm thuốc chặn kênh Canxi sau là bao nhiêu?

- ☐ a. Diltiazem phóng thích chậm 50 mg
- ☒ b. Felodipine 5 mg
- ☐ c. Amlodipine 25 mg
- ☐ d. Lacidipil 10 mg

amlodipine# Felodipine # 5-10mg  
Lacidipin 2-6mg  
Dilitazem #vera# 120-360

**Question 2**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Cách đây 1 năm bệnh nhân đã chụp mạch vành ghi nhận hẹp 70% nhánh LCx. Trong lần khám này, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim, phân suất tống máu 52%. Huyết áp đo tại phòng khám là 160/90 mmHg. Mạch 88 lần/phút. Bên cạnh thay đổi lối sống, thuốc điều trị hạ áp phù hợp nhất ở thời điểm này?

- ☐ a. Ức chế men chuyển và chẹn thụ thể Angiotensin
- ☒ b. Chẹn Beta và Ức chế men chuyển
- ☐ c. Đơn trị liệu chẹn Beta
- ☐ d. Lợi tiểu Thiazide và chẹn kênh Canxi non-DHP

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Chọn câu đúng về thay đổi lối sống trên bệnh nhân tăng huyết áp?

- ☒ a. Làm chậm thời điểm điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp độ I
- ☐ b. Giúp cải thiện biến cố tim mạch và tử vong sau 1 năm
- ☐ c. Chỉ áp dụng cho bệnh nhân tăng huyết áp độ I
- ☐ d. Giúp giảm huyết áp tương đương dùng thuốc

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nữ 67 tuổi, chẩn đoán suy tim, tăng huyết áp, bệnh thận mạn giai đoạn 4. Trong lần nhập viện này ghi nhận tình trạng sung huyết nặng cần điều trị lợi tiểu. Nhóm thuốc nào sau đây được ưu tiên sử dụng?

- ☐ a. Indapamide
- ☒ b. Furosemide
- ☐ c. Hydrochlorothiazide
- ☐ d. Spironolactone

**Question 5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Chọn câu đúng về chỉ định điều trị tăng huyết áp?

-Độ II,III  
-Độ I NC  $\geq$  TB  
-mức BTh -cao + NC rất cao BMV

- ☐ a. Phối hợp thuốc ngay từ đầu cho mọi bệnh nhân
- ☐ b. Chỉ khởi đầu điều trị thuốc sau khi thất bại với thay đổi lối sống, trừ trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp độ III
- ☐ c. Nếu không đạt kiểm soát huyết áp sau 2 tháng, cần tăng liều hoặc phối hợp thêm Spironolactone
- ☒ d. Có thể xem xét điều trị ở bệnh nhân huyết áp bình thường cao và có bệnh tim thiếu máu cục bộ

**Question 6**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Cách đây 1 năm bệnh nhân đã chụp mạch vành ghi nhận hẹp 70% nhánh LCx. Bệnh nhân này được thực hiện siêu âm tim, ghi nhận có rối loạn vận động vùng. Kết quả siêu âm tim nào phù hợp nhất?

- ☐ a. Vô động thất phải
- ☐ b. Loạn động thành dưới
- ☐ c. Giảm động thành trước
- ☒ d. Giảm động thành bên

**Question 7**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Cách đây 1 năm bệnh nhân đã chụp mạch vành ghi nhận hẹp 70% nhánh LCx. Bệnh nhân này được phân tầng nguy cơ tim mạch như thế nào?

- ☒ a. Rất cao
- ☐ b. Thấp
- ☐ c. Trung bình
- ☐ d. Cao

**Question 8**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Thuốc lợi tiểu sau đây thường được sử dụng > 1 lần/ngày?

- ☐ a. Indapamide
- ☒ b. Furosemide
- ☐ c. Eplerenone
- ☐ d. Spironolactone

