

# ĐỀ KIỂM TRA NGOẠI LẦN 1

YLT NĂM 4 TP HCM - NGÀY 6/03/2014 (60 PHÚT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

- A. Trong chấn thương bụng kín, tạng đặc bị thương tổn ít hơn tạng rỗng  
B. Trong chấn thương bụng kín, tạng đặc bị thương tổn tương đương với tạng rỗng  
C. Trong vết thương bụng, tạng đặc bị thương tổn nhiều hơn tạng rỗng  
D. Trong vết thương bụng, tạng đặc bị thương tổn tương đương với tạng rỗng  
E. Trong vết thương bụng, tạng đặc bị thương tổn ít hơn tạng rỗng

57. Trong chấn thương bụng kín, phân độ tổn thương gan chủ yếu dựa vào:

- A. X quang bụng đứng không sửa soạn  
B. Siêu âm bụng  
C. Doppler bụng  
D. CT bụng  
E. Soi ổ bụng chẩn đoán

58. Trong chấn thương / vết thương bụng, vai trò chính của siêu âm:

- A. Chẩn đoán vỡ tạng rỗng  
B. Phân độ vỡ tạng đặc  
C. Là phương tiện đầu tay để chẩn đoán chảy máu trong  
D. Là phương tiện đầu tay để chẩn đoán viêm phúc mạc  
E. Xác định có thủng lá phúc mạc thành

59. Vai trò của CT trong chấn thương bụng kín. Chọn câu KHÔNG PHÙ HỢP

- A. Có giá trị trong chẩn đoán tụ máu sau phúc mạc  
B. Có thể khảo sát nhiều bộ phận ở bệnh nhân đa thương  
C. Chẩn đoán, phân loại tổn thương gan, lách, thận với độ đặc hiệu cao  
D. Là phương tiện đầu tay để chẩn đoán vỡ tạng rỗng  
E. Rất có giá trị chẩn đoán ở bệnh nhân mà thăm khám lâm sàng còn nghi ngờ

60. Trong chấn thương bụng kín, chỉ định chọc dò ổ bụng:

- A. Thường qui cho mọi trường hợp  
B. Khi lâm sàng có hội chứng chảy máu trong rõ rệt  
C. Khi siêu âm thấy rõ có máu trong xoang phúc mạc  
D. Khi CT thấy có vỡ gan hoặc lách  
E. Khi lâm sàng nghi ngờ có chảy máu trong và cơ sở y tế chưa được trang bị máy siêu âm

HẾT