ĐỂ THI HỌC PHẢN NGOẠI TÔNG QUÁT Đối tượng: Y Học Cổ Truyền + Y học Dự phông năm 3. Ngày thi: 17/05/2016. Thời gian làm bài: 30 phút

ĐÈ 1

VRT Câu 1: Bệnh sinh của viêm ruột thừa cấp; nơi khởi đầu qua quá trình viêm ruột thừa (chọn I câu

A. Lớp thanh mạc.

B. Lóp cơ dọc.

C. Lóp cơ vòng.

D. Lớp thanh mạc và lớp cơ vòng.

Lớp niêm mạc.

Câu 2: Chấn đoán Việm ruột thừa cấp (chọn 1 câu đúng): **VRT**

A. Đau và ấn đau hố chậu phải là đủ.

B. Công thúc bạch cầu giữ vai trô quyết định.

C. Siêu âm bụng giữ vai trò quyết định.

D Có thể nhằm với bệnh viêm túi thừa manh tràng. E. Thường được chân đoán sớm ở người lớn tuổi.

VRT Câu 3: Điều trị Viêm ruột thừa cấp (chọn 1 câu đúng):

A. Điều trị kháng sinh phố rộng, liêu cao là đủ. Phầu thuật nội soi cấp cứu cắt ruột thừa.

C. Phầu thuật nội soi bán khẩn cắt ruột thừa.

D. Điều trị kháng sinh mạnh, phẫu thuật cắt ruột thừa sau 1 tuần.

E. Điều trị kháng sinh mạnh, phẫu thuật cắt ruột thừa sau 4 tuần.

K tuy Câu 4: Yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư tụy (chọn 1 câu đúng):

A. Chúng tộc da trắng. B) Nghiện thuốc lá.

C. Chế độ ăn có nhiều chất xơ.

D. Bênh cao huyết áp.

E. Viêm tụy cấp.

Câu 5: Ba triệu chứng cơ năng thường gặp của ung thư tuy theo xuất độ từ cao đến thấp là (chọn 1 K tuy câu đúng):

A. Đau bung, nôn ra máu, vàng da.

B. Vàng da, đau bụng, nôn ra máu.

C. Vàng da, đau bụng, sụt cần. D.) Đau bụng, vàng da, sụt cân.

E. Nôn ra máu, vàng da, đau bụng.

Γ3: xâm lấn tá tràng, đường

mật, mô quanh tụy T4: bướu lan tới dạ dày, lách, đại tràng và các mạch máu lần

không có triệu chứng hay xét nghiệm nào, CLS nào chẩn

đoán chính xác được VRT trong tất cả các TH

Câu 6 Ung thư tụy giai đoạn 3 là (chọn 1 câu đúng): K tuy

A. Buổu nhỏ hơn 2cm trong nhu mô tụy.

B. Bướu có kích thước từ 2,1-4cm, không có di căn hạch.

Bướu có kích thước từ 2,1-4cm, có di căn hạch.

Bướu 4.1-6cm, có xâm lấn phúc mạc sau và tĩnh mạch. Bướu trên 6cm và có di căn đến các cơ quan lân cận.

Câu 7: Đặc điểm của chấn thương bụng kín và vết thương bụng (chọn 1 câu đúng): Tạng rỗng thường bị tồn thương trong chấn thương bụng kín là đạ đây, ruột non VT bung Tạng rỗng thượng bị tôn thương trong chấn thương bụng kin là tá tràng. Có thể có vỡ gan kèm vỡ hỗng trắng. Q. Tạng rỗng thường bị tôn thương trong chắn thương bụng kín hơn là vết thương bụng. Tá tràng chí bị tôn thương do vết thương bụng. VT bung Câu 8 Tổn thương võ lách độ II bao gồm (chọn 1 câu đúng); Tụ máu dưới bao 10-50% diện tích, tụ máu trong nhu mố < 5cm bề sấu. IB. Vở nhu mô > 3cm bế sâu, không ánh hưởng mạch máu bè. Từ máu dưới bao > 50% diện tích; tụ máu trong nhu mô > 5cm bể sấu D. Võ thủy lách hay đút mạch máu rồn lách chi phối > 25% lách LE. Rách bao lách, vỡ nhu mô < 1cm bề sâu VT bụng Câu 9: Triệu chứng thực thể của xuất huyết nội do chấn thương bụng kín tchọn 1 cấu đúng): Bung chường ngay từ lúc bắt đầu có xuất huyết nội. Nghe nhu đông ruột giảm. Go mất vùng đục trước gan. Sò bung mềm xẹp, không điểm đau hay cảm ứng phúc mạc. Tham trực tràng không phát hiện bất thường. Câu 10: Nghe nhu động ruột tăng gặp trong bệnh (chọn 1 câu đúng): Tác ruột A. Thúng ô loét tá tràng. B. Võ lách do chấn thương bụng.) Tắc ruột do đính. D. Tắc mật do u bóng Vater. E. Hep môn vị do u hang vị. Câu 11: U bung không thể sở được ở vùng trên rốn (thượng vị) khi khám bung (chọn 1 câu đúng): K tuy . U hang vi. K gan? U tâm vi. U đại tràng ngang. U đầu tuy. U gan trái. Câu 12; về phân độ; Trì nội độ 1 là (chọn 1 câu đúng): Trĩ A Nằm trong ống hậu môn. B. Sa thường xuyên ra ngoài. C. Sa ra khi đi cầu, tự thụt vào được. D. Sa ra khi đi cầu, phải đẩy mới vào. E. Nam trong long trực trang. Câu 13: Điểm đau Mayo Robson gặp trong bệnh (chọn 1 câu đúng): khác A. Việm đã dày cấp. B. Viêm mù đường mật. giao xs 12 và bờ ngoài cơ dựng sống bên (T). C. Viêm túi mật cấp. Viêm tuy cấp. E. Viêm đài bể thận cấp.

Rò HM (Dau hậu môn. C. Chây máu hậu môn khi rận. D. Chây mú qua lỗ hậu môn. Tiểu phân có dàm, nhầy.
Rò HMC	Do ung thư hậu môn – trực tràng. B. Do sa trực tràng kiểu túi. C. Do lao vùng hậu môn – trựcc tràng. Do nhiễm trùng không đặc hiệu tuyến hậu môn. E. Do xạ trị sau phẫu thuật ung thư trực tràng.
úi mậ <mark>l (</mark> C	A. Túi mật sành sử (Porcelain). B. U cơ tuyến túi mật (adenomyomatosis). Nhiễm Samonella. Viêm túi mật mạn. Bùn túi mật.
rờng mặ	âu 17: nói về tam chứng Charcot, 3 triệu chứng điển hình xuất hiện theo thứ tự (chọn 1 câu đúng: A. Sốt, đau hạ sườn phải, vàng da. B. Sốt, nôn ỏi, vàng da. C. Đau hạ sườn phải, vàng da, sốt. Dau hạ sườn phải, sốt, vàng da. E. Đau hạ sườn phải, sốt, gan to.
ò HM	âu 18: Tư thế đúng của bệnh nhân khi thăm khám hậu môn – trực tràng (chọn 1 câu đúng): B. Nằm nghiêng phải; hồng và đầu gối co. C. Nằm sắp, hai chân dạng 2 bên. D. Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng. E. Tư thế sản khoa.
	A) Thừng xo của bệnh rò hậu môn. B. U ống hậu môn. C. U trực tràng thấp. D. Nhú gai ống hậu môn. E. U trực tràng cao.
i mật Câ	A. Phái nữ. B. Uống thuốc ngừa thai. C. Tuổi giả. D. Nhiễm trùng đường ruột. E. Béo phì.

Đ

K gan, tụy Dạ dày? 1: Nguyên tắc khám thực thể U bung, (chọn 1 câu đúng): Không nên thâm trực tràng. Gổ là động tác thâm khám quan trong nhất. Số tiếp cần đầu tiên ngay khối u. Theo 4 bude: nhin, nghe, gō, sò. Không cần khám lỗ thoát vị. K gan tụy dạ dày, 22: Các tính chất của khối u cần lưu y khi khẩm bụng: NGOẠI TRỦ Jehọn I câu sai): A. Vị trí của khỏi u theo phân khu ô bung. B. Đuu khi ản chân. C. Kich thước, hình dạng, giới hạn của khối u. D. Mức độ dì động của khôi u. k gan Ký năng nghe trên khối u không có ý nghĩa TV ben đùi Cầu 23: Cơ chế chống thoát vị tự nhiên của thoát vị ben (chọn 1 câu đúng): A. Cơ chế cơ vòng tại lỗ ben nông. B. Tác dụng cơ vòng của cơ chéo bung ngoài và cơ ngang bụng ở lỗ bện sâu. Cơ chế màn trập của cơ chéo trong. D. Tác dụng cơ vòng của dây chẳng Hesselbach và cơ chéo ngoài tại lỗ bẹn sâu. Tác dụng của cung cần cơ ngang che thành ben sau khi co. Câu 24: Phầu thuật điều trị thoát vị ben)chọn 1 câu đúng): TV ben đùi A. Chỉ nên thực hiện đối với các trường hợp thoát vị ben nghọt. Có thể thực hiện bằng mô mở hay mô nội soi. Nên thực hiện đối với các trường hợp xơ gan mật bù. D. Thực hiện trước đối với các trường hợp có kèm bí tiểu do u xơ tiến liệt tuyến. E. Chẳng chỉ định ở bệnh nhân lớn hơn 60 tuổi. Câu 25: Diễn tiến thường gặp của triệu chứng đau bụng trong bệnh thúng đa dây (chọn 1 câu đúng): VT bung A Dau bung vùng thương vị sau đô lan xuống HC(P) và khắp bung B. Đau bung quanh rồn sau đó chuyển đau HC(P) C. Đau bung vùng HC (P) sau đó chuyển sang đau thượng vị D. Đau bung vùng thượng vị sau đó chuyển đau HC(P) E. Dau quanh ron tan ra sau lung. Câu 26: Cận làm sáng đầu tiên cần làm khi nghi ngờ bệnh nhân bị thúng đạ dày (chọn 1 câu đúng): VT bung A. Siêu âm bụng C. CT Scan bung XQ bung đứng không sửa soạn. D. XQ phôi tháng E. MRI bung hẹp môn vị Câu 27: Hình ánh dạ dây ở giai đoạn sớm trong bệnh cánh hẹp môn vị do loét tá tràng (chọn 1 câu dung): A. Da dây dân to, mất trương lực Da đây tăng co bốp, thành phi đại D. Da dây teo nhỏ do tình trạng hẹp môn vị E. Da day nhiệm cũng

hẹp môn vị Câu 28: Triệu chứng thực thể có giá trị nhất trong chẳn đoán hẹp môn vị (chọn 1 câu đúng); A. Số được khối u ở vùng trên rốn. Dấu óc ách dương tính khi đói. B.)Dau óc ach dương tính kh C. Gỗ vang ở vùng trên rốn. D. Gỗ đục vùng trên rốn. E. Nghe nhu động ruột tăng ở vùng trên rồn. Câu 29: Triệu chúng đau bụng trong tắc ruột cơ học (chọn 1 câu đúng): Tắc ruôt A. Thường nổi bật ở người bệnh lớn tuổi (> 75 tuổi). B. Đau bung có tính âm i. Đau bung có tính quặn từng con. R. Không xảy ra đối với tắc ruột sớm sau mô. E. Đau nhiều, liên tục gọi ý tỉnh trạng tắc ruột sắp khai thông. Cậu 30: Dấu hiệu Howship Romberg dương tính gặp trong trường hợp (chọn 1 câu đúng): TV ben đùi Thoát vị bện phải nghệt. B. Thoát vị ben trái nghẹt. C. Thoàt vi đùi. D) Thoát vị bịt. E. Thoát vì vêt mô nghẹt. Câu 31: Phương tiện hình ảnh học có giá trị nhất giúp chấn đoán nguyên nhân của tắc ruột cơ học Tắc ruôt (chọn 1 câu đúng): A. Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) B. Siêu âm bung C. X quang bung đứng D. Chụp cộng hưởng từ E. Chụp cản quang đường ruột Câu 32: Nguyên nhân thường gặp nhất của lồng ruột ở trẻ em (chọn 1 câu đúng): Tắc ruôt A. Túi thừa Meckel. B) Không có nguyên nhân (Lông ruột tự phát). C. Polyp ruôt non. D. Hội chứng Peutz-Jeghers. E. Búi giun đũa. Tắc ruôt Câu 33: Đặc điểm không phải của lông ruột ở người lớn (chọn 1 câu sai): A. Thường có nguyên nhân cụ thể. B. Lông đại tràng chiếm 1/3 trường hợp. C. Thường lồng ruột diễn tiến theo kiểu mạn tính. D. Là nguyên nhân thường gặp của tắc ruột. E. Có thể không phân biệt được với tắc ruột do u đại tràng. Câu 34: Khi lá phúc mạc bị việm, vi khuẩn và độc tố có thể thâm nhập vào máu gây nên nhiễm **VPM** khuẩn huyết là đo (chọn 1 cấu đúng)? A. Hàm lượng độc tố của vi khuẩn tăng cao. B. Sự chênh lệch về áp lực thẩm thấu. C. Tăng áp lực ổ bụng. D. Su dân rộng của các khe hở giữa các tế bào lá phúc mạc. (E) Tất cả đều đúng.

Câu 35: Để xác định chấn đoán Việm phúc mạc, dấu hiệu nào sau đây là quyết định chấn đoán **VPM** (chọn I cấu đúng): A. Đau bụng có tính liên tục, tăng dẫn. B. Khám thực thể có dấu hiệu co cứng thành bụng. C. X quang bung có hơi tự do. D. Siêu âm bung có dịch. E. CT sean có dịch tự do trong ô bung. Câu 36: Viêm phúc mạc thứ phát; NGOAI TRừ (chọn I câu sai) **VPM** A. Thung ô loét tá trang. B. Thung ung thư hang vi. C Lao phúc mac D. Viêm phúc mạc do viêm phần phụ. E. Viêm ruột thừa hoại từ thúng. Câu 37: Yếu tổ thuận lợi của ung thư thực quản; NGOẠI TRỦ (chọn 1 câu sai): khác A. Nghiện rươu, thuốc lá. B. Thuc quan barrett. C. Hội chứng Plummer-Vinson. D. Co thất tâm vi không điều trị. E. Viêm thực quản do nắm. Câu 38: Triệu chứng co năng thường gặp nhất của ung thư thực quản 1/3 giữa (chọn câu đúng): K dạ dày Nuốt nghen. B. Sut cân. C. Thiếu máu. D. Khàn tiếng. E. Non oe. K da dày Câu 39: Loại mô học thường gặp nhất của ung thư đạ dày:) Ung thư biểu mô tuyển. B. Ung thu tế bào gai. Lymphoma. D. OUSTS. E. Sarcoma da day. Câu 40: Triệu chứng lâm sảng giai đoạn sớm của ung thư dạ dày (chọn 1 câu đúng): K dạ dày A. Vàng da, vàng mặt, Cảm giác đầy bụng, ăn chấm tiêu. C. Đau thượng vị liên tục, đau về đêm. D. Báng bụng. E. Da xanh, niêm nhạt, Câu 41: Vai trò của Nội soi dạ dây - tá tràng trong chân đoán ung thư dạ dày (chọn 1 câu đúng): K da dày A- li có giá trị hơn so với chụp XQuang đạ dày càn quang. B. Không cần thiết đối với ung thư giải đoạn muộn. Có giá trị cao đối với các trường hợp ung thư sớm. D. Giúp đánh giá giai đoạn bệnh. E. Giúp đánh giá mức độ xâm lấn của tồn thương.

K dạ đầy 42: Điều trị ung thư biểu mô tuyến của đạ đây giai đoạn II (chọn 1 cấu đúng): A. Hóa trị giữ vai trò quyết định. B. Xạ trị giữ vai trò quyết định. Phầu thuật giữ vai trò quyết định. D. Ký thuật cắt niệm mạc qua nội soi (EMR) là tốt nhất, E. Kỹ thuật cắt dưới niềm mạc qua nội soi (ESD) là tốt nhất. KĐT Cấu 43: Vị trí thường gặp nhất của ung thư đại - trực tràng là (chọn I câu đúng): A. Manh tràng B. Đại tràng góc gan và góc lách C. Đại tràng ngang D. Đại tràng lên và đại tràng xuống Dại tràng chậu hông và trực tràng. KĐT Câu 44: Phương pháp phầu thuật nào sau đây thực hiện cắt bò các cơ thất hậu môn trong điều trị ung thu true trang: A. Phầu thuật Hartmann B. Phẫu thuật Miles C. Phầu thuật cắt trực tràng, nổi trước thấp. D. Phẫu thuật cắt đoạn đại - trực tràng, nổi tận - tận. E. Phầu thuật Kraske. Câu 45: Yếu tố sau đây không phải là vều tố nguy cơ gây nên ung thư gan nguyên phát:) K gan A. Sieu vi viêm gan B B. Siêu vi viêm gan C. C. Gan xo. D) Sôi đường mật. E. Aflatoxin Bi