

Pretest CBL sốc 28/12/21

...

Xin chào, Quý. Khi bạn gửi biểu mẫu này, chủ sở hữu sẽ thấy tên và địa chỉ email của bạn.

* Bắt buộc

1. Họ và tên

*

Quý Khoa

2. Tổ - lớp


*

27-Y16E

3. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu?

(1 Điểm)

- ☐ C. Albumin
- ☒ A. Lactate Ringer
- ☐ B. Natriclorua 3%
- ☐ D. Dextrose 5% in saline

4. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc phản vệ là gì? 

(1 Điểm)

- ☐ D. Thở oxy
- ☐ A. Dịch chống sốc
- ☒ C. Tăng co mạch
- ☐ B. Tăng co bóp cơ tim

5. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, xét nghiệm nào cần theo dõi sát để đánh giá tình trạng tưới máu?
(1 Điểm)

- ☒ D. Khí máu động mạch
- ☐ B. Ure, creatinin
- ☐ C. AST, ALT
- ☐ A. Công thức máu

6. Triệu chứng nào sau đây cần nhập cấp cứu?
(1 Điểm)

- ☐ D. Ói nhiều không uống được
- ☐ A. Thở nhanh
- ☒ C. Tím trung ương
- ☐ B. Thở co lõm

7. Trong chẩn đoán sốc ở trẻ em, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?
(1 Điểm)

- ☐ A. Chi mát
- ☐ D. Lactate tăng
- ☒ B. Huyết áp giảm
- ☐ C. CRT kéo dài

8. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc giảm thể tích là gì?
(1 Điểm)

- ☐ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☒ A. Dịch chống sốc
- ☐ D. Thở oxy
- ☐ C. Tăng co mạch

9. Trong các xét nghiệm sau, xét nghiệm nào giúp chẩn đoán sốc?
(1 Điểm)

- ☐ B. CRP tăng
- ☒ C. Khí máu toàn chuyển hoá anion gap tăng
- ☐ A. Công thức máu có bạch cầu tăng
- ☐ D. Cấy máu có vi khuẩn

10. Bệnh nhi bị sốc xuất huyết, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu?
(1 Điểm)

- ☐ C. 8 g/dL
- ☐ B. 9 g/dL
- ☒ A. 10 g/dL
- ☐ D. 7 g/dL

11. Tại sao bệnh nhi sốc cần thở oxy?
(1 Điểm)

- ☐ D. Tăng oxy hoà tan
- ☐ B. Tăng liên kết của hồng cầu với oxy

☐ A. Bệnh nhân sốc có suy hô hấp kèm

☐ C. Tăng tưới máu

12. Ở bệnh nhi sốc, khí máu động mạch có bất thường sau là phù hợp tình trạng giảm tưới máu?
(1 Điểm)

☐ C. Toàn hô hấp

☐ B. Toàn chuyển hoá, anion gap tăng

☐ D. Kiềm chuyển hoá

☐ A. Toàn chuyển hoá, anion gap bình thường

13. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng – nhọt da vùng cẳng chân (P), nhiễm từ cộng đồng, kháng sinh đầu tay thích hợp là gì?
(1 Điểm)

☐ C. Meropenem

☐ B. Vancomycin

☐ D. Ceftazidim

☐ A. Ceftriaxone

14. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc nhiễm trùng là gì?
(1 Điểm)

☐ B. Tăng co bóp cơ tim

☐ D. Thở oxy

☐ A. Đặt nội khí quản sớm

☐ C. Tăng co mạch

15. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc tim là gì?
(1 Điểm)

- ☐ C. Tăng co mạch
- ☒ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☐ D. Thở oxy
- ☐ A. Dịch chống sốc

16. Trong các trẻ sau, trẻ nào nên được nhập cấp cứu?
(1 Điểm)

- ☐ A. Trẻ 2 tuổi sốt co giật cách 1h, hiện hết giật còn sốt, ba trẻ lo lắng vì tiền căn có sốt co giật
- ☒ D. Trẻ bị hóc dị vật đường thở
- ☐ C. Trẻ bị gãy xương
- ☐ B. Trẻ bị bỏng ở bàn tay (P)

17. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu?
(1 Điểm)

- ☐ C. Albumin
- ☒ A. Natriclorua 0,9%
- ☐ B. Natriclorua 3%
- ☐ D. Dextrose 5% in lactate

18. Ở bệnh nhi sốc, mục tiêu ScvO₂ cần đạt được là bao nhiêu?
(1 Điểm)

- ☐ D. 60% - 70%

☐ A. 90% - 100%

☒ C. 70% - 80%

☐ B. 80% - 90%

19. Triệu chứng lâm sàng nào là quan trọng nhất trong chẩn đoán sốc?
(1 Điểm)

☒ C. Giảm tưới máu

☐ A. Mạch tăng

☐ D. Chi mát

☐ B. Huyết áp giảm

20. Phân giai đoạn sốc dựa vào triệu chứng nào?
(1 Điểm)

☐ C. Huyết áp tâm trương

☐ A. Mạch nhanh

☐ D. Huyết áp trung bình

☒ B. Huyết áp tâm thu

21. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu?
(1 Điểm)

☐ D. 7 g/dL

☐ C. 8 g/dL

☒ A. 10 g/dL

☐ B. 9 g/dL

22. Bệnh nhi sốc phản vệ, vận mạch đầu tay là gì?
(1 Điểm)

- ☐ B. Noradrenaline
- ☒ A. Adrenalin
- ☐ D. Dobutamin
- ☐ C. Dopamin

Gửi

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu.
Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | [Quyền riêng tư và cookie](#) | [Điều khoản sử dụng](#)