

ĐỀ NGOẠI NIỆU 2014

1. Cách nào sau đây thường gây nhiễm trùng niệu nhất?

- A. Vi khuẩn lây lan qua đường máu
- B. Vi khuẩn lây lan qua hạch huyết
- C. Vi khuẩn xâm nhập trực tiếp từ các cơ quan kế cận
- ☒ D. Vi khuẩn quanh niệu đạo di chuyển lên đường niệu
- E. Vi khuẩn lây lan theo đường xuôi chiều

2. Trên lâm sàng, trong điều trị nhiễm trùng niệu không đặc hiệu và không phức tạp, để khắc chế hiện tượng đột biến của vi khuẩn, người ta làm gì. CHỌN CÂU SAI:

- A. Truyền nước và ghi ký hiệu nhanh để làm giảm số lượng vi khuẩn trước khi bắt đầu điều trị
- B. Tăng liều kháng sinh gấp đôi hoặc gấp ba trong 48 giờ đầu để vượt trên MIC càng nhiều càng tốt
- C. Chọn loại kháng sinh có nồng độ trong nước tiểu cao hơn MIC càng nhiều càng tốt
- D. Không cần thiết phối hợp kháng sinh
- ☒ E. Luôn cho bệnh nhân nhập viện để điều trị kháng sinh

3. Nam < 25 tuổi có cha bị ung thư tiền liệt tuyến, khi nào nên thử PSA?

- A. Nên thử ngay
- B. Nên thử ở độ tuổi 30

☒ C. Nên thử ở độ tuổi 40

- D. Nên thử ở độ tuổi > 50
- E. Thử khi có triệu chứng

4. Các ung thư tiền liệt tuyến có cùng giai đoạn nhưng có các độ đặc biệt hóa khác nhau, loại nào có dự hậu xấu nhất

- A. Gleason 5 (2+3)
- B. Gleason 4 (2+2)
- C. Gleason 5 (3+2)

☒ D. Gleason 7 (4+3)

- E. Gleason 7 (3+4)

5. Nội tiết tố nào kích thích sự phát triển của ung thư tiền liệt tuyến ( carcinoma tuyến)

☒ A. Androgen

- B. Estrogen
- C. Estrogen và androgen



D. Aldosteron và Testosteron

E. Progesteron và Estrogen

6. Nạo hạch chậu bịt hai bên trong ung thư tiền liệt tuyến nhằm mục đích:

A. Giảm tỉ lệ tái phát

B. Cải thiện khả năng sống còn

C. Giảm giai đoạn và di căn

D. Giảm tình trạng thận ứ nước do hạch chèn ép rốn thận

E. Không nên nạo hạch chậu bịt vì tổn rất nhiều thời gian

7. Ung thư tiền liệt tuyến thường cho di căn nhiều nhất đến

A. Phổi

B. Gan

C. Xương

D. Não

E. Thận

8. PSA có thể tăng trong các trường hợp sau, NGOẠI TRỪ:

A. Bướu lành tiền liệt tuyến

B. Viêm tiền liệt tuyến

C. Sau giao hợp hay sau khi thăm khám tiền liệt tuyến

D. Dùng thuốc nhóm ức chế 5 alpha- reductase

E. Sau sinh thiết tiền liệt tuyến

9. Triệu chứng thường gặp nhất của bướu bàng quang là:

A. Khối u hạ vị

B. Phù 2 chân

C. Tiểu máu

D. Tiểu lắt nhắt

E. Bí tiểu

Khi thăm khám và làm siêu âm phát hiện một khối đặc ở tinh hoàn một bệnh nhân anh (chị) sẽ làm:

Mở bìu sinh thiết