

MCQ Questions

Câu hỏi

- 1** Để đánh giá tình trạng thai trong các tuần đầu của thai kỳ, siêu âm và khảo sát diễn biến hCG được dùng rất phổ biến. Mỗi liên quan giữa siêu âm và hCG được thể hiện như thế nào. Chọn một câu đúng

- ☒ **A.** • Siêu âm là tiếp cận sơ cấp. Diễn biến hCG được chỉ định khi siêu âm không giúp khẳng định
- ☐ **B.** • Diễn biến hCG là tiếp cận sơ cấp. Siêu âm được chỉ định khi diễn biến hCG không giúp khẳng định
- ☐ **C.** • Siêu âm và theo dõi diễn biến hCG là hai tiếp cận ưu tiên tương đồng, quan hệ mật thiết với nhau
- ☐ **D.** • Cả ba đường lối tiếp cận trên đều được dùng. Quyết định đường lối tiếp cận tùy theo mục tiêu

- 2** Bạn đang thực hiện siêu âm sinh trắc định tuổi thai cho một thai phụ đang ở tuần thứ 8 kể từ ngày kinh cuối. Bạn làm gì trước tiên nếu kết quả siêu âm sinh trắc không phù hợp với tuần thứ 8 của thai kỳ? Chọn một câu đúng

- ☒ **A.** • Thực hiện một định lượng hCG hay diễn biến của nhiều định lượng hCG liên tiếp để lý giải

Thời gian còn lại

0:9:36



Số báo danh

20190309_6750

SUBMIT

IF AT			
C1	★	B	C
C2	A	★	C
C3	A	B	★
C4	A	★	C
C5	A	B	C
C6	A	B	C
C7	★	B	C
C8	A	B	★
C9	A	B	C
C10	A	B	C
SCORE:4			

B. ● Tìm hiểu lại thông tin về chu kỳ kinh, tính chất của lần có kinh cuối và dữ kiện lâm sàng khác

C. ● Hẹn thực hiện siêu âm hiệu chỉnh tuổi thai dựa vào đường kính lưỡng đỉnh lúc thai 12 tuần vô kinh

D. ● Phải phối hợp cả ba cách tiếp cận trên trong trường hợp có mâu thuẫn trong các dữ kiện

3 Trong trường hợp không quan sát thấy hoạt động tim phôi ở một phôi có CRL = 5 mm, quyết định nào là hợp lý nhất? Chọn một câu đúng

A. ● Kết luận rằng thai đã ngưng phát triển. Thực hiện chấm dứt thai kỳ

B. ● Chỉ định thêm một siêu âm kiểm tra ngay sau đó để xác nhận tình trạng thai

C. ● Hỏi xem đã có một siêu nào trước đó hay chưa. Nếu có, đối chiếu các dữ kiện

D. ● Chỉ định thêm một siêu âm kiểm tra 7-10 ngày sau để xác nhận tình trạng thai

4 Hãy cho biết tiêu chuẩn để xác định độ dày khoảng thấu âm sau gáy (NT) là dày. Chọn một câu đúng

A. ● Trị số NT đo được lớn hơn trị số bách phân vị thứ 95 của NT ở dân số có nguy cơ cao lệch bội

IF AT			
C1	★	B	C
C2	A	★	C
C3	A	B	★
C4	A	★	C
C5	A	B	C
C6	A	B	C
C7	★	B	C
C8	A	B	★
C9	A	B	C
C10	A	B	C
SCORE:4			

B. • Trị số NT đo được lớn hơn trị số bách phân vị thứ 95 của NT ở dân số có số đo CRL tương ứng

C. • Trị số NT đo được lớn hơn trị số bách phân vị thứ 95 của NT ở dân số có tuổi thai tương ứng

D. • Trị số đo được của NT lớn hơn một điểm cắt (cut-off point) xác định (như 2.5mm hay 3 mm)

5 Làm cách nào để giảm được âm tính giả về mức thấp nhất khi thực hiện test tiền sản không xâm lấn tầm soát lệch bội. Chọn một câu đúng.

A. • Thực hiện test sớm, trước thời điểm tuổi thai 8 tuần vô kinh

B. • Luôn phối hợp với một test huyết thanh tầm soát lệch bội (double test, triple test)

C. • Yêu cầu khảo sát nhiều lệch bội hơn, thay vì chỉ khảo sát các lệch bội phổ biến (13, 18, 21)

D. • Cảnh báo cho labo về các trường hợp có nguy cơ rất cao (chuyển đoạn robertsonian...)

6 Một người có tiền căn sanh con bị β -Thalassemia thể nặng. Bà ta hiện đang có thai đứa con thứ nhì, thai 12 tuần. Làm gì trước tiên? Chọn một câu đúng

A. • Điện di hemoglobin 2 vợ chồng

IF AT			
C1	★	B	C
C2	A	★	C
C3	A	B	★
C4	A	★	C
C5	A	B	C
C6	A	B	C
C7	★	B	C
C8	A	B	★
C9	A	B	C
C10	A	B	C
SCORE:4			

B. • Tìm đột biến Thalassemia ở 2 vợ chồng

C. • Test xâm lấn tìm đột biến Thalassemia ở thai nhi

☒ **D.** • Hỏi xem lần này có thai với cùng một người chồng không

7 Làm gì trước tiên khi một thai phụ đang mang thai 3 tháng đầu, có test HBsAg dương tính? Chọn một câu đúng

☒ **A.** • Thực hiện HBeAg, AST, ALT

B. • Định lượng HBV-DNA ngay

C. • Định lượng HBV-DNA lúc 26-28 tuần

D. • Có chỉ định của thuốc kháng virus HBV

8 Làm gì khi một thai phụ đang mang thai 16 tuần, có test VDRL dương tính, không thấy tổn thương giang mai khi khám lâm sàng? Chọn một câu đúng

A. • Có chỉ định chấm dứt thai kỳ không điều kiện

B. • Điều trị Penicilline ngay, theo dõi thai sau đó

☒ **C.** • Thực hiện thêm một test treponemal (TP-PA)

D. • Thực hiện thêm một test non-treponemal (RPR)

IF AT			
C1	★	B	C
C2	A	★	C
C3	A	B	★
C4	A	★	C
C5	A	B	C
C6	A	B	C
C7	★	B	C
C8	A	B	★
C9	A	B	C
C10	A	B	C
SCORE:4			

9 Vì sao diễn giải kết quả huyết thanh CMV ở thai phụ khó khăn và phức tạp hơn diễn giải kết quả huyết thanh Rubella? Chọn một câu đúng

A. ☐ Do sự khác biệt trong thanh thải tác nhân gây bệnh khỏi cơ thể sau nhiễm cấp

B. ☐ Do sự khác biệt trong kiểu cách diễn biến khác nhau của kết quả huyết thanh IgM

C. ☐ Do sự khác biệt trong phương thức xuất hiện của tác nhân gây bệnh trong thai kỳ

D. ☒ Cả 3 lý do trên cùng là các lý do làm cho diễn giải kết quả huyết thanh CMV gặp khó khăn

10 Vấn đề đáng lưu tâm nhất trong thai kỳ với song thai khác trứng là gì? Chọn một câu đúng

A. ☐ Kết cục sản khoa xấu nhất trong các song thai

B. ☐ Hội chứng truyền máu trong song thai

C. ☐ Sự phát triển chênh lệch giữa hai thai

D. ☒ Khó khăn kỹ thuật khi tầm soát lệch bội

IF AT			
C1	★	B	C
C2	A	★	C
C3	A	B	★
C4	A	★	C
C5	A	B	C
C6	A	B	C
C7	★	B	C
C8	A	B	★
C9	A	B	C
C10	A	B	C
SCORE:4			