



GÂY Mê HỒI SỨC (Anesthesiology Resuscitation) - PGS.TS. Nguyễn Trung Tín: Trưởng Bộ môn - ThS Hà Ngọc Chi : Leader

[Dashboard](#) ► [Courses](#) ► [Khoa Y](#) ► [CHƯƠNG TRÌNH MỚI](#) ► [Năm 5](#) ►

[Anesthesiology Resuscitation](#) ► [Pre-test](#) ►

Pre-test - Bài 2: Đại cương về các phương pháp vô cảm

Started on	Sunday, 7 November 2021, 6:43 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 7 November 2021, 6:44 PM
Time taken	56 secs

Question 1

Complete

Marked out of

2.00

Thứ tự độ mê từ nông đến sâu là:

- ☐ A. Thời kỳ giảm đau > thời kỳ phẫu thuật > thời kỳ kích động > thời kỳ ngộ độc
- ☒ B. Thời kỳ giảm đau > Thời kỳ kích động > Thời kỳ phẫu thuật > Thời kỳ ngộ độc
- ☐ C. Thời kỳ kích động > Thời kỳ ngộ độc > Thời kỳ phẫu thuật > Thời kỳ giảm đau
- ☐ D. Thời kỳ kích động > Thời kỳ giảm đau > Thời kỳ phẫu thuật > Thời kỳ ngộ độc
- ☐ E. Thời kỳ kích động > Thời kỳ phẫu thuật > Thời kỳ giảm đau > Thời kỳ ngộ độc

Question 2

Complete

Marked out of

2.00

Giai đoạn khởi mê, chọn câu **SAI**:

- ☐ A. Ở bệnh nhi, thường khởi mê bằng đường hô hấp
- ☐ B. Hạn chế kích thích trong giai đoạn này
- ☐ C. Được bắt đầu là khi đưa thuốc mê vào cơ thể bệnh nhân
- ☒ D. Giai đoạn này ngắn nên thường ít tai biến
- ☐ E. Mục đích làm cho bệnh nhân đạt độ mê, giảm đau, dẫn cơ thích hợp để đặt các phương tiện hỗ trợ hoặc kiểm soát hô hấp

Question 3

Complete

Marked out of

2.00

Gây mê phối hợp cân bằng phải đạt được:

- ☒ A. Mê, giảm đau, dẫn cơ
- ☐ B. An thần, giảm đau, không lạnh run
- ☐ C. Giảm đau, gây quên, chống nôn
- ☐ D. Mê, giảm đau, không kích thích
- ☐ E. An thần, giảm đau, không ô nhiễm môi trường

Question 4

Complete

Marked out of

2.00

Gây tê thuận lợi hơn gây mê, **NGOẠI TRỪ:**

- ☐ A. Ít nôn ói hậu phẫu hơn
- ☐ B. Có thể tương tác với phẫu thuật viên trong một số phẫu thuật
- ☒ C. Khởi phát nhanh hơn
- ☐ D. Có thể tương tác ngay với bé trong phẫu thuật mổ lấy thai
- ☐ E. Giảm đau hậu phẫu tốt hơn

Question 5

Complete

Marked out of

2.00

Tê tủy sống, chọn câu **SAI:**

- ☐ A. Có thể đâm kim từ cổ đến xương cùng
- ☐ B. Kim gây tê tủy sống thường nhỏ hơn kim gây tê ngoài màng cứng
- ☐ C. Khởi phát nhanh hơn so với tê ngoài màng cứng
- ☐ D. Là bơm thuốc tê vào khoang dưới nhện
- ☒ E. Chỉ định cho các phẫu thuật từ rốn trở xuống

