ĐỀ THI CUỐI KÌ LÝ THUYẾT NGOẠI THẦN KINH – ĐỢT 2 – Y17

Question 1	Cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán xuất huyết dưới nhện trong 72 giờ đầu
Not yet	
answered	
Marked out of	o a. MRI sọ não có tương phản từ
1.00	 b. Chọc dò dịch não tủy
Flag question	o c. CTscan sọ não có cản quang
Question 2	Chỉ định chụp CT-Scan sọ não trong CTSN, chọn câu sai:
Not yet	
answered	O = Tu2 M: M = #M = M = = :
Marked out of	o a. Trả lời lúc đúng lúc sai
1.00	 b. Co giật sau chấn thương
Flag question	○ c. Đau đầu nhiều
Question 3	Dấu hiệu thực thể có giá trị gợi ý xuất huyết dưới nhện tự phát là:
Not yet	
answered	
Marked out of	Ο a. Sụp mi
1.00	● b. Cổ gượng
← Flag question	o c. Liệt thần kinh III
	○ d. Yếu nữa người
Question 4	Độ tuổi thường gặp của xuất huyết dưới nhện tự phát là:
Not yet	
answered	
	○ a. 60 đến 70 tuổi
Marked out of	
Marked out of 1.00	
	 b. 50 đến 60 tuổi c. 40 đến 50 tuổi
1.00	

Question 5 Liên quan đến biểu hiện lâm sàng của bệnh lý u não, chọn câu sai: Not yet answered a. Đau đầu là triệu chứng thường gặp. Marked out of 1.00 b. Thường kèm thay đổi tính tình Flag question c. Co giật ở người trưởng thành có thể là triệu chứng duy nhất d. Đi loạng choạng có thể là triệu chứng của khối u não Question 6 Máu tụ ngoài màng cứng cấp tính do chấn thương sọ não, chọn câu đúng: Not yet answered a. Là thương tổn thứ phát Marked out of 1.00 b. Do đứt các tĩnh mạch liên lạc Flag question c. Thường kèm theo máu tụ trong não d. Thường kèm xuất huyết dưới nhện e. Liên quan đến cơ chế chấn động dội Question 7 Bảng phân độ bệnh nhân xuất huyết dưới nhện tự phát theo Hunt-Hess hoặc WFNS có giá trị, chọn câu Not yet đúng: answered Marked out of a. Phân độ càng cao, tiên lượng tử vong càng cao 1.00 b. Giúp lựa chọn phương pháp điều trị phẫu thuật hay hồi sức nội khoa Flag question c. Phân độ càng cao, tiên lượng càng tốt d. Giúp lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân Question 8 Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều và yếu 2 Not yet chân. Phương pháp sơ cứu thích hợp tại hiện trường, chọn câu sai: answered Marked out of a. Nên đặt hai túi cát ở 2 bên đầu để cố định cột sống cổ 1.00

b. Cần nhiều người di chuyển bệnh nhân thành một khối ra khỏi hiện trường

c. Có thể đặt bệnh nhân trên tấm ván để cố định bệnh nhând. Có thể lăn tròn bệnh nhân thành một khối khi di chuyển

e. Cần khiêng bệnh nhân ra khỏi hiện trường

Flag question

Question 9

Not yet answered

Marked out of

Flag question

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều và yếu 2 chân được sơ cứu tại bệnh viện huyện và chuyển lên tuyến trên. Khám: yếu hai chân sức cơ 2/5, tê bì từ ngang bẹn trở xuống. Đã được đặt sonde tiểu do có cầu bàng quang. Tổn thương có thể gặp ở bệnh nhân này là gì?

- \bigcirc a. Chấn thương gan, lách, thận và cột sống cổ, cột sống thắt lưng
- b. Chấn thương tạng đặc, cột sống thắt lưng, xương gót, xương đùi
- oc. Chấn thương xương gót, xương đùi, cột sống lưng và tạng rỗng
- O d. Chấn thương tạng rỗng, cột sống thắt lưng và cùng cụt
- O e. Chấn thương xương gót, xương đùi, cột sống lưng, tá tràng đoạn D2

Question 10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều và yếu 2 chân được sơ cứu tại bệnh viện huyện và chuyển lên tuyến trên. Khám: yếu hai chân sức cơ 2/5, tê bì từ ngang bẹn trở xuống. Đã được đặt sonde tiểu do có cầu bàng quang. Vị trí tổn thương cột sống ngang mức:

- o a. D12
- O b. D6
- O c. L1
- O d. D8
- e. D10



Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00



Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều. Khám: yếu hai chân sức cơ 4/5, tê bì từ ngang bẹn trở xuống, cầu bàng quang. Phân độ Frankel ở bệnh nhân này là:

- a. E
- O b. A
- O c. C
- d. D
- e. B

Question 12

Not yet answered

Marked out of

Flag question

Bệnh nhân nam, 44 tuổi đến khám vì yếu ½ người phải. Cách 3 tháng xuất hiện cơn co giật toàn thể, kéo dài khoảng 2 phút, mất ý thức trong cơn, sau cơn trở lại bình thường. Cơn tương tự xảy ra cách nay 1 tuần và sau khi tỉnh lại bệnh nhân thấy yếu ½ người bên phải. Không tiền căn chấn thương. Chẩn đoán lâm sàng phù hợp nhất là gì?

- a. U não trên lều
- b. Xuất huyết não trán
- o. Túi phình động mạch cảnh trong
- O d. Động kinh vô căn nguyên phát
- o e. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính

Question 13

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông. Khám: mê, GCS=7 điểm, thở máy, kích thích đau không đáp ứng người phải, dãn đồng từ bên trái, sưng to vùng thái dương trái. Chẩn đoán lâm sàng được nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này:

- a. Tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu trái
- O b. Tụ máu ngoài màng cứng cấp tính thái dương phải
- o. Tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu phải
- d. Tụ máu ngoài màng cứng cấp tính thái dương trái

Question 14

Not yet answered

Marked out of

Flag question

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông. Khám: mê, GCS=7 điểm, thở máy, kích thích đau đáp ứng kém $\frac{1}{2}$ người phải, dãn đồng tử bên trái, sưng to vùng thái dương phải. Cận lâm sàng nào phải được thực hiên ngay?

- a. CTscan so não không cản quang
- b. XQ so thẳng nghiêng
- c. Cấp cứu ABCD trước khi thực hiện cận lâm sàng
- d. MRI sọ não không tương phản từ

Question 15 Not yet	Biểu hiện ngoài da ở vùng cột sống bị dị tật chẻ đôi. Chọn câu sai:
answered	 a. Ãn lõm vùng cùng cụt, giữa rãnh gian mông
Marked out of 1.00	
Flag question	b. Rậm lông
V Hag question	c. Ấn lõm hình đồng tiền
	O d. Bướu máu
	 e. Khối u mỡ trên đường giữa, cạnh giữa cột sống
Question 16	Nguyên nhân thường gặp của xuất huyết dưới nhện tự phát:
Not yet	
answered	 a. Do vỡ túi phình động mạch não
Marked out of 1.00	
Flag question	
W Hag question	
	O d. Do viêm mạch tự miễn
Question 17	Những dấu hiệu nguy cơ thấp của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não là:
Not yet	
answered	
Marked out of	o a. Mất trí nhớ
1.00	b. Đau đầu
Flag question	○ c. Yếu nửa người
	O d. Nôn ói
Question 18 Not yet answered	Những nhận định sau đây về u não, chọn câu sai:
Marked out of	o a. Khoảng 50% khối u ở não là u di căn
1.00	 b. Điều trị u não hiện nay là điều trị đa mô thức: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị
Flag question	O c. Hiện nay, tỉ lệ u di căn ở não đang gia tăng do bệnh nhân ung thư có thời gian sống còn lâu hơn
,	 d. Động kinh ở người trưởng thành luôn là triệu chứng của khối u não
	e. U não hiện nay được chẩn đoán sớm hơn nhờ sự áp dụng CT, MRI rộng rãi
	5

Question 19	Sau chấn thương sọ não, có nước trong chảy ra từ mũi là do:
Not yet	
answered	O - NOA - was a saw al Ma Newton
Marked out of	a. Viêm xoang sau chấn thương
1.00	
Flag question	○ c. Vỡ xương đá
	O d. Tắc lệ đạo sau chấn thương
Question 20	Tầm soát dị tật ống thần kinh, chọn câu đúng:
Not yet	
answered	a. Luôn được khuyến cáo phá thai khi có chẩn đoán dương tính
Marked out of 1.00	
	o b. Thực hiện trong 3 tháng đầu thai kì
Flag question	○ c. Có thể bỏ sót 30 – 50% trường hợp
	 d. Các xét nghiệm: siêu âm thai, AFP, chọc ối
Question 21	
Not yet	Theo thang điểm Glasgow, chấn thương sọ não được xem là trung bình khi số điểm là:
answered	
Marked out of	O a. 10 – 14
1.00	O b. 13 -15
Flag question	
	O d. 8 - 12
Question 22	Tổn thương nguyên phát trong chấn thương sọ não là:
Not yet	
answered	
Marked out of	🔾 a. Phù não bán cầu
1.00	b. Rách mạch máu não
Flag question	o c. Tụt não dưới lều
	od. Máu tụ ngoài màng cứng

Question 23 Triệu chứng cơ năng có giá trị gợi ý xuất huyết dưới nhện tự phát là: Not vet answered a. Đau đầu khởi phát đột ngột và dữ dội Marked out of 1.00 b. Đột ngột mất ý thức Flag question c. Đông kinh liên tục d. Đau đầu dữ dội e. Đau đầu vùng cổ gáy Question 24 Triệu chứng lâm sàng của thoát vị đĩa đệm L4, chọn câu đúng: Not yet answered a. Đau mặt trước đùi và giảm phản xạ gân gối Marked out of 1.00 b. Yếu động tác nhón gót và giảm phản xạ gân gót Flag question c. Đau mặt ngoài đùi và giảm phản xạ gân gót d. Yếu động tác duỗi ngón cái và giảm phản xạ gân gót Question 25 Triệu chứng lâm sàng của tổn thương rễ thần kinh L4, chọn câu đúng: Not yet answered a. Đau mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân Marked out of 1.00 b. Đau mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân Flag question c. Đau mặt sau đùi, mặt trong cẳng chân d. Đau mặt trước đùi Question 26 Triệu chứng lâm sàng của tổn thương rễ thần kinh L5, chọn câu đúng: Not yet answered a. Đau mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân Marked out of 1.00 b. Đau mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân Flag question c. Đau mặt trước đùi, mặt trước cẳng chân d. Đau mặt sau đùi, mặt trong cẳng chân Question 27 Triệu chứng lâm sàng của tổn thương rễ thần kinh S1, chọn câu đúng: Not yet answered a. Đau mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân, không đứng được bằng mũi chân Marked out of 1.00 b. Đau mặt sau đùi, mặt trong cẳng chân, giảm phản xạ gân gót Flag question c. Đau mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân, không nhón gót được d. Đau mặt trước đùi, mặt trước cẳng chân, không nhón gót được

Question 28 Not yet	Triệu chứng lâm sàng thường gặp của khối u não dưới lều, chọn câu đúng:
answered Marked out of 1.00	a. Yếu nửa ngườib. Mất trí nhớ ngắn hạn
Flag question	 c. Co giật toàn thể d. Dáng đi thất điều e. Đau đầu vùng cổ gáy
Question 29 Not yet answered	Xác định vị trí giải phẫu xuất huyết dưới nhện tự phát
Marked out of	 a. Có máu trong các bể nền b. Có máu trong khoang dưới nhên
← Flag question	c. Có máu trong các rãnh võ não
	od. Có máu trong khoang dưới màng cứng
Question 30 Not yet answered	Xét nghiệm có giá trị xác định xuất huyết dưới nhện tự phát trong giai đoạn sớm là gì?
Marked out of	o a. Chọc dò dịch não tủy
1.00	○ b. MRI sọ não có tương phản từ
Flag question	c. CTscan sọ não không cản quang
	od. CTsan sọ não có cản quang