

ĐIỀU TRỊ HC THẬN HỮU – VIÊM CẦU THẬN CẤP

PGS.TS VŨ HUY TRỤ

HỘI CHỨNG THÂN HỮU :



NHẮC LẠI CHẨN ÑOÀÙN :

1. Chẩn ñoàùn xaùc ñònh:

◆ Phuoø

◆ Ñaïm maùu $\downarrow < 55 \text{ g/l}$, Albumin maùu $\downarrow < 25 \text{ g/l}$

◆ Cholesterol maùu $\uparrow > 2,2 \text{ g/l}$

◆ Ñaïm nieäu/ 24 giôø : $> 50 \text{ mg/kg/ ngaøy}$,

hay Protein nieäu/ Creatinine nieäu $> 2 \text{ (mg/mg)}$.

2. THỨ PHAÙT?

3. THỂ TỐT THIỂU ?



NIEÀU TRÒ

Nieàu trò laàn ñààu: HCTH NGUYỄN PHAÙT NGHI TOÁI THIEÀU:

Phaùc ñoà 4-8-6

- ◆ **4 tuaàn taán coâng:** Prednisone 2mg/kg/ngaøy
Chia 1 laàn saùng uoáng sau aên.
- ◆ **8 tuaàn caùch ngaøy:** Prednisone 1,5mg/kg/ caùch ngaøy
Uoáng 1 laàn duy nhaát vaøo buoải saùng sau aên.
- ◆ **6 tuaàn duy trì:** Giaûm lieàu daàn 0,5 mg/kg/caùch ngaøy moãi 2 tuaàn.
Uoáng 1 laàn duy nhaát vaøo buoải saùng sau aên.

ÑIEÀU TRÒ TAÙI PHAÙT

Taùì phaùt laàn ñaàu:

Prednisone 2mg/kg/ngaøy cho ñeán khi ñaïm nieäu (-) 3 ngaøy lieân tieáp, t^oi thi^u 14 ngaøy .

Sau ñoù: Prednisone 1,5 mg/kg/caùch ngaøy, trong 8 tuaàn.

ÑIEÀU TRÒ TAÙI PHAÙT

Taùi phaùt thöôøng xuyeân, hoaëc leä thuoäc corticoid:

- Prednisone 2mg/kg/ngaøy cho ñéán khi ñaïm nieäu (-) 3 ngaøy lieân tieáp
- Sau ñoù : Prednisone 1,5 mg/kg/ caùch ngaøy, trong 8 tuaàn
- Tieáp theo giaûm lieàu daàn, roài duy trì: 0,1- 0,5mg/kg/caùch ngaøy trong 6-12th
 - ◆ Neáu luïc giaûm lieàu bò taùi phaùt vôùi lieàu prednisone > 0,5 mg/kg/caùch ngaøy → Cho theâm: Levamisole 2,5 mg/kg/caùch ngaøy, trong 4 - 12 thaùng.

ÑIEÀU TRÒ TAÙI PHAÙT

- ◆ Neáu luùc giaûm lieàu bò taùì phaùt vòuì lieàu prednisone > 1mg/kg/ caùch ngaøy; hay: prednisone > 0,5 mg/kg/caùch ngaøy + Ñoäc tính corticoid (*daïng cushing, cao huyeát aùp, ñuïc thuûy tinh theá, vaø/hoaëc chaäm phaùt trieån*), hay coù yeáu toá nguy cô (*luøøn, tieáu ñöôøng, thöôøng taùì phaùt trong beänh caûnh naëng*)
→ Theâm: Cyclophosphamide 2,5 mg/kg/ ngaøy, trong 8 – 12 tuaàn.

LIỀU TRÒ THỂ KHÀNG CORTICOID :

Theỏ khàung corticoid:

Duợng thồu Methylprednisolone: $1\text{g}/1,73\text{m}^2$ da/ ngaøy x 3 laàn
(caùch ngaøy).

Hoaëc sinh thieát thaần ngay khoâng caàn 3 lieàu
Methylprednisone. Sau ñoù tuøy vaøo daïng sang thồông.

MCNS, MESP-GN, FSGS :

Cylosporine: 5mg/kg/ngaøy

Prednisone: 1mg/kg/ngaøy x 1 thaùng

Sau ñoù 1mg/kg/caùch ngaøy x 5 thaùng

- ◆ Nếu không có Cyclosporine có thể dùng:
Cyclophosphamide 2,5 mg/kg/ ngày, trong 12 tuần.
- ◆ Sang thông tối thiểu hay tăng sinh trung mô lan tỏa
có thể cho:
Cyclophosphamide và Prednisone

VIEÂM CẦU THÂN CẤP:



NHẮC LẠI CHẤM NỎAÙN :

1. HC VCTC?
2. VCTC DO SAU NHIỄM TRUỜNG?
3. NẾU KHOẢNG NGHI SAU NT, XEM XEÙT C :
 - C_3 GIẢM
 - HAY C_3 BÌNH THƯỜNG

NIỀM TRÒ : VCTC SAU LIÊN CẦU:

KS

HA CAO :

VỖØA: FUROSEMIDE, ÖÙC Ca

CC: PIV NICARDIPINE, LABETALOL, HYDRALAZINE

SUY TIM , PHUØ PHỎÃI CÁÁP :

SUY THẬN CẤP :

VCT TIỄN TRIỄN NHANH : $MP \pm ĐỘC TỄ BAO$