## Pretest CBL sốc 2/12/21

• • •

* Bắt buộc			
1. Họ và tên			
Nhập câu trả lời c	ủa bạn		

- 2. Ở bệnh nhi sốc, mục tiêu ScvO2 cần đạt được là bao nhiêu? (1 Điểm)
  □ D. 60% 70%
  □ C. 70% 80%
  □ B. 80% 90%
- - B. 9 g/dL
  - A. 10 g/dL 

    ✓

A. 90% - 100%

O. 8 g/dL

( ) D. 7 g/dL

B. Ioan chuyển hoá, anion gap táng
O. Kiềm chuyển hoá
8. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc giảm thể tích là gì? (1 Điểm)
<ul><li>○ A. Dịch chống sốc</li></ul>
C. Tăng co mạch
O. Thở oxy
B. Tăng co bóp cơ tim
9. Triệu chứng nào sau đây cần nhập cấp cứu? (1 Điểm)
D. Ói nhiều không uống được
B. Thở co lõm
$\bigcirc$ C. Tím trung ương $\checkmark$
A. Thở nhanh
10. Triệu chứng lâm sàng nào là quan trọng nhất trong chẩn đoán sốc? (1 Điểm)
○ B. Huyết áp giảm ✓
O. Chi mát
C. Giảm tưới máu
A. Mạch tăng

11. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng – nhọt da vùng cẳng chân (P), nhiễm từ cộng đồng kháng sinh đầu tay thích hơn là gì?

(1 Điểm)
A. Ceftriaxone
O. Ceftazidim
○ B. Vancomycin ✓
C. Meropenem
12. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu? (1 Điểm)
C. Albumin
○ B. Natriclorua 3%
O. Dextrose 5% in lactate
13. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc nhiễm trùng là gì? (1 Điểm)
B. Tăng co bóp cơ tim
A. Đặt nội khí quản sớm
O. Thở oxy
○ C. Tăng co mạch
14. Trong các trẻ sau, trẻ nào nên được nhập cấp cứu? (1 Điểm)
B. Trẻ bị bỏng ở bàn tay (P)
<ul><li>○ D. Trẻ bị hóc dị vật đường thở</li><li>✓</li></ul>

○ C. Trẻ bị gãy xương
A. Trẻ 2 tuổi sốt co giật cách 1h, hiện hết giật còn sốt, ba trẻ lo lắng vì tiền căn có sốt co giật
co sot co giạt
15. Phân giai đoạn sốc dựa vào triệu chứng nào? (1 Điểm)
A. Mạch nhanh
O. Huyết áp trung bình
○ B. Huyết áp tâm thu ✓
C. Huyết áp tâm trương
16. Trong các xét nghiệm sau, xét nghiệm nào giúp chẩn đoán sốc? (1 Điểm)
D. Cấy máu có vi khuẩn
○ C. Khí máu toan chuyển hoá anion gap tăng
A. Công thức máu có bạch cầu tăng
B. CRP tăng
17. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu? (1 Điểm)
○ B. Natriclorua 3%
O. Dextrose 5% in saline
C. Albumin

18. Bệnh nhi sốc phản vệ, vận mạch đầu tay là gì? (1 Điểm)
O. Dobutamin
C. Dopamin
B. Noradrenaline
19. Bệnh nhi bị sốc xuất huyết, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu? (1 Điểm)
○ B. 9 g/dL
○ C. 8 g/dL
O. 7 g/dL
20. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc tim là gì? (1 Điểm)
○ B. Tăng co bóp cơ tim ✓
A. Dịch chống sốc
O. Thở oxy
C. Tăng co mạch
21. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, xét nghiệm nào cần theo dõi sát để đánh giá tình trạng tưới máu? (1 Điểm)
A. Công thức máu

○ D. Khí máu động mạch	
B. Ure, creatinin	
C. AST, ALT	
22. Tại sao bệnh nhi sốc cần thở oxy? (1 Điểm)	
A. Bệnh nhân sốc có suy hô hấp kèm	
○ D. Tăng oxy hoà tan ✓	
C. Tăng tưới máu	
B. Tăng liên kết của hồng cầu với oxy	
Gửi	

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiến bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | Quyền riêng tư và cookie | Điều khoản sử dụng