

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ II, lần 1, niên khóa 2009-2010

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA

ĐỀ THI LÝ THUYẾT SẢN PHỤ KHOA Y₄

Học kỳ II, Lần 1, Niên khóa 2009-2010, Ngày 20.06.2010. 60 câu, thời gian làm bài 45 phút

PHẦN I: Câu hỏi chọn một trả lời

Từ câu 1 đến câu 12, chọn một câu sai

- So sánh ngõ vào và ngõ ra của ống sanh, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Ngõ vào là một vành đai xương cố định, trong khi đó ngõ ra tạo bởi các mốc xương, có thể thay đổi
 - Bình diện của ngõ vào và bình diện của ngõ ra tạo nên một góc xấp xỉ góc vuông
 - Thì số thai lệ thuộc chủ yếu vào đặc điểm của ngõ vào và ít lệ thuộc vào đặc điểm ngõ ra
 - Bình diện tương đối của cả ngõ vào và ngõ ra so với mặt phẳng nằm ngang đều thay đổi theo tư thế của sản phụ
- So sánh chất nhầy CTC ở ngày thứ 8 và ở ngày thứ 21 của chu kỳ, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Chất nhầy cổ tử cung đều ít ở giữa pha noãn và giữa pha hoàng thể
 - Chất nhầy cổ tử cung đều trong ở giữa pha noãn và giữa pha hoàng thể
 - Chất nhầy cổ tử cung đều đặc ở giữa pha noãn và giữa pha hoàng thể
 - Chất nhầy cổ tử cung đều không thuận lợi cho xâm nhập của tinh trùng ở giữa pha noãn và giữa pha hoàng thể
- So sánh các feed-back của các steroid sinh dục lên tầng trên, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Estrogen có 2 feed-back, còn progesterone chỉ có 1 feed-back
 - Feed-back của estrogen là kết quả của sự tăng cao của nồng độ estrogen lưu hành
 - Feed-back của progesterone là kết quả của sự giảm sút của nồng độ progesterone lưu hành
 - Tất cả các feed-back của các steroid sinh dục đều có sự tham gia của tuyến Yên
- Quan sát một trứng đã thụ tinh, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Trong khoảng quanh noãn bào, phải tìm thấy ít nhất 2 cực cầu
 - Trong noãn bào, phải tìm thấy ít nhất 2 tiền nhân ở giờ thứ 18 sau thụ tinh
 - Trong khoảng dưới màng trong suốt, phải tìm thấy các xác tinh trùng đến muộn
 - Trong màng trong suốt, có thể tìm thấy các tinh trùng đang xâm nhập đang dở và bị cầm tù
- Xuất huyết TC sau một thời gian bị trễ kinh ở 1 phụ nữ trong tuổi sinh sản có thể liên quan đến ... , chọn câu sai
 - Rối loạn trong chiều mộ và phát triển noãn nang
 - Rối loạn trong cơ chế tiêu hủy hoàng thể
 - Bất thường của thai kỳ
 - Không có đáp án nào đúng
- So sánh FSH và LH, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Cả hai cùng là hormon protein
 - Hai hormon này khác nhau ở chuỗi beta
 - Cả hai đều tác dụng trên cơ quan đích là buồng trứng
 - Trong chu kỳ buồng trứng, đường biểu diễn thể hiện biến thiên nồng độ của hai hormon này song song nhau
- Về cấu tạo và sự phát triển của phôi ở giai đoạn sớm của thai kỳ, Chọn một câu sai
 - Màng đệm có nguồn gốc là các tế bào thuộc ngoại bì lá nuôi
 - Màng rụng có nguồn gốc là các tế bào của nội mạc tử cung
 - Màng ối là ranh giới ngăn cách màng đệm và màng rụng
 - Lá nuôi sẽ sát nhập với màng ối vào cuối tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ
- So sánh SÂ ngã bụng và SÂ ngã âm đạo khảo sát thai 3 tháng đầu, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Trong giai đoạn sớm của thai kỳ, xác định có thai bằng siêu âm ngã âm đạo chính xác hơn
 - Trong giai đoạn sớm của thai kỳ, xác định tuổi thai bằng siêu âm ngã âm đạo chính xác hơn
 - Trong giai đoạn sớm của thai kỳ, xác định vị trí thai bằng siêu âm ngã âm đạo chính xác hơn
 - Trong khảo sát hình thái học 3 tháng đầu thai kỳ, siêu âm ngã âm đạo thường được lựa chọn hơn
- So sánh ảnh hưởng của thuốc lên bào thai ở các thời điểm khác nhau, những nhận định sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Thuốc dùng trong TCN 1st dễ gây chết bào thai
 - Thuốc dùng trong TCN 2nd dễ gây dị tật bào thai
 - Thuốc dùng trong TCN 3rd dễ gây ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan của bào thai
 - Một số thuốc dùng trong chuyển dạ có thể ảnh hưởng đến điểm số Apgar
- Để khả năng tầm soát lệch bội và giữ tỉ lệ âm giả ở mức hợp lý, những giải pháp sau đây đều đúng, ngoại trừ
 - Thực hiện combine test ở TCN 1st cho mọi thai phụ
 - Nên làm thêm triple test ở TCN 2nd khi combine test cho kết quả trung gian
 - Cần làm thêm siêu âm (soft-markers) cho mọi thai phụ khi làm triple test
 - Không nên kết luận dựa trên một test tầm soát đơn lẻ

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ II, lần 1, niên khóa 2009-2010

11. Về tác dụng phụ quan trọng nhất của Ethinyl Estradiol dùng trong thuốc tránh thai phối hợp, *chọn một câu sai*
- Tác dụng phụ quan trọng nhất này của Ethinyl Estradiol là nó có thể gây phát triển các khối u lệ thuộc estrogen
 - Tác dụng phụ quan trọng nhất của Ethinyl Estradiol lệ thuộc vào hàm lượng của nó trong viên thuốc
 - Bản thân thành tố Progestogen không làm giảm nhẹ tác dụng phụ của Ethinyl Estradiol
 - Ethinyl Estradiol có nhiều tác dụng phụ quan trọng là do nó không phải là hormone thiên nhiên
12. So sánh tránh thai bằng viên nội tiết phối hợp và dụng cụ tử cung chứa nội tiết, *chọn một câu sai*
- Chúng không có cùng cơ chế tác dụng chính
 - Chúng đều có thể tạo bất lợi cho sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
 - Đều có thể có ảnh hưởng trên chuyển hóa carbon hydrate
 - Đều cùng chứa cả estrogen và progestogen

Từ câu 13 đến câu 24, chọn một câu đúng

13. Ở tuần thứ 8 vô kinh của một thai kỳ bình thường, hoàng thể thai kỳ bắt đầu chuyển giao nhiệm vụ duy trì thai kỳ cho nhau thai. Ở thời điểm này ..., *chọn một câu đúng*
- ... nồng độ hCG trong máu vẫn tăng tuyến tính
 - ... nồng độ progesterone trong máu bắt đầu giảm dần
 - ... nồng độ estrogen trong máu bắt đầu giảm dần
 - ... nguy cơ sảy thai tăng cao do hoàng thể suy yếu
14. Bà A. 25^t, 0000, khám thai lần 1st ở tuần 16th. Khám LS bình thường. Bạn sẽ đề nghị ..., *chọn một hành động đúng*
- ... thực hiện đo độ dày khoang sáng sau gây tầm soát lệch bội
 - ... siêu âm 3-4D khảo sát dị tật bào thai
 - ... xác định lại tuổi thai một cách chắc chắn
 - ... hẹn tiêm phòng uốn ván trong lần khám sau nếu chưa có miễn nhiễm
15. Thực hiện theo dõi chuyển dạ bằng biểu đồ theo dõi chuyển dạ, model của WHO, *chọn một câu chính xác*
- Vị trí của ngôi thai được xác định qua khám âm đạo
 - Cơ co được thể hiện trên biểu đồ qua 2 đặc điểm là tần số và thời gian co
 - Biểu đồ ở bên phải đường báo động thể hiện một chuyển dạ kéo dài
 - Biểu đồ ở bên phải đường hành động thể hiện một chuyển dạ kéo dài
16. Trong can thiệp tích cực thời kỳ sơ nhau, cần phải... *chọn một câu chính xác*
- Kẹp cắt rốn sớm, ngay sau khi thai sổ
 - Sử dụng oxytocin dự phòng
 - Chủ động kéo dây rốn
 - Phối hợp oxytocin và misoprostol
17. So sánh giữa sơ nhau sinh lý và can thiệp tích cực giai đoạn 3rd, *chọn một câu đúng*
- So với sơ nhau sinh lý, thực hiện can thiệp tích cực làm giảm tình trạng thiếu máu ở sơ sinh
 - So với sơ nhau sinh lý, thực hiện can thiệp tích cực làm giảm nhu cầu sử dụng oxytocin
 - Thực hiện can thiệp tích cực không gây khó chịu cho sản phụ
 - Thực hiện can thiệp tích cực không gây biến chứng nguy hiểm
18. Thực hiện hồi sức sơ sinh cho trẻ Apgar = 5, *chọn một câu đúng*
- Phải đặt nội khí quản
 - Phải sử dụng dung dịch NaHCO₃ 4.2%
 - Phải hỗ trợ xoa bóp tim
 - Phải giữ ấm cho trẻ
19. Thực hiện đón trẻ sơ sinh bình thường, *chọn một câu đúng*
- Phải vuốt dây rốn về phía trẻ để tránh thiếu máu ở trẻ
 - Phải để da trẻ tiếp xúc với da mẹ
 - Phải hút kỹ dạ dày và đường mũi họng
 - Phải băng kín rốn trước khi cho trẻ tiếp xúc với mẹ
20. So sánh giữa viêm vú nhiễm trùng và viêm vú không nhiễm trùng, người ta nhận thấy... *chọn một câu đúng*
- Trong cả hai trường hợp, cấy vi khuẩn đều không tìm thấy sự hiện diện của chúng ở trong sữa
 - Viêm vú NT thì mẹ có sốt, viêm vú không NT thì mẹ không sốt
 - Viêm vú NT thường khu trú ở một ổ, viêm vú không NT thì lan tỏa
 - Vết loét ở núm vú có thể là đường vào của VK trong viêm vú nhiễm trùng
21. Chăm sóc sơ sinh ở cùng mẹ trong ngày đầu ở khoa hậu sản, so sánh giữa trẻ non và đủ tháng, ... *chọn một câu đúng*
- Không có sự khác biệt về nuôi con bằng sữa mẹ trong chăm sóc trẻ non tháng ở cùng mẹ và đủ tháng ở cùng mẹ
 - Không có sự khác biệt về chăm sóc rốn trong chăm sóc trẻ non tháng ở cùng mẹ và đủ tháng ở cùng mẹ
 - Không có sự khác biệt về chùng ngừa trong chăm sóc trẻ non tháng ở cùng mẹ và đủ tháng ở cùng mẹ
 - Không có sự khác biệt về giữ ấm trong chăm sóc trẻ non tháng ở cùng mẹ và đủ tháng ở cùng mẹ

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ II, lần 1, niên khóa 2009-2010

22. Rốn sẽ chậm rụng nếu ta thực hiện hành động nào trong các hành động sau, **chọn một câu đúng**

- Đề hồ rốn
- Không sát khuẩn rốn thường xuyên
- Đề rốn bé bị ướt khi tắm
- Đề da bé tiếp xúc với da mẹ quá sớm

23. So sánh tránh thai bằng thuốc nội tiết phối hợp và dụng cụ tử cung có chứa nội tiết, **chọn một câu đúng**

- Cả 2 phương pháp đều sử dụng estrogen
- Hiệu quả thực tế của thuốc tránh thai cao hơn dụng cụ tử cung chứa nội tiết
- 2 phương pháp có chung một chống chỉ định chảy máu tử cung bất thường chưa xác định nguyên nhân
- 2 phương pháp có chung một chống chỉ định là người phụ nữ có nguy cơ cao bị bệnh lây qua đường tình dục

24. So sánh tránh thai bằng bao cao su và tránh thai bằng dụng cụ tử cung, **chọn một nhận xét đúng**

- Cả 2 phương pháp đều có thể phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục
- Cả 2 phương pháp đều không có tác dụng phụ toàn thân
- Cả 2 phương pháp đều không có tác dụng bất lợi tại chỗ
- Cả 2 phương pháp đều có hiệu quả tránh thai thực tế thấp hơn thuốc nội tiết tránh thai

PHẦN 2: Câu hỏi chọn nhiều trả lời

Từ câu 25 đến câu 36.

Đánh dấu vào A nếu bạn chọn (1) và (2)

Đánh dấu vào B nếu bạn chọn (1) và (3)

Đánh dấu vào C nếu bạn chọn (2) và (3)

Đánh dấu vào D nếu bạn chọn cả (1), (2) và (3)

Đánh dấu vào E nếu bạn không chọn bất cứ phương án nào

Từ câu 25 đến câu 30, chọn các câu đúng

25. Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào ảnh hưởng đến việc xóa mờ cổ tử cung trong chuyển dạ, **chọn các câu đúng**

- Con co tử cung
- Sự xuống của ngôi thai
- Màng ối còn hay màng ối đã vỡ

26. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào tham gia vào việc hình thành ngôi bất thường, **chọn các câu đúng**

- Khung chậu hẹp
- Tử cung dị dạng
- Chuyển dạ sanh non

27. Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào là nguyên nhân làm cho ngôi chòm lọt ở kiểu thể sau, **chọn các câu đúng**

- Hình dạng khung chậu dạng nam
- Hình dạng khung chậu dạng hầu
- Hình dạng khung chậu dạng bẹt

28. Ngôi chòm có thể sẽ xoay trong 135° theo chiều kim đồng hồ trong các trường hợp ..., **chọn các câu đúng**

- Ngôi chòm, kiểu thể chằm chậu Trái sau
- Ngôi chòm, kiểu thể chằm chậu Trái trước
- Ngôi chòm, kiểu thể chằm chậu Phải trước

29. Ngôi ngang, kiểu thể Vai Trái Lưng Sau, sa tay vào ÂĐ, khi khám ÂĐ sẽ sờ được ..., **chọn các câu đúng**

- Bàn tay Trái úp sấp
- Nách thai ở vị trí 9 giờ
- Nghe được ổ tim thai ở $\frac{1}{4}$ dưới Phải

30. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào là yếu tố thuận lợi của sanh non, **chọn các câu đúng**

- Tiền sử sanh non
- Ngôi ngược
- Đa thai

Từ câu 31 đến câu 36, chọn các câu sai

31. Về hiệu quả của corticoid liệu pháp trong chuyển dạ sanh non và ối vỡ non, **chọn các phát biểu sai**

- Hiệu quả bảo vệ của Corticoid liệu pháp cao nhất khi tuổi thai khoảng 34-36 tuần
- Corticoid chỉ làm giảm tỉ lệ suy hô hấp cấp ở sơ sinh mà không có hiệu quả bảo vệ với các vấn đề khác
- Không cần thiết phải lập lại corticoid liệu pháp nếu cần

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ II, lần I, niên khóa 2009-2010

32. Về biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung, **chọn các câu sai**

1. Trị số tim thai căn bản bình thường nằm trong khoảng 120-160 nhịp mỗi phút
2. Dao động nội tại trung bình là từ 10-15 nhịp mỗi phút
3. Khi thai trên 32 tuần, gọi là nhịp tăng khi biên độ tăng trên 15 nhịp mỗi phút

33. So sánh chuyển dạ ngôi chòm ở sản phụ có và không có gây tê ngoài màng cứng khi chuyển dạ, **chọn các câu sai**

4. Kiểu thể ngang thường quan sát thấy ở người có gây tê ngoài màng cứng
5. Bất thường nhịp tim thai thường quan sát thấy ngay sau gây tê ngoài màng cứng là do tụt huyết áp
6. Tỷ lệ sanh thủ thuật tăng cao ở người có gây tê ngoài màng cứng do ảnh hưởng đến giai đoạn số thai

34. So sánh song thai cùng trứng và khác trứng, **chọn các câu sai**

1. Bệnh suất sơ sinh trong song thai cùng trứng cao hơn trong song thai khác trứng
2. Tử suất sơ sinh trong song thai cùng trứng cao hơn trong song thai khác trứng
3. Song thai có hai túi ối riêng biệt có thể là song thai khác trứng và cũng có thể là song thai cùng trứng

35. So sánh viêm phúc mạc chậu do viêm phần phụ và do viêm ruột thừa vỡ, **chọn các câu sai**

1. Bệnh cảnh lâm sàng đôi khi rất giống nhau
2. Điều trị viêm phúc mạc ruột thừa là điều trị ngoại khoa
3. Điều trị viêm phúc mạc chậu do viêm phần phụ là điều trị nội khoa

36. Khi làm chẩn đoán phân biệt thai ngoài tử cung và sảy thai không trọn... **Chọn các câu không chính xác**

1. Cả hai bệnh lý đều có dấu hiệu buồng tử cung không có túi thai khi thực hiện siêu âm
2. Cả hai bệnh lý đều có diễn biến nồng độ beta-hCG trong máu bất định
3. Cả hai bệnh lý đều có thể có khối phản âm hỗn hợp cạnh tử cung

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ II, lần I, niên khóa 2009-2010

PHẦN 3: Bắt cặp

Từ câu 37 đến câu 52

Trong phần này, một ý ở cột bên Trái sẽ ứng với duy nhất một ý ở cột bên Phải. Hãy chọn ý bắt cặp tương ứng. Lưu ý rằng một ý ở cột bên phải có thể ghép được với nhiều ý khác nhau, hoặc không ghép được với bất cứ ý nào ở cột bên Trái

Thời điểm thực hiện ... khi khám thai (37, 38, 39, 40) ... là ... (a, b, c, d) ...

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 37. Triple-test tầm soát lệch bội | a. Cuối tam cá nguyệt 1 st |
| 38. Khám cổ tử cung qua khám âm đạo | b. Đầu tam cá nguyệt 2 nd |
| 39. Đường huyết lúc đói và sau ăn | c. Giữa tam cá nguyệt 2 nd |
| 40. SÂ đo bề dày thấu âm da gáy tầm soát lệch bội | d. Khi có biểu hiện bất thường |

Dược chất (hoặc nhóm dược chất) ... (41, 42, 43, 44) ... có thể dùng cho điều trị ... (a, b, c, d) ...

- | | |
|--------------------|--|
| 41. Beta-caroten | a. Dự phòng khô mắt ở nữ nhi |
| 42. Beta-hCG | b. Cắt cơn co trong sanh non |
| 43. Beta-methasone | c. Dự phòng xuất huyết não ở trẻ non tháng |
| 44. Beta-blocker | d. Nâng đỡ hoàng thể khi có suy hoàng thể |

Trong trường hợp ... (45, 46, 47, 48) ... người ta dùng ... (a, b, c, d) ...

- | | |
|---|------------------------------------|
| 45. muốn soi tươi huyết trắng để Δ VÂĐ do Gardnella | a. Dung dịch NaCl 0.9% |
| 46. muốn nhỏ mắt để dự phòng nhiễm lậu mắt sơ sinh | b. Dung dịch KOH 10% |
| 47. muốn sát khuẩn mặt cắt rốn khi làm rốn | c. Dung dịch MgSO ₄ 15% |
| 48. muốn hồi sức sơ sinh ngạt nặng | d. Không có trong danh sách |

Để ... (49, 50, 51, 52) ... người ta dùng ... (a, b, c, d) ...

- | | |
|--|---|
| 49. chẩn đoán xác định thiếu ối | a. điểm cắt của trị số muốn khảo sát |
| 50. chẩn đoán thai chậm tăng trưởng | b. bách phân vị của trị số muốn khảo sát |
| 51. thiết lập chẩn đoán thai ngoài tử cung | c. diễn biến của trị số khảo sát |
| 52. tầm soát tiểu đường trong thai kỳ | d. phối hợp sử dụng 2 dữ kiện trong a, b, c |

PHẦN 4: Điền khuyết

Từ câu 53 đến 60, hãy chọn một trong các lựa chọn cho trước để điền vào các khoảng trống. Lưu ý mỗi lựa chọn chỉ được dùng một lần

Phân đoạn 1:

- Estriol không liên hợp
- PAPP-A
- Free beta hCG
- AFP

Trong tam cá nguyệt thứ nhất, tầm soát lệch bội được dựa trên việc đo lường nồng độ huyết thanh của bộ đôi gồm thứ nhất là ... (53) ... và thứ nhì là ... (54) Thành tố thứ nhì của bộ đôi này cũng một lần nữa được sử dụng trong tầm soát lệch bội ở tam cá nguyệt thứ nhì. Trong tam cá nguyệt thứ nhì, ngoài thành tố vừa kể, ta còn định lượng một steroid là ... (55) ... và một thành tố khác là ... (56) Thành tố được kể cuối cùng cũng còn được dùng để ước tính nguy cơ xảy ra khuyết tật ống thần kinh.

Phân đoạn 2:

- Số đo đường kính lưỡng đỉnh
- Số đo chiều dài đầu-mông
- Số đo kích thước túi thai
- Số liệu sinh trắc

Mục tiêu quan trọng nhất của khám thai trong quý một là định tuổi thai bằng cách sử dụng một dữ kiện quan trọng và đáng tin cậy là ... (57) Cũng với mục đích trên nhưng ở những thời điểm muộn hơn, ta có thể sử dụng ... (58) Khi có bất thường trong ... (59) ... ở tam cá nguyệt thứ nhất, cần nghĩ đến khả năng rằng tuổi thai đã được xác định sai, vì khả năng chậm tăng trưởng cực sớm ở thời điểm này là rất hiếm gặp. Trong tam cá nguyệt này, việc định tuổi thai sử dụng ... (60) ... là kém tin cậy nhất.

PHẦN 4: Điền khuyết

Từ câu 49 đến 60, hãy chọn một trong các lựa chọn cho trước để điền vào các khoảng trống. Lưu ý mỗi lựa chọn chỉ được dùng một lần.

Phân đoạn 1:

- a. Carbetocin
- b. Ergot alkaloid
- c. Misoprostol
- d. Oxytocin

Trong sản khoa hiện đại, WHO khuyến cáo thực hiện can thiệp tích cực giai đoạn 3rd để làm giảm tần suất băng huyết sau sinh. Trong can thiệp này, ... (49) a được xem là thuốc đầu tay. Việc phối hợp thêm ... (50) c với thuốc vừa được nêu làm tăng rõ rệt tần suất các tác dụng phụ khó chịu làm sản phụ không thấy thoải mái với can thiệp tích cực giai đoạn 3rd. Trong mọi trường hợp, ... (51) b không được xem như thuốc hàng đầu trong dự phòng BHSS, trừ trường hợp bất khả kháng như không có điều kiện bảo quản thuốc đúng qui cách. Nó phải được xem là thuốc đứng hàng thứ 3rd trong xử trí BHSS. Thêm vào danh mục thuốc xử trí BHSS, ta còn có ... (52) a có cùng một hiệu quả với thuốc đầu tay nhưng thời gian bán hủy của nó dài, lên đến hàng giờ, nhưng hiện nay chỉ được xem như một điều trị cuối cùng.

Phân đoạn 2:

- a. Đa bội
- b. Đơn bội
- c. Lệch bội
- d. Lưỡng bội

Ở loài người, hiện tượng thụ tinh là kết quả của sự kết hợp của 2 tế bào sinh dục ... (53) b, tạo nên một tế bào sinh dưỡng mới gọi là hợp tử. Hợp tử là một tế bào ... (54) a sẽ bước vào bào phân nguyên nhiễm để tạo thành cá thể mới. Tuy nhiên trong quá trình thành tạo hợp tử, đôi khi các cơ chế tự vệ tế bào hoạt động không hiệu quả, dẫn đến việc hình thành các hợp tử ... (55) a là nguồn gốc của một số bệnh nguyên bào nuôi thai kỳ. Trong khi đó, sự hình thành và sản sinh giao tử có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến các bất thường của thai vô sắc, làm cho quá trình phân chia vốn nhiễm sắc thể của tế bào bị sai lệch, dẫn đến việc hình thành các hợp tử ... (56) c.

Phân đoạn 3:

- a. Biến hình
- b. Bình chỉnh
- c. Chồng xương
- d. Định hướng

Trong cơ chế sinh của ngôi chỏm, diễn tiến của ngôi trong ống sanh lần lượt trải qua 4 hiện tượng lọt, xuống, xoay trong và sô. Trong hiện tượng lọt, ngôi thai phải thực hiện nhiều động tác để có thể vượt qua được eo trên. Các động tác này gồm thứ nhất là ... (57) a khiến cho đường kính hạ chằm thóp trước trở nên trùng với một trong hai đường kính chéo của eo trên; thứ nhì là ... (58) a tức là sự gập tối đa của đầu thai theo trục dọc nhằm thu gọn đến mức tối đa đường kính hạ chằm-thóp trước; hiện tượng thứ ba chỉ xảy ra trong trường hợp động tác chuẩn bị thứ nhì không đủ để làm cho đường kính lọt của ngôi vừa với kích thước của eo trên, khi đó thai nghiêng đầu sang bên để đưa một trong hai bướu đỉnh (sau hoặc trước) trình trước eo trên, hiện tượng này gọi là ... (59) a. Khi quan sát thấy có hiện tượng ... (60) c xảy ra, ta biết rằng ngôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vượt qua eo trên.

Đề thầy cho chủ thầy mời biết đáp án!