



RAT 62

Tiết dịch âm đạo bất thường

Bệnh lây qua tình dục

6122

11 Nov 2021

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. Môn học Sản Phụ khoa. Học phần Phụ khoa.

© 2021. Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

...

Points: 50/50

1. Các bạn là sinh viên của **Tổ** nào? *

Ghi rõ Tổ (bằng số)

23

2. Quan điểm vi sinh học nào về kiểu trạng thái khuẩn hệ CST IV là chính xác?

*

(5/5 Points)

☐ a. Là kiểu khuẩn hệ bệnh lý, không có *Lactobacillus* sp. Không có biểu hiện lâm sàng

- ☐ b. Là kiểu khuẩn hệ bệnh lý, không có acid lactic. Không có biểu hiện lâm sàng
- ☐ c. Là kiểu khuẩn hệ bệnh lý, chủ yếu là khuẩn kỵ khí. Không có biểu hiện lâm sàng
- ☒ d. Là kiểu khuẩn hệ sinh lý, thành phần giống bacterial vaginosis. Có khả năng bảo vệ ✓

3. Trong các tình trạng kể sau, tình trạng nào có liên quan rõ rệt nhất đến bacterial vaginosis tái phát?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Không định danh chính xác loại vi khuẩn
- ☐ b. Không tiến hành điều trị cho (các) bạn tình
- ☒ c. Không tìm cách xác định yếu tố thuận lợi ✓
- ☐ d. Không tiến hành điều trị bằng probiotics

4. Trong các tình huống nghi là viêm âm hộ-âm đạo do nấm liệt kê sau, bạn sẽ chỉ định điều trị cho tình huống nào?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Biểu hiện lâm sàng huyết trắng đặc hiệu, kết quả vi sinh có hiện diện sợi tơ nấm
- ☐ b. Không có biểu hiện lâm sàng đặc hiệu, kết quả vi sinh có hiện diện sợi tơ nấm
- ☐ c. Biểu hiện lâm sàng huyết trắng đặc hiệu, kết quả vi sinh không thấy sợi tơ nấm
- ☒ d. Có chỉ định dùng kháng nấm cho cả 3 trường hợp viêm âm hộ-âm đạo kể trên ✓

5. Trong các phát biểu sau liên quan đến tiến trình chẩn đoán nhiễm *Trichomonas vaginalis*, phát biểu nào là đúng ?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Hầu hết các trường hợp nhiễm sẽ có dịch tiết âm đạo điển hình

- ☐ b. Khảo sát miễn dịch có tính giá trị thấp khi thiết lập chẩn đoán
- ☐ c. Chỉ được phép điều trị khi soi tươi thấy có trùng roi di động
- ☒ d. Soi tươi là công cụ chẩn đoán căn bản, dù độ nhạy thấp



6. Khi điều trị viêm âm đạo, việc chọn đường dùng thuốc là đường âm đạo hay đường uống phải được căn cứ vào yếu tố nào?

*

(5/5 Points)

- ☒ a. Loại tác nhân gây bệnh, tình trạng bệnh
- ☐ b. Thói quen dùng thuốc của người bệnh
- ☐ c. Thói quen trong các hành vi tình dục
- ☐ d. Ưu tiên cho đường âm đạo, nếu được



7. Theo khuyến cáo hiện hành của CDC, liên quan đến phòng tránh lây nhiễm HIV, lời khuyên nào là thích hợp cho một cặp vợ chồng có kết quả huyết thanh HIV dị biệt?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Người không nhiễm: luôn dùng ARV dự phòng trước quan hệ tình dục, bất kể tải lượng (PrEP)
- ☐ b. Người không nhiễm: luôn dùng ARV dự phòng sau quan hệ tình dục, bất kể tải lượng (PEP)
- ☐ c. Luôn dùng bao cao su đúng cách mỗi khi có quan hệ tình dục, bất kể tải lượng virus
- ☒ d. Người có nhiễm phải được điều trị ARV đúng, duy trì tải lượng virus ở mức xấp xỉ 0



8. Trong các phát biểu sau liên quan đến nhiễm *Treponema pallidum* và thai kỳ, phát biểu nào là đúng?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Do tần suất thấp, chỉ tầm soát giang mai cho thai phụ nhóm nguy cơ cao
- ☐ b. Nguy cơ lây truyền dọc giang mai là cao nhất trong giang mai tiềm ẩn
- ☒ c. Khuyến cáo tầm soát đại trà giang mai ít nhất là hai lần trong thai kì ✓
- ☐ d. *Treponema pallidum* chỉ có thể qua nhau kể từ sau tuần lễ thứ 16

9. Trong các phát biểu sau liên quan đến điều trị nhiễm *Neisseria gonorrhoeae*, phát biểu nào là đúng?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Quinolone là kháng sinh được chọn như điều trị đầu tay
- ☒ b. Luôn phối hợp hai kháng sinh với cơ chế tác động khác nhau ✓
- ☐ c. Chỉ điều trị khi có bằng chứng vi sinh của nhiễm *N. gonorrhoeae*
- ☐ d. Luôn điều trị như có *C. trachomatis* mà không cần bằng chứng nhiễm

10. Trong các phát biểu sau liên quan đến điều trị nhiễm *Chlamydia trachomatis* cấp (lần đầu), phát biểu nào là đúng?

*

(5/5 Points)

- ☐ a. Chọn β -lactamin thay vì Doxycyclin nếu có nhiễm kép *N. gonorrhoeae* và *C. trachomatis*
- ☒ b. Có thể chọn Doxycyclin đa liều / Azithromycin đơn liều đều được do hiệu quả như nhau ✓
- ☐ c. Nên dùng phối hợp hai kháng sinh, nhằm vào mục đích hạn chế tình trạng kháng thuốc
- ☐ d. Điều trị cho bạn tình được tiến hành bất cứ lúc nào, độc lập với điều trị cho người nhiễm

11. Trong các phát biểu sau liên quan đến nguyên tắc điều trị viêm vùng chậu, phát biểu nào là đúng?

*

(5/5 Points)

- ☒ a. Mục tiêu điều trị là bảo toàn tính mạng/ngăn ngừa các biến chứng xa ✓
- ☐ b. Khi phối hợp kháng sinh, phải có một kháng sinh diệt vi khuẩn kỵ khí
- ☐ c. Luôn luôn bắt đầu bằng các kháng sinh mạnh và đường tĩnh mạch
- ☐ d. Áp-xe vòi trứng là một chỉ định bắt buộc của can thiệp ngoại khoa

[Go back to thank you page](#)

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | [Privacy and cookies](#) | [Terms of use](#)