

MCQ Questions

Câu hỏi

- 1 Trong khi thực hiện điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh lây qua tình dục, lời khuyên nào là tốt nhất? Chọn một câu đúng

A. ☐ Luôn dùng bao cao su khi có hành vi tình dục song (đa) phương đến khi bệnh nhân đã hoàn tất điều trị

B. ☒ Kiêng hoàn toàn các hành vi tình dục song (đa) phương đến khi bệnh nhân hoàn tất liệu trình điều trị

C. ☐ Xét nghiệm cho bạn tình là bắt buộc trước khi điều trị cho bệnh nhân để tránh tái nhiễm trong hay sau điều trị

D. ☐ Xét nghiệm cho bạn tình là bắt buộc trước khi điều trị cho bệnh nhân để loại trừ việc điều trị không cần thiết

- 2 Có chỉ định điều trị cho trường hợp nào trong các trường hợp nhiễm *Trichomonas vaginalis* sau? Chọn một câu đúng

A. ☐ Có triệu chứng lâm sàng điển hình của nhiễm *Trichomonas vaginalis*, khảo sát vi sinh âm tính

B. ☐ Không có triệu chứng lâm sàng của nhiễm *Trichomonas vaginalis*, khảo sát vi sinh dương tính

C. ☐ Có triệu chứng lâm sàng điển hình của nhiễm *Trichomonas vaginalis*, khảo sát vi sinh dương tính

D. ☒ Cả ba trường hợp trên cùng là các trường hợp nhiễm *Trichomonas vaginalis* có chỉ định điều trị

- 3 Khi so sánh hiệu quả điều trị của các phác đồ điều trị *Trichomonas vaginalis*, bạn có nhận xét gì? Chọn một câu đúng

A. ☐ Metronidazole đơn liều đường uống có hiệu quả hơn tinidazole đơn liều đường uống

B. ☒ Tinidazole đơn liều đường uống có hiệu quả hơn metronidazole đa liều đường âm đạo

C. ☐ Metronidazole đa liều đường âm đạo có hiệu quả hơn metronidazole đa liều đường uống

D. ☐ Metronidazole đa liều đường uống có hiệu quả hơn metronidazole đơn liều đường uống

- 4 Phương thức lây truyền của *Treponema pallidum* có đặc điểm gì? Chọn một câu đúng

A. ☐ Tổn thương gồm của giang mai kỳ III có khả năng lây *Treponema pallidum* qua tiếp xúc trực tiếp rất

Thời gian còn lại

0:9:56



Số báo danh

20170419_96739

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

cao

B. ● Dù được thực hành đúng cách, dùng bao cao su vẫn không làm giảm nguy cơ nhiễm *Treponema pallidum*

C. ● *Treponema pallidum* từ vết loét có khả năng xâm nhập qua một niêm mạc nguyên vẹn và lành mạnh

D. ● Nguy cơ nhiễm rất thấp khi quan hệ tình dục với người bị giang mai giai đoạn tiềm ẩn sớm cũng như muộn

5 Khi điều trị nhiễm *Chlamydia trachomatis*, cần lưu ý đến điều gì? Chọn một câu đúng

A. ● Chọn thuốc điều trị nhiễm *C. trachomatis* bị ảnh hưởng bởi vị trí nhiễm là sinh dục hay trực tràng

B. ● Chọn thuốc điều trị nhiễm *C. trachomatis* bị ảnh hưởng bởi trạng thái vi khuẩn là thể lược hay thể sai

C. ● Chọn thuốc điều trị nhiễm *C. trachomatis* bị ảnh hưởng bởi tình trạng đã có hay chưa có di chứng

D. ● Chọn thuốc điều trị nhiễm *C. trachomatis* bị ảnh hưởng bởi tất cả các yếu tố được liệt kê trên đây

6 Để xác định chẩn đoán giang mai, phải tuân thủ nguyên tắc nào khi làm các xét nghiệm? Chọn một câu đúng

A. ● Kết luận phải căn cứ đồng thời vào cả hai loại xét nghiệm có và không chứa *Treponema*

B. ● Kết luận nên căn cứ ưu tiên vào kết quả xét nghiệm không chứa *Treponema* (VDRL-RPR)

C. ● Kết luận nên căn cứ ưu tiên vào kết quả xét nghiệm có chứa *Treponema* (TP-PA, FTA-ABS)

D. ● Xác nhận hiện diện của *Treponema* trên kính hiển vi nền đen hay kháng thể huỳnh quang là bắt buộc

7 Khi điều trị nhiễm *Chlamydia trachomatis*, hành động nào sau đây có thể gây ảnh hưởng bất lợi? Chọn một câu đúng

A. ● Kết hợp Doxycyclin với metronidazole

B. ● Kết hợp Doxycyclin với beta-lactamin

C. ● Kết hợp Doxycyclin với clindamycin

D. ● Kết hợp Doxycyclin với quinolone

8 Làm gì khi phát hiện có dị biệt huyết thanh HIV ở một cặp vợ chồng? Chọn một câu đúng

A. ● Phải chỉ định dùng ARVs cho cả hai vợ chồng, bất chấp tình trạng huyết thanh âm tính của người còn

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

lại

B. ● Nếu hai vợ chồng đã có con chung, việc khảo sát huyết thanh ở con là bắt buộc, bất chấp ai có HIV dương

~~**C.**~~ ● Nội dung tư vấn là khác nhau trong hai trường hợp (1) vợ dương chồng âm và (2) vợ âm chồng dương

D. ● Phải thực hiện cả ba động thái nêu trên khi phát hiện có dị biệt huyết thanh HIV ở một cặp vợ chồng

9 Mục tiêu của điều trị viêm vùng chậu có biến chứng áp-xe tai vòi-buồng trứng là gì? Chọn một câu đúng

A. ● Ngăn ngừa tổn thương vòi trứng

B. ● Ngăn ngừa thai ngoài tử cung

C. ● Ngăn ngừa viêm vùng chậu mạn

~~**D.**~~ ● Ngăn ngừa nhiễm trùng huyết

10 Tiến trình thực hiện sàng lọc và chẩn đoán nhiễm HIV được thực hiện ra sao? Chọn một câu đúng

~~**A.**~~ ● Luôn bắt đầu với test nhanh tìm kháng thể hay kháng nguyên

B. ● Western blot được xem là xét nghiệm đầu tay trong sàng lọc HIV

C. ● Tại bệnh viện, mọi bệnh nhân buộc phải chấp nhận khảo sát HIV

D. ● Một khi đã xác nhận có nhiễm HIV, không nhất thiết phải đếm CD4

11 Vì sao phải tìm hiểu phương thức bị mắc STIs?

A. ● Vì với cùng tác nhân, đáp ứng với một thuốc có thể khác nhau khi mắc theo những phương thức khác nhau

B. ● Vì với cùng tác nhân, chọn thuốc cho điều trị có thể khác nhau khi mắc theo những phương thức khác nhau

C. ● Vì với cùng tác nhân, cách tiếp cận chẩn đoán có thể khác nhau khi mắc theo những phương thức khác nhau

~~**D.**~~ ● Cả 3 lý do trên cùng là giải thích cho việc phải tìm hiểu phương thức mắc STIs

12 Làm gì khi một phụ nữ đã có chồng con đến khám vì phát hiện một vết loét vùng âm hộ?

A. ● Luôn nghĩ tới giang mai và làm các xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán

B. ● Luôn nghĩ tới giang mai và làm các xét nghiệm vi sinh học chẩn đoán

~~**C.**~~ ● Quan sát các đặc điểm của sang thương sẽ giúp

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

xác định chẩn đoán

D. ☐ Tìm kiếm các sang thương khác ở trên da, hệ thần kinh của bệnh nhân

13 Viêm họng sau khẩu giao thường thấy do tác nhân nào?

- A.** ☐ Trichomonas vaginalis
B. ☐ Chlamydia trachomatis
C. ☐ Human Papilloma Virus
D. ☒ Neisseria gonorrhoeae

14 Vì sao trong các phác đồ điều trị viêm vùng chậu cấp có dùng beta-lactamin phối hợp với Doxycyclin, Doxycyclin thường được cho chậm hơn và kéo dài đến 14 ngày?

- A.** ☐ Vì beta-lactamin tác dụng trên màng, còn Doxycyclin tác dụng trên ribosome
B. ☐ Vì beta-lactamin tác dụng diệt khuẩn, còn Doxycyclin tác dụng kiềm khuẩn
C. ☐ Vì beta-lactamin gây ra tình trạng kháng thuốc ở C. trachomatis tùy hành
D. ☒ Vì beta-lactamin có tác dụng đưa C. trachomatis tùy hành vào dạng tồn tại

15 Cần lưu ý gì khi điều trị một trường hợp phát hiện nhiễm Chlamydia trachomatis?

- A.** ☒ Với Doxycyclin, cách dùng 200 mg 1 lần trong ngày có hiệu quả hơn cách dùng 100 mg 2 lần trong ngày
B. ☐ Tập trung điều trị lậu trước tiên, sau đó điều trị Chlamydia trachomatis do Chlamydia ít kháng thuốc
C. ☐ Điều trị chỉ nên tập trung cho điều trị Chlamydia trachomatis vì nguy cơ kháng thuốc của lậu rất cao
D. ☐ Nên kết hợp cùng lúc điều trị lậu với beta lactamin và điều trị Chlamydia trachomatis với Doxycyclin

16 Dùng bao cao su ngăn được gần như hoàn toàn khả năng nhiễm qua hoạt động tình dục của đa số STIs. Tuy nhiên, dùng bao cao su chỉ làm giảm nhưng không ngăn được hoàn toàn khả năng nhiễm qua hoạt động tình dục của loại tác nhân nào?

- A.** ☐ Trichomonas vaginalis
B. ☐ Chlamydia trachomatis
C. ☒ Human Papilloma Virus
D. ☐ Neisseria gonorrhoeae

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

17 Kiểu trạng thái khuẩn hệ CST 1 (với ưu thế tuyệt đối của *Lactobacilli crispatus*, điểm Nugent ≤ 3 , pH = 4, giàu acid lactic và H₂O₂) có khả năng chống đỡ tốt hơn với tác nhân gây STIs nào?

- ☐ A. *Chlamydia trachomatis*
- ☒ B. *Neisseria gonorrhoeae*
- ☐ C. *Treponema pallidum*
- ☐ D. *Trichomonas vaginalis*

18 Viêm kênh cổ tử cung, sung huyết, tiết dịch vàng đục. Nhiều bạch cầu trong mẫu soi dịch tiết cổ tử cung. Không triệu chứng cơ năng nào khác. Cần phải nghĩ nhiều đến tác nhân nào?

- ☐ A. *Neisseria gonorrhoeae*
- ☐ B. *Chlamydia trachomatis*
- ☒ C. Các chủng *Ureaplasma*
- ☐ D. *Bacterial vaginosis*

19 Trong chương trình tầm soát nhiễm HIV, phải đảm bảo điều gì?

- ☒ A. Khi tầm soát, phải có đồng thuận của người được xét nghiệm. Đồng thuận thể hiện bằng một văn bản
- ☐ B. Tầm soát luôn dựa vào bộ đôi xét nghiệm miễn dịch tìm kháng thể/kháng nguyên và Western blot
- ☐ C. Tầm soát bắt buộc cho mọi đối tượng, bất kể thuộc hay không thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm HIV
- ☐ D. Việc tầm soát buộc phải được thực hiện định kỳ, với khoảng cách tối thiểu là một năm

20 Trong các phát biểu sau về nguyên tắc điều trị viêm vùng chậu, phát biểu nào là chính xác?

- ☐ A. Bảo tồn khả năng sinh sản của bệnh nhân là một vấn đề ưu tiên, kể cả trong trường hợp viêm vùng chậu nặng
- ☒ B. Điều trị viêm vùng chậu ở người nhiễm HIV cũng theo các nguyên tắc tương tự với người không nhiễm HIV
- ☐ C. Nên dùng 3 loại kháng sinh phối hợp: (1) cho lậu, (2) cho *C. trachomatis* và (3) cho vi khuẩn kỵ khí
- ☐ D. Phải điều trị tích cực cho tới khi giảm triệu chứng. Khi các triệu chứng đã giảm, nhất thiết phải giảm liều

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					