## ĐỂ THI HỌC PHẢN NGOẠI TÔNG QUÁT Đối tượng: Y Học Cỗ Truyền + Y học Dự phông năm 3. Ngày thi: 17/05/2016. Thời gian làm bải: 30 phút

## ĐÈ 1

không có triệu chứng hay xét nghiệm nào, CLS nào chẩn

đoán chính xác được VRT trong tất cả các TH

VRT Câu 1: Bệnh sinh của viêm ruột thừa cấp; nơi khởi đầu quá quá trình viêm ruột thừa (chọn 1 câu đúng):

A. Lop thanh mac.

B. Lóp cơ dọc.

C. Lóp cơ vòng.

D. Lớp thanh mạc và lớp cơ vòng.

Lóp niêm mạc.

VRT Câu 2: Chấn đoán Việm ruột thừa cấp (chọn 1 câu đúng):

A. Đau và ấn đau hố chậu phải là đủ.

B. Công thức bạch cầu giữ vai trô quyết định.

C. Siêu âm bung giữ vai trò quyết định.

D) Có thể nhằm với bệnh viêm túi thừa manh tràng.

Thường được chấn đoán sớm ở người lớn tuổi.

VRT Câu 3; Điều trị Viêm ruột thừa cấp (chọn 1 câu đúng):

A. Điều trị kháng sinh phố rộng, liều cao là đủ.

B. Phầu thuật nội soi cấp cứu cắt ruột thừa. C. Phầu thuật nội soi bán khẩn cắt ruột thừa.

D. Điều trị kháng sinh mạnh, phẫu thuật cắt ruột thừa sau 1 tuần.

E. Điểu trị kháng sinh mạnh, phẫu thuật cắt ruột thừa sau 4 tuần.

K tụy Câu 4: Yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư tụy (chọn 1 câu đúng):

A. Chúng tộc da trắng.

B) Nghiện thuốc lá.

C. Chế độ ăn có nhiều chất xơ.

D. Bênh cao huyết áp.

E. Viêm tụy cấp.

K tụy

Câu 5: Ba triệu chứng cơ năng thường gặp của ung thư tuy theo xuất độ từ cao đến thấp là (chọn 1 câu đúng):

A. Đau bụng, nôn ra máu, vàng da.

B. Vàng da, đau bụng, nôn ra máu.

C. Vàng da, đau bụng, sụt cân.

D.) Đau bụng, vàng đa, sụt cân. E. Nôn ra máu, vàng đa, đau bụng.

K tụy Câu 6: Ung thư tụy giai đoạn 3 là (chọn 1 câu đúng):

A. Bướu nhỏ hơn 2cm trong nhu mỗ tụy.

B. Bướu có kích thước từ 2,1-4cm, không có di căn hạch.

Bướu có kích thước từ 2,1-4cm, có di căn hạch.

Bướu 4.1-6cm, có xâm lấn phúc mạc sau và tĩnh mạch. Bướu trên 6cm và có di căn đến các cơ quan lân cận.

Câu 7: Đặc điểm của chấn thương bụng kín và vết thương bụng (chọn 1 câu đúng): 4. Tạng rỗng thường bị tồn thượng trong chấn thương bụng kín là đạ đây, ruột non VT bung Tạng rỗng thượng bị tồn thương trong chấn thương bụng kin là tá tràng. C. Có thể có vở gan kèm vở hỗng trắng. Q. Tạng rỗng thường bị tôn thương trong chắn thương bụng kín hơn là vết thương bụng. Tả tràng chỉ bị tôn thương do vết thương bụng. Câu 8 Tổn thương võ lách độ II bao gồm (chọn 1 câu đúng); VT bung Tụ màu dưới bao 10-50% diện tích, tụ máu trong nhu mố < 5cm bề sấu. IB. Vở nhu mô > 3cm bể sâu, không ảnh hưởng mạch máu bè. Từ máu dưới bao > 50% diện tích; tụ máu trong nhu mô > 5cm bể sấu D. Võ thủy lách hay đút mạch máu rốn lách chi phối > 25% lách LE. Rách bao lách, vỡ nhu mô < 1cm bề sâu VT bụng Câu 9: Triệu chứng thực thể của xuất huyết nội do chấn thương bụng kín tchọn 1 cấu đúng): Bung chương ngay từ lúc bắt đầu có xuất huyết nội. Nghe nhu động ruột giảm. Go mất vùng đục trước gan. Sở bụng mềm xẹp, không điểm đau hay cảm ứng phúc mạc. K Tham trực tràng không phát hiện bắt thường. Câu 10: Nghe nhu động ruột tăng gặp trong bệnh (chọn 1 câu đúng): Tác ruột A. Thúng ô loét tá tràng. B. Võ lách do chấn thương bụng. ( ) Tặc ruột do dính. D. Tác mật do u bóng Vater. E. Hep môn vị do u hang vị. Câu 11: U bụng không thể sở được ở vùng trên rốn (thượng vị) khi khám bụng (chọn 1 câu đúng): K tuy A. U hang vi. K gan? U tâm vi. U đại tràng ngang. U đầu tuy. U gan trái. Câu 12: về phân độ; Trĩ nội độ 1 là (chọn 1 câu đúng): Trĩ A Nằm trong ống hậu môn. B. Sa thường xuyên ra ngoài. C. Sa ra khi đi cầu, tự thụt vào được. D. Sa ra khi đi cầu, phải đầy mới vào. E. Nam trong long trực trắng. Câu 13: Điểm đau Mayo Robson gặp trong bệnh (chọn 1 câu đúng): VTC A. Viêm da dày cấp. B. Viêm mù đường mật. C. Viêm túi mật cấp. Viêm tuy câp. E. Viêm đài bề thận cấp.

Rò HM Ca	A. Sốt. B. Đau hậu môn. C. Chây máu hậu môn khí rặn. D. Chây mú qua lỗ hậu môn. Tiểu phân có đàm, nhầy.
	15: Nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh rò hậu môn (chọn 1 câu đúng):  Do ung thư hậu môn – trực tràng.  B. Do sa trực tràng kiểu túi.  C. Do lao vùng hậu môn – trựcc tràng.  D. Do nhiễm trùng không đặc hiệu tuyến hậu môn.  E. Do xạ trị sau phẫu thuật ung thư trực tràng.
úi mậ <mark>t Cá</mark>	u 16: Yếu tố nguy cơ cho ung thư túi mật (chọn 1 câu sai):  A. Túi mật sành sử (Porcelain).  B. U cơ tuyến túi mật (adenomyomatosis).  C. Nhiễm Samonella.  Viêm túi mật mạn.  Bùn túi mật.
rờng m <b>ặt</b>	âu 17: nói về tam chứng Charcot, 3 triệu chứng điển hình xuất hiện theo thứ tự (chọn 1 câu đúng: A. Sốt, đau hạ sườn phải, vàng da. B. Sốt, nôn ói, vàng da. C. Đau hạ sườn phải, vàng da, sốt.  Di Đau hạ sườn phải, sốt, vàng da.  E. Đau hạ sườn phải, sốt, gan to.
ò HM	âu 18: <b>Tư thế đúng</b> của bệnh nhân khi thăm khám hậu môn – trực tr <b>àng (chọn 1 câu đúng):</b> A Tư thế phủ phục, chồng mông.  B. Nằm nghiêng phải; hồng và đầu gối co.  C. Nằm sắp, hai chân dạng 2 bên.  D. Nằm ngữa, hai chân duỗi thẳng.  E. Tư thế sản khoa.
	A) Thừng xo của bệnh rò hậu môn.  B. U ống hậu môn.  C. U trực tràng thấp.  D. Nhú gai ống hậu môn.  E. U trực tràng cao.
	A. Phái nữ.  B. Uống thuốc ngừa thai.  C. Tuổi già.  D. Nhiễm trùng đường ruột.  E. Béo phì.

Đ

K gan, tụy Dạ dày? 1: Nguyên tắc khám thực thể U bung, (chọn 1 câu đúng): A Không nên thâm trực trắng. 8. Gổ là động tác thâm khám quan trong nhất. Số tiếp cận đầu tiên ngay khối u. Theo 4 bude: nhin, nghe, go, sò. E. Không cần khám lỗ thoát vị. K gan tụy dạ dày, 22: Các tính chất của khối u cần lưu y khi khẩm bụng: NGOẠI TRỦ Jehọn I câu sai): A. Vị trí của khối u theo phân khu ở bung. B. Đuu khi ản chân. C. Kích thước, hình dạng, giới hạn của khối u. D. Mức độ di động của khối u. E. Kỳ năng nghe trên khối u không có ý nghĩa. TV ben đùi Câu 23: Cơ chế chống thoát vị tự nhiên của thoát vị ben (chọn 1 câu đúng): A. Cơ chế cơ vòng tại lỗ ben nông. B. Tác dụng cơ vòng của cơ chéo bung ngoài và cơ ngang bụng ở lỗ bện sâu. Cơ chế màn trập của cơ chéo trong. D. Tác dụng cơ vòng của dây chẳng Hesselbach và cơ chéo ngoài tại lỗ bẹn sâu. Tác dụng của cung cản cơ ngang che thành ben sau khi co. Câu 24: Phầu thuật điểu trị thoát vị ben )chọn 1 câu đúng): TV ben đùi A. Chỉ nên thực hiện đối với các trường hợp thoát vị ben nghọt. Có thể thực hiện bằng mô mở hay mô nội soi. Nên thực hiện đối với các trường hợp xơ gan mật bù. D. Thực hiện trước đối với các trường hợp có kèm bí tiểu do u xơ tiến liệt tuyến. E. Chẳng chỉ định ở bệnh nhân lớn hơn 60 tuổi. Câu 25: Diễn tiến thường gặp của triệu chứng đau bụng trong bệnh thúng đa dây (chọn 1 câu đúng): VT bung A Dau bung vùng thương vị sau đó lan xuống HC(P) và khắp bung B. Đau bung quanh rồn sau đó chuyển đau HC(P) C. Đau bung vùng HC (P) sau đó chuyển sang đau thượng vị D. Đau bung vùng thượng vị sau đó chuyển đau HC(P) E. Dau quanh rôn tan ra sau lung. Câu 26: Cận làm sáng đầu tiến cần làm khi nghi ngờ bệnh nhân bị thúng đạ đây (chọn 1 câu đúng): VT bung A. Siêu âm bụng XQ bung đứng không sửa soạn. C. CT Scan bung D. XQ phôi tháng E. MRI bung hẹp môn vị Câu 27: Hình ánh dạ dây ở giai đoạn sớm trong bệnh cánh hẹp môn vị do loét tá tràng (chọn 1 câu dungh A. Da day dan to, mát trương lực Da đây tăng co bốp, thành phi đại D. Da dây teo nhỏ do tinh trạng hẹp môn vị E. Da day nhiệm cũng

hẹp môn vị Câu 28: Triệu chứng thực thể có giá trị nhất trong chẳn đoán hẹp môn vị (chọn 1 câu đúng); A. Số được khối u ở vùng trên rốn. Dấu óc ách dương tính khi đói. B.)Dau óc ach dương tính kh C. Gỗ vang ở vùng trên rốn. D. Gỗ đục vùng trên rốn. E. Nghe nhu động ruột tăng ở vùng trên rồn. Câu 29: Triệu chúng đau bụng trong tắc ruột cơ học (chọn 1 câu đúng): Tắc ruôt A. Thường nổi bật ở người bệnh lớn tuổi ( > 75 tuổi). B. Đau bung có tính âm i. Đau bung có tính quặn từng con. Q. Không xảy ra đối với tắc ruột sớm sau mô. E. Đau nhiều, liên tục gọi ý tỉnh trạng tắc ruột sắp khai thông. Cậu 30: Dấu hiệu Howship Romberg dương tính gặp trong trường hợp (chọn 1 câu đúng): TV ben đùi Thoát vị bện phải nghệt. B. Thoát vị ben trái nghẹt. C. Thoàt vi đùi. D) Thoát vị bịt. E. Thoát vì vêt mô nghẹt. Câu 31: Phương tiện hình ảnh học có giá trị nhất giúp chấn đoán nguyên nhân của tắc ruột cơ học Tắc ruôt (chọn 1 câu đúng): A. Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) B. Siêu âm bung C. X quang bung đứng D. Chụp cộng hưởng từ E. Chụp cản quang đường ruột Câu 32: Nguyên nhân thường gặp nhất của lồng ruột ở trẻ em (chọn 1 câu đúng): Tắc ruôt A. Túi thừa Meckel. B) Không có nguyên nhân (Lông ruột tự phát). C. Polyp ruôt non. D. Hội chứng Peutz-Jeghers. E. Búi giun đũa. Tắc ruôt Câu 33: Đặc điểm không phải của lông ruột ở người lớn (chọn 1 câu sai): A. Thường có nguyên nhân cụ thể. B. Lông đại tràng chiếm 1/3 trường hợp. C. Thường lồng ruột diễn tiến theo kiểu mạn tính. D. Là nguyên nhân thường gặp của tắc ruột. E. Có thể không phân biệt được với tắc ruột do u đại tràng. Câu 34: Khi lá phúc mạc bị việm, vi khuẩn và độc tố có thể thâm nhập vào máu gây nên nhiễm **VPM** khuẩn huyết là đo (chọn 1 cấu đúng)? A. Hàm lượng độc tổ của vi khuẩn tăng cao. B. Sự chênh lệch về áp lực thẩm thấu. C. Tăng áp lực ổ bụng. D. Su dân rộng của các khe hở giữa các tế bào lá phúc mạc. (E) Tất cả đều đúng.

/PM	Câu 35: Để xác định chấn đoán Việm phúc mạc, dấu hiệu nào sau đây là quyết định chấn đoán (chọn I câu đúng):  A Đau bụng có tính liên tục, tăng dẫn.  B Khám thực thế có dấu hiệu co cứng thành bụng.  C. X quang bụng có hơi tự do.  D. Siêu âm bụng có dịch.  E. CT scan có dịch tự do trong ở bụng.
VPM	Câu 36: Việm phúc mạc thứ phát; NGOẠI TRỬ (chọn I câu sai)  A. Thúng ô loét tả trắng.  B. Thúng ung thư hang vị.  C Lao phúc mạc  D. Việm phúc mạc do việm phần phụ.  E. Việm ruột thừa hoại tử thúng.
K dạ dày	Câu 37: Yếu tố thuận lợi của ung thư thực quản; NGOẠI TRỬ (chọn 1 câu sai):  A. Nghiện rượu, thuốc lá.  B. Thực quản barrett.  C. Hội chứng Plummer-Vinson.  D. Co thất tâm vị không điều trị.  V  E. Viêm thực quản do nấm.
K dạ dày	Câu 38: Triệu chứng co năng thường gặp nhất của ung thư thực quản 1/3 giữa (chọn câu đúng):  A. Nuốt nghẹn.  B. Sụt cân.  C. Thiếu máu.  D. Khản tiếng.  E. Nổn ọc.
K dạ dày	Câu 39: Loại mô học thường gặp nhất của ung thư đạ đây:  A Ung thư biểu mô tuyến.  B. Ung thư tế bào gai.  Lymphoma.  D. OISTs.  E. Sarcoma đạ đây.
K dạ dày	Câu 40: Triệu chứng lâm sảng giai đoạn sớm của ung thư dạ dây (chọn 1 câu đúng):  A Vàng da, vàng mắt.  B Câm giác đẩy bụng, ăn chậm tiêu.  C Dau thượng vị liên tục, đau về đêm.  D. Báng bụng.  E. Da xanh, niêm nhạt.
K dạ dày	Câu 41: Vai trò của Nội soi đạ đây – tá tràng trong chấn đoán ung thư đạ đây (chọn 1 câu đúng):  A Ít có giá trị hơn so với chụp XQuang đạ đây cản quang.  B. Không cần thiết đối với ung thư giai đoạn muộn.  Có giá trị cao đối với các trường hợp ung thư sớm.  D. Giúp đánh giá giai đoạn bệnh.  E. Giúp đánh giá mức độ xâm lấn của tồn thương.

K dạ đầy 42: Điều trị ung thư biểu mô tuyến của đạ đây giai đoạn II (chọn 1 cấu đúng): A. Hóa trị giữ vai trò quyết định. B. Xạ trị giữ vai trò quyết định. Phầu thuật giữ vai trò quyết định. D. Ký thuật cắt niệm mạc qua nội soi (EMR) là tốt nhất, E. Kỹ thuật cắt dưới niềm mạc qua nội soi (ESD) là tốt nhất. KĐT Cấu 43: Vị trí thường gặp nhất của ung thư đại - trực tràng là (chọn I câu đúng): A. Manh tràng B. Đại tràng góc gan và góc lách C. Đại tràng ngang D. Đại tràng lên và đại tràng xuống Dại tràng chậu hông và trực tràng. KĐT Câu 44: Phương pháp phầu thuật nào sau đây thực hiện cắt bò các cơ thất hậu môn trong điều trị ung thu true trang: A. Phầu thuật Hartmann B. Phẫu thuật Miles C. Phầu thuật cặt trực tràng, nổi trước thấp. D. Phẫu thuật cắt đoạn đại - trực tràng, nổi tận - tận. E. Phầu thuật Kraske. Câu 45: Yếu tố sau đây không phải là vều tố nguy cơ gây nên ung thư gan nguyên phát:) K gan A. Siêu vi viêm gan B B. Siêu vi viêm gan C. C. Gan xo. D) Sôi đường mật. E. Aflatoxin Bi