



TƯỜNG TRÌNH THỦ THUẬT

Số PT: 22-0045834

Lần mổ: 1

Phòng mổ: P.DSA01

Họ tên: **NGUYỄN SƠN**

Năm sinh: 1949

Giới tính: Nam

Địa chỉ: TỔ 3 KV2, Phường Ngõ Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Chẩn đoán trước phẫu thuật: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên ngày 1, Killip II đã ngưng/ Tắc Stent mạch vành LAD I, LCx II
Thông tốt (I21.9)
Bệnh lý tăng huyết áp (I10)

Nhóm	Chẩn đoán sau phẫu thuật	Phương pháp phẫu thuật
1	Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên ngày 1, Killip II do tắc trong stent LAD I đã được ngưng bóng (Bv Bà Rịa 09/06/2022) (I21.9); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Bệnh 2 nhánh mạch vành, đã đặt stent LAD I-II (09/06/2022) do tái hẹp trong stent LAD I, stent LCx II thông tốt (I25.0)	Chụp, ngưng và đặt stent động mạch vành (Can thiệp mạch vành có IVUS)

Phương pháp vô cảm: TÊ TẠI CHỖ

Phẫu thuật viên: ThS BS. Vũ Hoàng Vũ (chính), BSCKI. Nguyễn Đức Chính

Tên cân quang: XENETIX 35G IOD/100ML

Liều sd cân quang: 110

Bác sĩ gây mê:

Thời gian chiếu tia X: 12

KTV gây mê:

Liều chiếu tia X: 1394

Dụng cụ viên:

Ngày phẫu thuật: 09/06/2022

Bắt đầu: 17:19 09/06/2022

Kết thúc: 18:10 09/06/2022

* Giải thích gia đình can thiệp mạch vành, gia đình đồng ý. Tiến hành can thiệp mạch vành

*Ekip: Bs. Vũ - Bs. Chính - Bs. Trọng (HV) - Bs. Tiến (HV)

- Change sheath 6F mới thay cho sheath cũ động mạch quay (P)

- Dụng cụ: guiding EBU 3.0 6F, guidewire Runthrough x2

- Cài guiding EBU vào động mạch vành trái

- đưa 2 guidewire vượt sang thượng đến đoạn xa LAD và D1

- Tiến hành khảo sát sang thượng bằng IVUS:

+ Chỉ định: tối ưu hóa can thiệp mạch vành

+ Stent LAD I nở chưa tốt, tăng sinh mảng xơ vữa trong stent

+ CSA = 3.2 mm², Plaque burden: 81 %

+ đường kính đầu gần: 3.6 mm, đầu xa 3.0 mm

+ Chiều dài sang thượng: 36 mm

+ Không ghi nhận huyết khối, bóc tách.

- Ngưng bóng PTCA MSM 2.0x15 mm, Sequen NEO 2.5x20mm, NC Sapphire 3.0x18 mm, tại sang thượng LAD I, áp lực 16 bar.

- Đặt stent Orsiro 2.75x40 mm, tại sang thượng LAD I-II, áp lực 16 bar.

- Ngưng lại bằng NC Sapphire 3.0x18 mm, Sapphire 3.25x18 mm, Sapphire 3.5x10 mm, áp lực 16-18 bar.


- Chụp lại dòng chảy TIMI III.

- Kết thúc thủ thuật, rút sheath, băng ép.

- Thời gian soi tia: 12 phút 20 giây

- Liều lượng tia: 1394 mGy

- Lượng thuốc cân quang: 110 mL (OMNIPAQUE 350)



Phẫu thuật viên



Signature Valid



ThS BS. Vũ Hoàng Vũ

Ngày ký: 18:01, 09/06/2022

Giải phẫu bệnh ☐