

# **NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)**

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST ĐỢT 2-2021 ► HỘI CHỨNG VÀNH CẤP PRETEST ĐỢT 2 05/12/2021

#### Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00


Bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước giờ thứ 30, phối hợp bộ đôi thuốc kháng kết tập tiểu cầu nào là phù hợp?

- a. Aspirin + Ticlopidine
- b. Ticagrelor + Clopidogrel
- c. Clopidogrel + Prasugrel
- d. Aspirin + Ticagrelor

Not yet answered Marked out of

1.00


Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, tiền căn đái tháo đường típ 2, nhập viện vì đau ngực cấp giờ thứ 12. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, còn đau ngực 6/10. Khám ghi nhận mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/60 mmHg, SpO2 95% (khí trời), tim T1 T2 đều rõ, gallop T3 ở mỏm, phổi ran ẩm 1/3 dưới 2 đáy phổi. Kết quả điện tim như hình bên dưới. Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin I 50 ng/mL (khoảng tham khảo < 0,2 ng/mL). Chiến lược điều trị tái thông được lựa chọn trên bệnh nhân này là?



- a. Tái thông mạch vành bằng tiêu sợi huyết
- b. Chụp và can thiệp mạch vành thì đầu
- o. Mổ bắc cầu mạch vành
- d. Cả 3 đều đúng


Not yet
answered
Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, tiền căn đái tháo đường típ 2, nhập viện vì đau ngực cấp giờ thứ 12. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, còn đau ngực 6/10. Khám ghi nhận mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/60 mmHg, SpO2 95% (khí trời), tim T1 T2 đều rõ, gallop T3 ở mỏm, phổi ran ẩm 1/3 dưới 2 đáy phổi. Kết quả điện tim như hình bên dưới. Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin I 50 ng/mL (khoảng tham khảo < 0,2 ng/mL). Điều trị nào sau đây là phù hợp với bệnh nhân này?



- a. Thở oxy ẩm
- b. Metformin
- c. Statin
- d. Trimetazidine

Not yet answered Marked out of 1.00 Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, tiền căn đái tháo đường típ 2, nhập viện vì đau ngực cấp giờ thứ 12. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, còn đau ngực 6/10. Khám ghi nhận mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/60 mmHg, SpO2 95% (khí trời), tim T1 T2 đều rõ, gallop T3 ở mỏm, phổi ran ẩm 1/3 dưới 2 đáy phổi. Kết quả điện tim như hình bên dưới. Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin I 50 ng/mL (khoảng tham khảo < 0,2 ng/mL). Bệnh nhân đã dùng Aspirin 81 mg 4 viên, loại thuốc và liều lượng của thuốc kháng kết tập tiểu cầu thứ 2 phù hợp cho bệnh nhân trước khi điều trị tái thông mạch vành là?



- a. Clopidogrel 150 mg
- b. Ticagrelor 180 mg
- c. Prasugrel 10 mg
- d. Cả 3 đều đúng

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên với thang điểm GRACE > 140, lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp với bệnh nhân này là?

- a. Thực hiện các biện pháp thăm dò không xâm lấn ngay lập tức như CT-scan mạch vành
- O b. Điều trị xâm lấn trong vòng 72 giờ
- c. Điều trị xâm lấn sớm trong vòng 24 giờ
- O d. Điều trị xâm lấn ngay trong vòng 2 giờ

#### Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì đau ngực cấp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới giờ thứ 12 Killip I. Bệnh nhân có tiền căn hen phế quản. Thuốc nào nên cho sớm để giảm tỉ lệ tử vong cho bệnh nhân?

- a. Nitrate tác dụng kéo dài
- b. Chen bêta giao cảm
- c. Chen kênh canxi nhóm Non-DHP
- d. Úc chế men chuyển

## Question **7** Bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp không ST chênh Not yet lên nguy cơ trung bình, chiến lược điều trị phù hợp cho bệnh nhân này answered là? Marked out of 1.00 a. Điều trị xâm lấn ngay lập tức b. Điều trị xâm lấn sớm trong vòng 24 giờ $\bigcirc$ c. Điều trị xâm lấn trong vòng 72 giờ d. Thăm dò không xâm lấn (nếu có thể) $\bigcirc$ Question 8 Thông số nào sau đây có trong thang điểm GRACE? Not yet answered Marked out of 1.00 a. Giới tính b. Mức AST c. Chỉ số đường huyết $\bigcirc$



d. Mức creatinine