

## CHẨN THƯƠNG CHÍNH HÌNH Y2011 2015 - 2016

1. Bệnh Scheuerman đặc điểm của bệnh
2. Hội chứng túy trước đặc điểm
3. Rối loạn phát triển khớp háng bẩm sinh
4. Tuổi > 40 bướu xương loại nào hay gặp
5. Vết thương khớp chẩn đoán xác định
6. Vết thương khớp định nghĩa
7. Xương trẻ em khi gãy có các kiểu di lệch gì [phình vỏ xương, cong tạo hình, sụn tiếp hợp, càn tươi](#)
8. Di chứng ngắn chi nguyên do là gì
9. Di chứng ngắn chi chỉ số tối đa
10. Phân độ Gartland [gãy xương trẻ em p47](#)
11. 1/3 trên xương đùi khi gãy có các kiểu di lệch gì
12. Vết thương phần mềm yếu tố nguy cơ [vết thương phần mềm p11](#)
13. Gân yếu nhất ở bàn tay
14. Nhiệm vụ ban điều hành địa phương hoặc trung ương của PHCN có đặc điểm gì
15. Tuổi hay bị gãy xương ở trẻ em
16. Vẹo cột sống đặc điểm : định nghĩa theo mặt phẳng trán
17. Gãy xương Galeazzi
18. Gãy xương khớp háng : kiểu bít, kiểu chậu, kiểu ngồi

Các câu khác đề thi CTCH 12/3/2016

1. Các loại bướu thường gặp ở người trên 40t:
  - A. Đa u túy
2. Tổn thương nào ko phải giả bướu: chọn u nguyên bào sợi
3. Chẩn đoán bướu xương bằng phương tiện nào có giá trị nhất: XQ xương
4. Di chứng ngắn chi
  - A. Gãy một phần sụn tiếp hợp
  - B. Gãy toàn bộ sụn tiếp hợp

- C. Di lệch chùng ngắn
5. Di lệch chùng ngắn ở trẻ em tối đa chấp nhận được là bao nhiêu:
- A. 1cm
  - B. 1-2cm
  - C. 2-3cm**
  - D. 3-4cm
  - E. >4cm
6. Di lệch nào ở trẻ em ko cần nắn chỉnh sẽ tự lành được:
- 1-Chùng ngắn
  - 2-gập góc
  - 3-sang bên
  - 4-Xoay
- A. 1, 2, 3 đúng**
7. Khả năng lành xương của trẻ em là bao nhiêu? 91-95% câu này khối 2 ko có.
8. Định nghĩa vẹo cột sống? góc > 10o ở mặt phẳng trán.
9. Bệnh Scheuerman
- A. Là bệnh gù vẹo cột sống
  - B. Góc 2 đốt sống 45\*
  - C. Do có nhiều đốt sống hình chêm**
  - D. Gia đình
10. CD phẫu thuật gãy xương đòn? Câu sai:
- A. Dọa mở ra da
  - B. Thẩm mỹ
  - C. Bập bênh khớp vai
  - D. Gãy hở
  - E. Gãy nhiều mảnh.**
11. Nhiệm vụ của Ban điều hành trong PHCN cộng đồng: **lôi kéo cộng đồng cùng tham gia**
12. CD tập PHCN khi nào?
- A. Ngay khi co chỉ định phẫu thuật**
  - B. Trong khi phẫu thuật
  - C. Ngày 1 hậu phẫu**
  - D. Hậu phẫu 1 tuần
13. [cho hình] đây là loại trật khớp háng nào?( dạng đùi, gập cẳng chân)
- A. Kiểu bịt**
  - B. Ra trước
  - C. Lên trên
  - D. Kiểu mu
14. Tư thế bó bột các loại gãy 2 xương cẳng tay:
- A. 1/3 trên – cổ tay ngửa**
  - B. 1/3 giữa – cổ tay ngửa
  - C. ...
15. Hội chứng tủy trước: chọn câu SAI:

- A. Liệt vận động 2 chi dưới
  - B. Còn cảm giác nông
  - C. Mất cg đau nhiệt
  - D. Khả năng phục hồi vận động 90%**
16. Hình ảnh X-Quang Lao cột sống:
- A. Hủy xương
  - B. Mất xương, có hình ảnh xương chết
  - C. Trật khớp, dính khớp
  - D. Hẹp khe khớp**
17. TCLS của Lao xương khớp?
18. Sau PT đoạn chi nên làm j?
- A. Không đưng vào chi đoạn
  - B. Tránh để vật đè lên chi đoạn, vì sẽ làm duỗi đoạn gần chi đoạn**
  - C. ...
19. Bệnh DDH ở trẻ em?? [RL khớp háng](#)
- A. Con trai nhiều hơn gái
  - B. Cần phẫu thuật sớm
  - C. Can thiệp sớm có kết quả tốt.**
  - D. ...
20. Bệnh chân khoèo có thể phát hiện
- A. Ngay lúc sinh
  - B. Siêu âm bào thai**
  - C. ...
21. Cột sống cổ gãy được xem là mất vững khi:
- A. Gãy lún >25% chiều cao thân đốt**
  - B. Gập góc giữa 2 thân đốt sống 10°
  - C. X+Y >6mm là mất vững C1-C2
  - D. Di lệch 3mm
  - E. Mất đường con sinh lí cổ.
22. Chỉ số DENIS đánh giá gãy ko vững cột sống khi có tổn thương:
- A. 2 cột
  - B. 3 cột
  - C. >=2 cột**
  - D. Cột giữa
  - E. Cột sau
23. Phân độ gãy tay trên lồi cầu trẻ em gây tổn thương mạch máu thần kinh theo Gartland
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3a [di lệch sau trong](#)
  - D. 3b [di lệch sau ngoài](#)**
  - E. 5
24. Các chỉ số X-Quang của gãy xương cẳng tay: câu SAI:

- A. Góc nghiêng trụ
  - B. Góc nghiêng quay**
  - C. Góc nghiêng lòng
  - D. Chỉ số khác biệt xương trụ
  - E. Số đo chiều dài đầu dưới xương quay
25. CCD phương pháp gây tê của trật khớp:  
... tất cả :v
26. Gãy 1/3 trên xương đùi di lệch ntn?  
Sang bên, xoay ngoài, góc mở ...trng/ ngoài j đấy có 1 cái sang bên à.
27. Diễn tiến của NT bàn tay sau đây là luôn luôn đúng?  
A. Phẫu thuật dẫn lưu
- B. Hoại tử nếu ko can thiệp nội ngoại khoa sớm**

28. Điều trị khi vừa khởi phát viêm xương đường máu:  
A. Ngay khi khởi phát
- B. Kháng sinh phổ rộng**
- C. ...

29. Hoại tử bàn tay sẽ xảy ra khi không thực hiện: k2 ko có câu này.

30. Chẩn đoán xơ vết thương khớp khi:  
A. Vết thương ngay vị trí khớp
- B. Dịch trong chảy ra**
- C. Chọc dịch ổ khớp thấy máu không đông
- D. ...
- E. Tất cả**

31. Đứt gân mặt mu bàn tay thì ngón tay sẽ.  
A. Ngón liên đốt gần gấp, ngón liên đốt xa duỗi. e chọn câu này :’(
- B. .... Đáp án khác ko nhớ

Các câu khác đề thi CTCH 12/3/2016

32. Các loại bướu thường gặp ở người trên 40t:
- B. Đa u tủy**
  - C. Bướu sụn xương
  - D. Sarcom tạo xương
  - E. Bướu ác tính di căn
  - F.
33. Tổn thương nào không phải là bướu: chọn u nguyên bào sợi
- A. loạn sản sợi
  - ~~**B. u nguyên bào sợi**~~
  - C. bướu màng hoạt dịch?

D. u sụn gì đó

34. Chẩn đoán bước xương bằng phương tiện nào có giá trị nhất:

A. **XQ xương**

B. CT

C. MRI

D.

E. xạ hình xương

35. Di chứng ngắn chi

D. Gãy một phần sụn tiếp hợp

**E. Gãy toàn bộ sụn tiếp hợp**

F. Di lệch chông ngắn

36. Di lệch chông ngắn ở trẻ em chấp nhận được là bao nhiêu:

F. 1cm

**G. 1-2cm**

H. 2-3cm

I. 3-4cm

J. >4cm

37. Di lệch nào ở trẻ em cần chỉnh hình sẽ tự lành được:

1-Chông ngắn

2-gập góc

3-sang bên

4-Xoay

**B. 1, 2, 3 đúng**

38. Khả năng lành xương của trẻ em là bao nhiêu?

A. 12t

B. 10t

**C. tốt nhất <= 8t**

D. lành nhanh theo gần khuỷu xa gối

E.

39. Định nghĩa vẹo cột sống?

**A. Trong không gian 3 chiều**

**B. Mp trán**

C.

D.

E.

40. Bệnh Scheuermann

E. Là bệnh gù vẹo cột sống

F. Góc 2 đốt sống 45°

**G. Do có nhiều đốt sống hình chêm**

H. Không di truyền

I. Thường ở tuổi thanh thiếu niên?

41. Chỉ định phẫu thuật gãy xương đòn? Câu sai:

F. Dọ mở da

G. Thẩm mỹ

H. Bập bênh khớp vai

I. Gãy hở

**J. Gãy nát**

42. Nhiệm vụ của Ban điều hành trong PHCN cộng đồng:

**A. lôi kéo cộng đồng cùng tham gia**

B. chọn tài liệu phương tiện huấn luyện

C.

D.

E. lập kế hoạch

43. Chỉ định tập PHCN khi nào?

**E. Ngay khi có chỉ định phẫu thuật**

F. Trong khi phẫu thuật

G. Ngày 1 hậu phẫu

H. Hậu phẫu 1 tuần

44. [chơ hình] đây là loại trật khớp háng nào? ( dạng đùi, gập cẳng chân) **Kiểu bịt**

45. Trật khớp gối các loại gãy 2 xương cẳng tay:

**D. 1/3 trên – cổ tay ngửa**

E. 1/3 giữa – cổ tay sấp

F. 1/3 dưới – trung tính

G.

H. A và B

46. Hội chứng túy trước: chọn câu SAI:

E. Liệt vận động 2 chi dưới

F. Còn cảm giác nóng

G. Mất cơ đa nhiệt

**H. Khả năng phục hồi vận động 90%**

47. Hình ảnh X-Quang Lao cột sống:

E. Hủy xương, tạo xương

F. Mất xương, có hình ảnh xương chết

G. Trật khớp, dính khớp

**H. Hẹp khe khớp, nham nhở**

48. TCLS của Lao xương khớp?

A. Hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc

B. Đau tại vị trí tổn thương, đi lệch người

C. Dò mủ tại chỗ hoặc xa tổn thương

D. Có thể liệt mềm hai chi dưới, rối loạn cơ tròn trong lao cs có chèn ép tủy

**E. all**

49. Sau PT đoạn chi nên làm gì?

D. Không độn vào chi đoạn

☒ E. Tránh để vật đè lên chi đoạn, và sẽ làm duỗi đoạn gần chi đoạn

F.

G.

H. Băng mỏm cụt

50. Bệnh lý rối loạn phát triển khớp háng bẩm sinh DHD ở trẻ em??

A. Nam > nữ

B. Sinh ngôi ngang

C.

**D. Cần phát hiện sớm và điều trị càng sớm càng tốt**

E.

51. Bệnh chôn khoét có thể phát hiện

D. Ngay lúc sinh

**E. Siêu âm bào thai**

F. 1 tuần sau sinh

G.

H.

52. Cột sống gãy được xem là mất vững khi:

**F. Gãy lún >25% chiều cao thân đốt**

G. Gập góc giữa 2 thân đốt sống 10°

H.  $X+Y > 6\text{mm}$  làm mất vững C1-C2

I.  $ADI > 5\text{mm}$

J.

53. Chỉ số DENIS đánh giá gãy cột sống khi có tổn thương:

F. 2 cột

G. 3 cột

**H.  $\geq 2$  cột**

I. Cột giữa

J. Cột sau

54. Phân độ gãy xương tay ở trẻ em theo Gartland có tổn thương tk quay, đm cánh tay

A. I

B. II

C. IIIA

D. IIIB

E. V

55. Các chỉ số X-Quang của gãy xương cổ tay: câu SAI:

F. Góc nghiêng trụ

**G. Góc nghiêng quay**

H. Góc nghiêng long

I. Chỉ số khác biệt xương trụ

J. Số đo chiều dài đầu dưới xương quay

56. CCD phương pháp gây tê của trật khớp:

57. Gãy 1/3 trên xương đòn di lệch ntn?

A. Chồng ngắn, xoay trong gập góc vào trong

**B. Chồng ngắn, xoay ngoài gập góc vào trong**

C. Sang bên xoay ngoài gập góc ra ngoài

D.

E.

58. Diễn tiến của NT bàn tay?

59. Điều trị khi vỡ khớp phát viêm xương đường máu:

D. Ngay khi khởi phát

**E. Kháng sinh phổ rộng**

F. ...

60. Hoạt tử bàn tay sẽ xảy ra khi không thực hiện: giống đề



61. Chẩn đoán vết thương khớp khi:

- F. Vết thương ngay vị trí khớp
- G. Dịch trong chảy ra dịch sánh
- H. Chọc dịch ổ khớp thấy máu
- I. ...

**J. Tất cả**

62. Yếu tố tiên lượng TMMDM:

- A. Gãy xương lớn
- B. Gãy nhiều xương
- C. Gãy xương đâm vào động mạch
- ☒ D. Gãy hở độ III
- E. Gãy xử trí thô bạo