

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ I, lần I, niên khóa 2010-2011

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA

ĐỀ THI LÝ THUYẾT SẢN PHỤ KHOA Y₄

Học kỳ I, Lần I, Niên khóa 2010-2011, Ngày 26.12.2010. 60 câu, thời gian làm bài 45 phút

PHẦN I: Câu hỏi chọn một trả lời

Từ câu 1 đến câu 12, chọn một câu đúng

- So sánh ngõ vào và ngõ ra của ống sanh, *chọn một câu đúng*
 - Ngõ vào và ngõ ra đều cùng là một vành đai xương cố định
 - Bình diện của ngõ vào và bình diện của ngõ ra tạo nên một góc xấp xỉ góc vuông
 - Thì số thai ít lệ thuộc ít lệ thuộc vào đặc điểm ngõ ra
 - Tương quan so với mặt phẳng nằm ngang của bình diện tương đối của cả ngõ vào và ngõ ra bất biến khi thay đổi tư thế của sản phụ lúc rặn sanh
- So sánh chất nhầy CTC ở ngày 13th và ở ngày 15th của chu kỳ có phóng noãn ở ngày 14th, *chọn một câu đúng*
 - Khác nhau về độ trong suốt
 - Khác nhau về độ dài
 - Khác nhau về số lượng
 - Khác nhau về kết tinh NaCl
- So sánh các feed-back của các steroid sinh dục lên tăng trên, *chọn một câu đúng*
 - Các steroid sinh dục đều có feed-back dương
 - Các feed-back là kết quả của sự giảm sút của nồng độ steroid lưu hành
 - Tất cả các feed-back của các steroid sinh dục đều có sự tham gia của Hạ đồi
 - Estradiol có 2 feed-back, còn progesterone chỉ có 1 feed-back
- Quan sát một trứng người giờ thứ 24 sau khi đã thụ tinh, *chọn một câu đúng*
 - Trong khoảng quanh noãn bào có thể tìm thấy 3 cực cầu
 - Trong noãn bào thấy có 2 tiền nhân
 - Trong khoảng dưới màng trong suốt, có xác các tinh trùng đến muộn
 - Trong bề dày của màng trong suốt, không còn sự hiện diện của tinh trùng
- Khi một phụ nữ 25 tuổi, trước nay kinh đều, lần đầu tiên bị trễ kinh 1 tuần, cần nghĩ đến ... , *chọn một câu đúng*
 - Bất thường của phóng noãn
 - Bất thường của vận chuyển trứng
 - Bất thường của nội mạc tử cung
 - Bất thường của chuyển hóa glucose
- So sánh hCG và LH, *chọn một câu đúng*
 - Hai hormon này cùng là hormon peptid
 - Hai hormon này cùng giống nhau ở chuỗi beta
 - Hai hormon này cùng có một cơ quan bia chung là buồng trứng
 - Hai hormon này cùng có một nguồn sản xuất là hoàng thể
- Về cấu tạo và sự phát triển của phôi ở giai đoạn sớm của thai kỳ, *chọn một câu đúng*
 - Màng đệm có nguồn gốc là các tế bào thuộc trung bì phôi
 - Màng rụng có nguồn gốc là các tế bào thuộc ngoại bì phôi
 - Màng ối có nguồn gốc là các tế bào thuộc nội bì phôi
 - Màng nhau có nguồn gốc là các tế bào thuộc ngoại bì lá nuôi
- Trong 3 tháng đầu thai kỳ, SÂ ngã bụng sẽ tốt hơn SÂ ngã âm đạo cho mục tiêu ... , *chọn một câu đúng nhất*
 - Xác định sinh tồn trứng
 - Xác định tuổi thai
 - Xác định vị trí thai
 - Khảo sát hình thái thai
- Trong 3 tháng cuối thai kỳ, SÂ ngã âm đạo sẽ tốt hơn SÂ ngã bụng cho mục tiêu ... , *chọn một câu đúng nhất*
 - Tầm soát nhau bám thấp
 - Xác định nhau bám thấp
 - Phân loại nhau bám thấp
 - Loại trừ nhau bám thấp
- Tầm soát lệch bội ở tam cá nguyệt thứ nhất, vũ khí quan trọng nhất là ... , *chọn một câu đúng nhất*
 - PAPP-A
 - free beta-hCG
 - Estriol không liên hợp
 - Độ dày khoảng thấu âm sau gáy

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ I, lần I, niên khóa 2010-2011

11. Về tác dụng phụ quan trọng nhất của Ethinyl Estradiol dùng trong thuốc tránh thai phối hợp, **chọn một câu đúng**
 - a. Ethinyl Estradiol có thể gây phát triển các khối u lệ thuộc estrogen
 - b. Ethinyl Estradiol có thể gây thuyên tắc mạch
 - c. Ethinyl Estradiol có thể gây rối loạn chuyển hóa lipid máu
 - d. Ethinyl Estradiol có thể gây rối loạn chuyển hóa Glucide máu
12. Về tác dụng phụ thường thấy nhất của thanh cầy phóng thích chậm progestogen, **chọn một câu đúng**
 - a. Vô kinh
 - b. Rong kinh
 - c. Thống kinh
 - d. Cường kinh

Từ câu 13 đến câu 24, chọn một câu sai

13. Ở tuần thứ 12 vô kinh của một thai kỳ bình thường ..., **chọn một hành động sai**
 - a. Thực hiện siêu âm qua đường bụng để tầm soát lệch bội bằng cách đo bề dày khoảng thấu âm sau gáy
 - b. Thực hiện huyết thanh chẩn đoán Giang mai, HIV, HBsAg, Rubella, Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus
 - c. Thực hiện Huyết đồ, Nhóm máu Rhesus, Đường huyết bất kỳ, Tổng phân tích nước tiểu
 - d. Thực hiện tiêm phòng VAT cho thai phụ chưa có miễn dịch với uốn ván
14. Bà A. 40^t, 0000, thai 18 tuần ..., **chọn một hành động không hợp lý**
 - a. Thực hiện triple test tầm soát lệch bội
 - b. Thực hiện chọc ối khảo sát lệch bội
 - c. Thực hiện siêu âm 3-4D khảo sát dị tật bào thai
 - d. Thực hiện bổ sung sắt và acid folic đủ thai phụ không có biểu hiện thiếu máu
15. Các vấn đề chủ yếu khi ghi chép chuyển dạ lên biểu đồ theo dõi chuyển dạ, model của WHO, **chọn một câu sai**
 - a. Vị trí của ngôi thai được xác định qua khám bụng
 - b. Con co được thể hiện trên biểu đồ qua 2 đặc điểm là tần số và thời gian co
 - c. Tịch tiến điểm ghi độ mở CTC lên trên đường báo động khi CTC mở được 3^{cm}
 - d. Chỉ bắt đầu ghi sản đồ khi đã có 2 con co trong 10 phút
16. Trong can thiệp tích cực thời kỳ sổ nhau, cần ..., **chọn một câu sai**
 - a. Sử dụng oxytocin dự phòng
 - b. Sử dụng ergot alkaloids dự phòng
 - c. Sử dụng prostaglandins dự phòng
 - d. Thực hiện xoa đáy tử cung
17. Thực hiện can thiệp tích cực giai đoạn 3rd, **chọn một câu sai**
 - a. Có thể làm giảm nồng độ Hb% của sơ sinh
 - b. Làm giảm nhu cầu sử dụng oxytocin cho sản phụ
 - c. Có thể gây khó chịu cho sản phụ
 - d. Là một can thiệp an toàn cho sản phụ
18. Thực hiện đón trẻ sơ sinh bình thường tại phòng sanh, nên ..., **chọn một câu sai**
 - a. Để da trẻ tiếp xúc với da mẹ
 - b. Thực hiện hút đường tiêu hóa trẻ
 - c. Lau khô da trẻ
 - d. Nhỏ mắt cho trẻ với dung dịch Bạc hữu cơ
19. Khi chăm sóc rốn sơ sinh tại nhà, người ta có thể dùng ..., **chọn một câu sai**
 - a. Dung dịch Iod hữu cơ
 - b. Dung dịch Iod vô cơ
 - c. Dung dịch kháng sinh
 - d. Dung dịch NaCl
20. Khi điều trị viêm vú nhiễm trùng, người ta cần ..., **chọn một câu sai**
 - a. Ngưng nuôi con bằng sữa mẹ
 - b. Làm trống bầu vú
 - c. Dùng kháng sinh
 - d. Điều trị vết loét ở núm vú, nếu có
21. Chăm sóc sơ sinh non tháng, nên ..., **chọn một câu sai**
 - a. Tăng cường thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ
 - b. Chú ý giữ ấm trẻ một cách đầy đủ
 - c. Chủng ngừa đầy đủ cho trẻ theo chương trình
 - d. Để trẻ tiếp xúc thường xuyên với cơ thể mẹ

Đề thi tự luận

22. Khi rốn chậm rụng, cần thực hiện các hành động sau, **chọn một câu sai**
- Để hở rốn
 - Sát khuẩn rốn
 - Giữ rốn khô
 - Dùng kháng sinh
23. Những nhược điểm của tránh thai bằng thuốc tránh thai khẩn cấp chứa progestogen là, **chọn một câu sai**
- Có thể gây thai ngoài tử cung
 - Có thể gây rong huyết
 - Có thể gây thay đổi trong chu kỳ kinh sau
 - Có hiệu quả không cao
24. Những nhược điểm của tránh thai bằng dụng cụ tử cung chứa đồng là, **chọn một câu sai**
- Có thể gây rong huyết
 - Có thể gây thai ngoài tử cung
 - Có thể gây thông kinh
 - Có thể gây cường kinh

PHẦN 2: Câu hỏi chọn nhiều trả lời

Từ câu 25 đến câu 36.

Đánh dấu vào 1 nếu bạn không chọn bất cứ phương án nào

25. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiện tượng xoay trọng của ngôi, **chọn các câu đúng**
- Hình dạng của ống sanh
 - Trở kháng của thành phần khác nhau của đường sanh
 - Cơ co tử cung
26. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiện tượng xoay ngoài của ngôi, **chọn các câu đúng**
- Hình dạng của ống sanh
 - Trở kháng của thành phần khác nhau của đường sanh
 - Cơ co tử cung
27. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào gây rách nhiều, sâu ở tầng sinh môn khi sổ thai, **chọn các câu đúng**
- Góc vệ hẹp
 - Ngôi sổ ở chằm cùng
 - Ngôi mặt
28. Ngôi chồm có thể sẽ xoay trong 135° ngược chiều kim đồng hồ trong các trường hợp ..., **chọn các câu đúng**
- Ngôi chồm, kiểu thể chằm chậu Phải sau
 - Ngôi chồm, kiểu thể chằm chậu Trái trước
 - Ngôi chồm, kiểu thể chằm chậu Phải trước
29. Ngôi ngược, kiểu sổ là Cùng Chậu Trái Ngang, sau đó sẽ tiếp tục diễn tiến như sau ..., **chọn các câu đúng**
- Ụ dùi Phải tì vào bờ dưới khớp vệ đẻ sổ, sau đó mông hạ xuống đẻ sổ ụ dùi Trái
 - Xương cùng xoay ngoài một góc 90° theo chiều kim đồng hồ
 - Khi hạ chằm ra đến bờ dưới khớp vệ đầu sẽ ngửa dần để lần lượt sổ cằm, mặt, trán và 2 ụ đỉnh
30. Khám 1 trường hợp ngôi ngang, kiểu thể Vai Chậu Trái Lưng Trước, sa 1 cánh tay vào âm đạo, **chọn các câu đúng**
- Cánh tay trong âm đạo là cánh tay Phải của thai nhi
 - Bàn tay thai nhi úp sấp
 - Sờ cao lên trên thấy nách của thai ở vị trí 3 giờ
31. Trên biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung, rối loạn cơn co kiểu cường tính có thể gây ra ..., **chọn các câu đúng**
- Nhịp giảm muộn
 - Nhịp giảm kéo dài
 - Nhịp nhanh
32. Về biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung, **chọn các câu đúng**
- Nhịp giảm muộn liên quan có ý nghĩa với một tình trạng nhiễm toan
 - Nhịp giảm bất định liên quan có ý nghĩa với một bất thường trong trao đổi nhau-thai
 - Nhịp tăng liên quan có ý nghĩa với những thay đổi lưu lượng dòng chảy trong cuống rốn

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ I, lần I, niên khóa 2010-2011

33. Về hiệu quả của corticoid liệu pháp trong chuyển dạ sanh non và ối vỡ non, **chọn các phát biểu đúng**
1. Hiệu quả bảo vệ của Corticoid liệu pháp cao nhất khi tuổi thai dưới 34 tuần
 2. Corticoid làm giảm tỉ lệ suy hô hấp cấp cũng như một số vấn đề thần kinh khác ở sơ sinh
 3. Không cần thiết phải thực hiện các đợt lặp lại corticoid liệu pháp
34. Trong song thai một trứng-một nhau-một ối, **chọn các câu đúng**
1. Vấn đề phức tạp nhất là thai kỳ chứ không phải là cuộc sanh
 2. Tử suất sơ sinh thường cao hơn trong các kiểu song thai khác
 3. Thường hay có sự chênh lệch về phát triển giữa hai thai
35. Trong song thai hai trứng-hai nhau-hai ối, **chọn các câu đúng**
1. Có thể dễ dàng xác định hai nhau-hai ối, nhưng để xác định là hai trứng thì là rất khó
 2. Trong cuộc sanh, nguy cơ sản khoa cho thai thứ nhất cao hơn nguy cơ cho thai thứ nhì
 3. Bệnh suất và tử suất cho mẹ gần tương tự so với song thai một trứng-một nhau-một ối
36. Khi thai phụ đến khám thai ở những thời điểm rất sớm trong thai kỳ, khi trễ kinh dưới 2 tuần, không nên thực hiện siêu âm cho thai phụ vì ... , **chọn các câu đúng**
1. Chưa khảo sát được hình thái học thai
 2. Thai chưa đến buồng tử cung
 3. Có thể gây sảy thai

Đề thi lý thuyết Sản Phụ Khoa, Y₄, Học kỳ I, lần I, niên khóa 2010-2011

PHẦN 3: Bất cập

Từ câu 37 đến câu 52

Trong phần này, một ý ở cột bên Trái sẽ ứng với duy nhất một ý ở cột bên Phải. Hãy chọn ý bất cập tương ứng. Lưu ý rằng một ý ở cột bên phải có thể ghép được với nhiều ý khác nhau, hoặc không ghép được với bất cứ ý nào ở cột bên Trái

Về thời điểm thực hiện tránh thai ... (37, 38, 39, 40)... (a, b, c, d) ...

- | | |
|--|--|
| 37. Thời điểm có thể đặt DCTC tránh thai là ... ^a | a. Ngày 3 rd của chu kỳ kinh 28 ngày |
| 38. Dùng tránh thai khẩn cấp nếu GH ở thời điểm ... ^d | b. Ngày 13 th của chu kỳ kinh 28 ngày |
| 39. Thời điểm có thể bắt đầu đặt que tránh thai là ... ^b | c. Ngày 21 st của chu kỳ kinh 28 ngày |
| 40. Thời điểm có thể bắt đầu vi thuốc tránh thai là ... ^c | d. Bất cứ ngày nào trong chu kỳ kinh ... |

Một số động thái điều trị lệ thuộc vào tuổi thai ... (41, 42, 43, 44)... (a, b, c, d) ...

- | | |
|---|------------------------------|
| 41. Thời điểm muộn nhất để tiêm VAT mũi 1 st là ... ^a | a. Tuổi thai 28 tuần vô kinh |
| 42. Trẻ gọi là đủ tháng khi sinh ở ... ^d | b. Tuổi thai 32 tuần vô kinh |
| 43. Beta-methasone cho hiệu quả lý tưởng nhất ở ... ^b | c. Tuổi thai 36 tuần vô kinh |
| 44. Beta-mimetic không còn được chỉ định kể từ ... ^c | d. Tuổi thai 38 tuần vô kinh |

Trong trường hợp muốn khảo sát ... (45, 46, 47, 48)... người ta dùng ... (a, b, c, d) ...

- | | |
|--|-----------------------------|
| 45. Tầm soát nhau bám thấp ... ^b | a. Siêu âm ngã âm đạo |
| 46. Xác định nhau bám thấp ... ^c | b. Siêu âm ngã âm bụng |
| 47. Phân loại nhau bám thấp ... ^a | c. Siêu âm Doppler |
| 48. Nhau bám thấp ở người có vết mổ sanh cũ ... ^d | d. Không có trong danh sách |

Để ... (49, 50, 51, 52)... người ta dùng ... (a, b, c, d) ...

- | | |
|---|---|
| 49. chẩn đoán xác định thiếu ối ... ^d | a. điểm cắt của trị số muốn khảo sát |
| 50. chẩn đoán thai chậm tăng trưởng ... ^c | b. bách phân vị của trị số muốn khảo sát |
| 51. thiết lập chẩn đoán thai ngoài tử cung ... ^d | c. diễn biến của trị số khảo sát |
| 52. tầm soát tiểu đường trong thai kỳ ... ^b | d. phối hợp sử dụng 2 dữ kiện trong a, b, c |

PHẦN 4: Điền khuyết

Từ câu 53 đến 60, hãy chọn một trong các lựa chọn cho trước để điền vào các khoảng trống. Lưu ý mỗi lựa chọn chỉ được dùng một lần

Phân đoạn 1:

- Sinh tồn trứng
- Bất thường nhiễm sắc thể
- Bất thường xâm nhập của nguyên bào nuôi vào thành mạc
- Bất thường bệnh học nguyên bào nuôi

hCG là một nội tiết mà việc định lượng nó có nhiều ứng dụng trong sản khoa. Đầu và giữa tam cá nguyệt thứ 1st, người ta thường định lượng hCG khi nghi ngờ có ... (53) ...^a. Cuối tam cá nguyệt thứ 1st là thời điểm mà định lượng hCG thường được dùng để khảo sát ... (54) ...^b. Đầu tam cá nguyệt thứ nhì là thời điểm định lượng hCG có giá trị trong dự báo ... (55) ...^c. Tuy nhiên, việc định lượng hCG có ý nghĩa rất thấp trong dự báo ... (56) ...^d

Phân đoạn 2:

- Số đo đường kính lưỡng đỉnh
- Số đo chu vi vòng bụng
- Số đo đường kính ngang bụng
- Số đo chiều dài các xương dài

Một trong các mục tiêu quan trọng của khám thai trong tam cá nguyệt thứ 3rd là khảo sát tăng trưởng bào thai. Khảo sát này dựa trên số liệu sinh trắc thai nhi. Trong đó, dữ kiện nhạy cảm nhất khi có bất thường tăng trưởng bào thai là ... (57) ...^a. So với ... (58) ...^b dữ kiện được nêu đầu tiên này ít phạm phải những sai số của phép đo hơn. Khi có bất thường nhiều hơn trong tăng trưởng thì ... (59) ... sẽ bị ảnh hưởng. ... (60) ...^d bị ảnh hưởng muộn nhất, và thường quan sát thấy trong tình trạng có chậm tăng trưởng không đối xứng của bào thai.