

CÂU 1

Đặc điểm giúp phân biệt nguyên nhân viêm hô hấp trên do siêu vi hay vi trùng, **NGOẠI TRỪ**:

- A. Tổng trạng của bé
- B. Đặc điểm và diễn tiến của sốt
- C. Diễn tiến của triệu chứng hô hấp
- D. Màu sắc của chất tiết mũi

PRETEST TIẾP CẬN HO

Y2018 – ĐỢT 1 – NHÓM 1

PRETEST TIẾP CẬN HO

Y2018 – ĐỢT 1 – NHÓM 1

CÂU 1

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.

CÂU 2

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.

CÂU 3

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.

CÂU 4

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.

CÂU 5

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.

CÂU 6

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.

CÂU 7

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?

- A. Vì trời mưa nên tôi không đi học.
- B. Tôi đi học.
- C. Tôi đi học và bạn tôi đi học.
- D. Tôi đi học hoặc bạn tôi đi học.



CÂU 2

Tác nhân gây cảm lạnh thường gặp nhất là gì?

A. Rhinovirus

B. Adenovirus

C. Influenzavirus

D. Enterovirus



CÂU 3

Đặc điểm quan trọng giúp phân biệt viêm xoang do siêu vi hay vi trùng là gì?

- A. Diễn tiến lâm sàng
- B. X-quang xoang tư thế Blondeau- Hirzt
- C. CT scan xoang
- D. MRI xoang



CÂU 4

Tác nhân nào gây viêm xoang cấp có tỷ lệ kháng Amoxicillin cao nhất?

A. Streptococcus pneumoniae

B. Hemophilus influenzae

C. Streptococcus pyogenes

D. Moraxella catarrhalis

CÂU 6

Bé trai 16 tháng tuổi, 10 kg, đến khám vì ho khan giọng và sốt N3. Mẹ nói cháu ho ông ổng như chó sủa, sốt nhẹ.

Khám thấy bé tỉnh, ăn được, môi hồng khí trời, t° 37,5 độ C, Nhịp thở 38 l/ph, thở co lõm ngực, có tiếng thở rít khi nằm yên, phổi nghe ran ngáy 2 bên.

Phân độ tắc nghẽn hô hấp trên của bệnh nhân này thể nào?

- A. Nhẹ
- B. Trung bình
- C. Nặng
- D. Rất nặng

CÂU 5

Xử trí nào sau đây **KHÔNG** phù hợp cho trẻ 12 tháng bị cảm lạnh?

- A. Vệ sinh nhỏ mũi bằng NaCl 0,9%
- B. Thuốc giảm ho an toàn
- C. Kháng sinh uống Amoxicillin
- D. Cung cấp đủ dịch qua đường uống, tiếp tục bú sữa mẹ

CÂU 7

Bé gái 8 tháng tuổi đến khám vì ho, sổ mũi và sốt nhẹ N4. Mẹ nói cháu bú sữa mẹ tốt, không ọc sau bú.

Khám thấy bé tỉnh, môi hồng khí trời, t° 38 độ C, Nhịp thở 42l/ph, thở không co lõm ngực, phổi không nghe ran, họng đỏ nhẹ.

Tiền căn không ghi nhận bất thường.

Chẩn đoán phù hợp nhất là gì?

- A. Nhiễm virus: ho cảm lạnh
- B. Viêm tiểu phế quản
- C. Trào ngược dạ dày thực quản
- D. Viêm phế quản

CÂU 8

Tác nhân nào ÍT gây viêm phổi ở trẻ 3 tháng tuổi?

A. Vi khuẩn gram âm đường ruột

B. *Moraxella catarrhalis*

C. *Staphylococcus aureus*

D. *Chlamydia trachomatis*

CÂU 9

Những yếu tố nguy cơ của viêm phổi do Klebsiella là gì?

A. Nhiễm trùng da

B. Môi trường đông đúc

C. Sanh non

D. Suy giảm miễn dịch

CÂU 10

Lựa chọn kháng sinh gì đầu tiên để điều trị viêm phổi do *Chlamydomphila pneumoniae*?

A. Macrolide

B. Levofloxacin

C. Oxacillin liều cao

D. Amoxicillin liều cao

CÂU 11

Kháng sinh tĩnh mạch nào ưu tiên để điều trị *Streptococcus pneumoniae* kháng penicillin, với MICs $\geq 4,0 \mu\text{g/mL}$?

- A. Ampicillin liều cao
- B. Ceftriaxone
- C. Clindamycin
- D. Vancomycin

CÂU 12

Kháng sinh nào KHÔNG dùng để điều trị viêm phổi do *Mycoplasma pneumoniae*?

- A.Erythromycin
- B.Azithromycin
- C.Clarithromycin
- D.Clindamycin

CÂU 13

Chỉ định nhập viện do viêm phổi nào KHÔNG đúng?

- A. Có tràn dịch màng phổi
- B. Có vết mặt nhiễm trùng
- C. Nghi do Streptococcus nhóm A
- D. Có co lõm ngực

CÂU 14

Chỉ định nhập viện do viêm phổi nào KHÔNG đúng?

A. Có bệnh tim bẩm sinh đi kèm

B. Có phế phòng cánh mũi

C. Thất bại với cefixim

D. Xquang phổi có hình ảnh đường cong lõm hướng lên trên và vào trong phía rốn phổi, cao nhất ở nách và thấp nhất ở đáy phổi vùng ở phía trước và sau.

CÂU 15

Lựa chọn kháng sinh tĩnh mạch gì đầu tiên để điều trị viêm phổi có suy hô hấp do *Haemophilus influenzae* không phân type?

- A. Ampicillin
- B. Cefotaxim
- C. Ciprofloxacin
- D. Cefpodoxime

CÂU 16

Kháng sinh nào được lựa chọn đầu tiên cho bé 7 tháng bị viêm phổi nặng đã chủng ngừa đủ?

- A. Ampicillin
- B. Azithromycin
- C. Cefotaxim
- D. Ceftriaxone

CÂU 17

Kháng sinh nào được lựa chọn đầu tiên cho bé 7 tuổi đã chủng ngừa đủ bị viêm phổi có hình ảnh thâm nhiễm lưới nốt trên Xquang?

A. Ampicillin

B. Azithromycin

C. Cefotaxim

D. Ciprofloxacin

CÂU 18

CÂU 18

Bé 3 tháng tuổi bị viêm phổi có triệu chứng sốt cao ngày 3 kèm dấu hiệu đầu gật gù lúc khám. Chưa chủng ngừa. Kháng sinh nào được lựa chọn đầu tiên?

A. Ampicillin + Gentamycin

B. Ampicillin

C. Gentamycin

D. Cefotaxim

CÂU 19

Bé 9 tháng bị ho và sốt nhẹ 4 ngày. Lúc khám thấy bé tỉnh, SpO₂ 97%, thở không co lõm, nhịp thở 58 lần/phút, phổi ran ẩm. Xquang có hình ảnh thâm nhiễm xóa bờ tim phải. Bé chưa chủng ngừa đủ.

Kháng sinh nào được lựa chọn đầu tiên?

A. Amoxicillin liều cao

B. Amoxicillin + A. clavulanate

C. Cefotaxim

D. Ampicillin

CÂU 20

Bé 17 tháng bị ho và sốt 37,5 - 38°C 3 ngày. Lúc khám thấy bé tỉnh, thở co lõm ngực nhẹ, nhịp thở 48 lần/phút, phổi ran ẩm. Xquang có hình ảnh thâm nhiễm nốt rải rác không hợp lưu, không hệ thống. Bé chưa chủng ngừa đủ.

Kháng sinh nào được lựa chọn đầu tiên?

A. Penicillin G

B. Macrolide

C. Cephalosporin thế hệ 3

D. Kháng sinh nhóm β -lactam