

MCQ Questions

Câu hỏi

1 Khi nghi ngờ thai có vị trí làm tổ ngoài buồng tử cung, cần thực hiện các khảo sát (1) ngưỡng phân định β -hCG, (2) diễn biến nồng độ β -hCG qua loạt định lượng, (3) hình ảnh học qua siêu âm đường âm đạo. Hãy xác định trình tự ưu tiên khi phải chọn một hay nhiều công cụ trong ba công cụ này?

- A. ☐ (1) rồi (2) rồi (3)
- B. ☐ (1) rồi (3) rồi (2)
- C. ☒ (3) rồi (1) rồi (2)
- D. ☐ (3) rồi (2) rồi (1)

2 Khi dùng diễn biến của nồng độ β -hCG qua loạt định lượng để tiếp cận xuất huyết 3 tháng đầu, cần lưu ý gì?

- A. ☒ Một cách tổng quát, không nên căn cứ đơn thuần trên diễn biến nồng độ β -hCG để có kết luận
- B. ☐ Định lượng β -hCG được xem như tiếp cận đầu tay trong hầu hết các xuất huyết ba tháng đầu
- C. ☐ Nếu không còn nguyên bào nuôi hoạt động, thì nồng độ β -hCG sẽ giảm một cách tuyến tính
- D. ☐ Biến thiên nồng độ β -hCG lệ thuộc chủ yếu vào tính sinh tồn của

Thời gian còn lại

0:9:9



Số báo danh
20190511_2239

SUBMIT

IF AT			
C1	X	X	★
C2	★	B	C
C3	X	X	★
C4	X	★	C
C5	★	B	C
C6	X	X	X
C7	X	★	C
C8	X	X	★
C9	X	X	X
C10	X	X	X
SCORE:1			

khối tế bào trong (ICM)

3 Khi dùng khái niệm ngưỡng phân định β -hCG, làm cách nào để tăng giá trị dự báo dương (Positive Predictive Value) có thai ngoài tử cung?

A. ● Khi dùng khái niệm ngưỡng phân định β -hCG, nên hiệu chỉnh cut-off xuống thấp hơn nếu biết tuổi thai nhỏ

B. ● Khi dùng khái niệm ngưỡng phân định β -hCG, nên hiệu chỉnh cut-off lên cao hơn nếu biết tuổi thai nhỏ

C. ● Khi dùng khái niệm ngưỡng phân định β -hCG, nếu set cut-off lên ở mức cao hơn thì PPV sẽ tăng lên

D. ● Khi dùng khái niệm ngưỡng phân định β -hCG, nếu set cut-off xuống thấp đi thì PPV sẽ tăng lên

	IF AT		
C1	X	X	★
C2	★	B	C
C3	X	X	★
C4	X	★	C
C5	★	B	C
C6	X	X	X
C7	X	★	C
C8	X	X	★
C9	X	X	X
C10	X	X	X
SCORE:1			

4 Nguyên nhân nào là nguyên nhân thường thấy nhất của thai nghén thất bại sớm?

A. ● Bất thường trong vật chất di truyền của cha hoặc của mẹ

B. ● Bất thường trong vật chất di truyền của chính phôi thai

C. ● Bất thường về đáp ứng dung nạp miễn dịch của mẹ

D. ● Bất thường về transcriptome

của nội mạc tử cung

5 Thuật ngữ “thai không xác định vị trí” (Pregnancy of Unknown Location) đồng nghĩa với cụm từ nào dưới đây?

- A.** ☒ PUL không có từ đồng nghĩa
- B.** ☐ Nghi thai ngoài tử cung
- C.** ☐ Theo dõi thai ngoài tử cung
- D.** ☐ Có biểu hiện sinh hóa của thai

6 Định tuổi thai theo chiều dài đầu mông sẽ có độ tin cậy cao trong tình huống nào?

- A.** ☐ Khi số đo CRL dưới 84 mm
- B.** ☐ Khi số đo CRL trên 10 mm
- C.** ☒ Khi tuổi thai ≤ 13 tuần + 6 ngày
- D.** ☐ Cả 3, và kèm điều kiện cụ thể

7 Hành động nào cung cấp nhiều thông tin hữu ích nhất để ra quyết định cho quản lý thai nghén thất bại sớm?

- A.** ☐ Theo dõi diễn biến lâm sàng của triệu chứng ra huyết âm đạo và đau bụng
- B.** ☒ Theo dõi tiến triển của các đặc điểm siêu âm qua loạt siêu âm ngả âm đạo
- C.** ☐ Theo dõi diễn biến của nồng độ β -hCG huyết thanh qua loạt định lượng

IF AT			
C1	X	X	★
C2	★	B	C
C3	X	X	★
C4	X	★	C
C5	★	B	C
C6	X	X	X
C7	X	★	C
C8	X	X	★
C9	X	X	X
C10	X	X	X
SCORE:1			

D. ● So sánh các đặc điểm thấy được qua siêu âm với nồng độ β -hCG lúc đó

8 Trong các yếu tố được liệt kê sau, thai ngoài tử cung liên quan mạnh nhất với yếu tố nguy cơ nào?

A. ● Đang tránh thai thường trực bằng thuốc chỉ chứa progestin

B. ● Đang tránh thai bằng đặt dụng cụ tử cung phóng thích Cu^{++}

C. ● Tiền sử từng có viêm vùng chậu do *Chlamydia trachomatis*

D. ● Cả ba cùng là các yếu tố thuận lợi của thai ngoài tử cung

9 Để theo dõi sau sảy một thai thường (không phải thai trứng), mà lâm sàng cho phép nghĩ là sảy trọn, thông tin nào là cần thiết và hữu ích nhất?

A. ● Kết quả mô bệnh học của sản phẩm thụ thai đã bị tổng xuất

B. ● Diễn biến của hình ảnh siêu âm qua những lần khám kế tiếp

C. ● Diễn biến của nồng độ β -hCG huyết thanh qua các lần khám

D. ● Diễn biến lâm sàng của ra huyết âm đạo qua các lần khám

10 Theo dõi hậu thai trứng, hCG đã về âm tính, đột ngột dương tính trở lại.

IF AT			
C1	X	X	★
C2	★	B	C
C3	X	X	★
C4	X	★	C
C5	★	B	C
C6	X	X	X
C7	X	★	C
C8	X	X	★
C9	X	X	X
C10	X	X	X
SCORE:1			

Làm gì trước tiên?

- A.** ☐ Đặt mỏ vịt tìm di căn âm đạo của choriocarcinoma
- B.** ☐ X-quang phổi tìm di căn phổi của choriocarcinoma
- C.** ☐ MRI sọ não tìm di căn não của choriocarcinoma
- D.** ☒ Siêu âm phụ khoa tìm sự hiện diện của thai kỳ mới

	IF AT		
C1	X	X	★
C2	★	B	C
C3	X	X	★
C4	X	★	C
C5	★	B	C
C6	X	X	X
C7	X	★	C
C8	X	X	★
C9	X	X	X
C10	X	X	X
SCORE:1			