- 5. Trẻ mắc hội chứng Prader-Willi có các đặc điểm nào sau đây? * (1 Point)
 - Tăng trương lực cơ 2 chi dưới
 - Giảm trương lực cơ 2 chi dưới
 - Tăng trương lực cơ tứ chi
 - O Giảm trương lực cơ tứ chi

6. Hãy chọn câu ĐÚNG nhất. Bệnh lý nào sau đây có thể là nguyên nhân của rối loạn phát triển hành vi?

*

(1 Point)

- Viêm cầu thận
- Viêm não
- Viêm dạ dày ruột

Viêm phổi

- 7. Chẩn đoán về <mark>rối loạn phát triển hành vi</mark> bao gồm thành phần nào sau đây? * (1 Point)
 - Chẩn đoán mô tả về rối loạn phát triển hành vi
 - Chẩn đoán nguyên nhân
 - Chẩn đoán mức độ
 - Tất cả đều đúng

- 8. Trong các rối loạn được liệt kê sau đây, rối loạn nào thường gặp nhất? * (1 Point)
 - Rối loạn ngôn ngữ
 - Kém khả năng học tập

Tăng	đông	giảm	chú	ý
	.)	_		

Chậm phát triển tâm thần

 Trong các rối loạn được liệt kê sau đây, rối loạn nào ít gặp nhất? * (1 Point)



Suy giảm thị lực

Bại não ? theo bảng nào

Tự kỷ

Bảng 48.1. Tỉ lệ mắc một số rối loạn phát triển – hành vị thường gặp ở trẻ em [1],[3]

Rối loạn	Tỉ lệ phần trăm (%)	
Các vấn đề về <mark>ngôn ngữ</mark>	17,5 (trẻ 30-36 tháng)	
Kém khả năng học tập	6,5	
ADHD	7,8	
Chậm phát triển tâm thần	1,2	
Tự kỷ	0,6-1,1	
Bại não và các rối loạn phát triển vận động khác	0,23	
Suy giảm thính lực	0,12	
Suy giảm thị lực	0,8	

thính lực -> bại não -> tự kỷ, thị lực

10. Câu nào sau đây SAI? *
 (1 Point)

Quá trình phát triển của trẻ có tính chất gián đoạn Tốc độ phát triển không đều

- Dấu cờ đỏ là các mốc thời gian báo động
- Rối loạn phát triển chỉ bao gồm rối loạn về tâm lý và tâm thần kinh
- Dộ trưởng thành hệ thần kinh ở trẻ tương quan thuận với thời gian

- 11. Câu nào sau đây ĐÚNG? *
 (1 Point)
 - Phân ly phát triển là trẻ đạt được mốc phát triển khó trước khi đạt được những mốc đơn giản hơn Chênh phát triển
 - Chênh phát triển là trẻ có khác biệt đáng kể giữa hai lĩnh vực phát triển
 - Chậm phát triển là khi mức khảo sát kỹ năng của trẻ dưới 1 độ lệch chuẩn so với tuổi thực
 - Sự phát triển là quá trình học hỏi và hoàn thiện kỹ năng liên tục

12. Dùng tình huống sau để trả lời các câu hỏi từ 13 đến 21.

4 tuổi

Bé trai 48 tháng, đến khám vì cô giáo yêu cầu đi khám (trẻ chậm nói, không giao tiếp được với các ban khác).

Bé đi trẻ được 1 tuần. Cô giáo nhân thấy trẻ châm nói hơn các bé khác trong lớp. Ngoài ra bé ít chơi với các bạn trong lớp. Khi các bạn học, bé không học cùng các bạn. Thay vào đó, bé thường bỏ ra ngoài ngồi một mình. Khi cô giáo gọi bé vào lớp, bé gầm gừ và bỏ chay. Bé sống cùng bố, mẹ, và một người chị 6 tuổi, chưa nhập viện lần nào. Bé được chủng ngừa theo lịch TCMR, bác sĩ không báo bất thường gì trong những lần khám chủng ngừa. Hiện bé đi mẫu giáo được khoảng 1 tuần, bé nói được khoảng 50 từ đơn (ba, chó, cơm), không nói được từ đôi. Nói từ đôi: 2 tuổi

Bs khám ghi nhận: Bé tỉnh, không tiếp xúc mắt, da niêm hồng hào. CN: 18 kg, CC: 100 cm. Sinh hiệu: không sốt, M: 108 lần/phút; HA: 90/60 mmHg; nhịp thở: 24 lần/phút. Tim đều rõ, không gallop. Phối trong, phế âm đều 2 bên, không ran. Bụng mềm, gan lách không to. Không dấu thần kinh định vị. Hệ tiết niệu, sinh dục bình thường. Bé chạy vững, thích leo trèo. 2t chạy vững

Hành vị lặp lại Bé thích chơi với nước: bé mở vòi nước lên cho nước chảy liên tục. Khi vòi nước bật, bé đứng nhìn và vỗ tay liên tục. Khi bác sĩ tắt vòi nước đi, bé lại tiếp tục mở vòi nước lên và nhìn xem nước chảy và vỗ tay. Ngoài ra, bé không hứng thú với bất kỳ đồ chơi nào khác Khi không được đáp ứng về việc mở vòi nước, bé đòi đi về. Tuy nhiên, bé không nói, bé chỉ nắm tay mẹ và kéo mẹ đi về phía cửa ra vào. Khi không mở được cửa ra vào, bé leo lên cửa số và trèo ra ngoài.

13. Chỉ số DQ về ngôn ngữ của bé là bao nhiêu? * (1 Point)

Trẻ nói được 50 từ đơn -> 24 tháng (ít nhất 50 từ) -> 50%

- 100%
- 75%
- 50%
- 25%

hiểu đc 50 từ: 12 tháng nói được 50 từ: 24 tháng

14. Bé có hiện tượng nào sau đây? * (1 Point)

Phân ly: khác biệt đáng kể giữa 2 lĩnh vực phát triển với 1 lĩnh vực chậm hơn rõ rệt.

Chênh phát triển: Khi xét trong cùng 1 lĩnh vực phát triển, trẻ đạt các mốc phát triển khó trước khi đạt các mốc đơn giản hơn.

- Phân ly phát triển Ngôn ngữ và tiếp xúc xã hội chậm -> ngôn ngữ đặc biệt chậm
- Chênh phát triển
- Cả 2 câu trên đều đúng
- Cả 2 câu trên đều sai

- 15. Hành đông vỗ tay liên tục của bé được gọi là gì? * (1 Point)
 - A. Hành vi chống đối

Hành vi định hình: động tác lặp đi lặp lại, không đổi Hành vị chống đối: hành vị tiêu cực, thách thức, thù địch, chống đối

- B. Hành vi định hình
- C. Cả 2 câu đều đúng
- D. Cả 2 câu trên đều sai

16. Việc "Khi các bạn học, bé không học cùng các bạn. Thay vào đó, bé thường bỏ ra ngoài ngồi một mình" là biểu hiện của vấn đề nào sau đây?

(1 Point)

*

này là biểu hiện thích một mình -> A

Chon A. Khó khăn về đọc và học tập thì phải biết nói từ nhưng đọc không hiểu

A. Kỹ năng xã hội không thích hợp.

Phân vân A và C

B. Trẻ có khó khăn về đọc và học tập

✓ Phương hại về tương tác xã hội

✓ Hành vi bị hạn chế, lập đi lập lại

✓ Phương hại về giao tiếp

- C. Cả 2 câu đều đúng
- D. Cả 2 câu trên đều sai

- 17. Trẻ có khả năng mắc rối loạn nào sau đây? *(1 Point)• Tam chứng
 - A. Bại não
 - B. Suy giảm thính lực
 - C. Các vấn đề về ngôn ngữ
 - D. Tự kỷ

Không giao tiếp bằng mắt, hành vi định hình, không giao tiếp xã hội

????

- 18. Các xét nghiệm nào cần làm để tìm nguyên nhân? * (1 Point)
 - A. Đo thính lực

- → B. XQuang so
- C. Điện cơ
- D. Di truyền học

- 19. Các xét nghiệm nào sau đây KHÔNG cần thiết phải làm để tìm nguyên nhân? * (1 Point)
 - A. MRI sọ não Tìm tổn thương thực thể
 - B. Di truyền học
 - C. Điện não
 - D. Điện cơ Leo trèo bình thường

20. Hãy chọn câu ĐÚNG nhất. Các phương pháp nào có thể giúp trẻ? * (1 Point)

\bigcup	A.	Can	thiệp sớm
	B.	Giáo	dục chuyên biệt
	C.	Vận	động trị liệu

<3t: can thiệp sớm >3t: giáo dục chuyên biệt

Phân vân giữa B và C

O. Không có phương pháp nào có thể giúp trẻ

21. Tiên lượng lâu dài ở trẻ này như thế nào? * (1 Point)

bé này DQ = 50% -> chậm nặng chứ k phải chậm nhẹ nên k phải tiên lượng từ xấu đến tốt

- A. Có khoảng phát triển từ xấu đến tốt
- B. Chậm phát triển ngôn ngữ

A hoặc D????

- O. Chậm phát triển nhận thức
- D. Sa sút trí tuệ

Trang 268: trẻ tuổi răng sữa (1-6t) bị chậm phát triển toàn thể gia tăng rõ rệt nguy cơ sa sút trí tuệ khi lớn lên

22. Dùng tình huống sau để trả lời các câu hỏi từ 23 đến 26

3 tuć

Bệnh nhân nữ, 36 tháng, đến khám vì chậm nói.

Mẹ đưa trẻ đến khám vì nhận thấy trẻ chậm biết nói hơn các anh chị em trong nhà. Cách nhập viện 06 ngày có cho trẻ đi khám bác sĩ tư được chẩn đoán chậm phát triển: mẹ lo lắng đưa trẻ đến khám tại Nhi Đồng 1.

Tiền căn: Trẻ sống cùng bố, mẹ, và một người chị 7 tuổi. Trẻ bị viêm màng não lúc 12 ngày tuổi. Chủng ngừa theo lịch TCMR. Hiện trẻ nói được khoảng 30 từ đơn, nói được vài từ đôi. DQ=66% Khám: Trẻ tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng hào. CN: 14,5kg, CC: 96 cm. Sinh hiệu: không sốt, M: 108 lần/phút; HA: 90/60 mmHg; nhịp thở: 30 lần/phút. Tim đều rõ, không gallop. Phổi trong, phế âm đều 2 bên, không ran. Bụng mềm, gan lách không to. Hệ tiết niệu, sinh dục bình thường. Trẻ đi vững, chạy yếu, hay vấp té

2t là chay vững DQ=66%

23. Chỉ số DQ về ngôn ngữ của trẻ là bao nhiêu? * (1 Point)

Trẻ nói được 30 từ đơn, nói được vài từ đôi -> 2 tuổi (theo quy tắc số 4)/ 24 tháng -> 66.7%

A. 38,9%

○ B. 50%

C. 66,7%

D. 83,3%

24. Chỉ số DQ về vận động của trẻ là bao nhiêu? *

(1 Point)

Trẻ đi vững chạy yếu hay vấp té

-> > 18 tháng

->> 50%

A. 38,9-50%



B. 50-66,7%

2t mà chưa chạy vững => DQ <24/36=66%

- C. 66,67-83,3%
- D. 38,9-83,3%

- 25. Trẻ có hiện tượng nào sau đây? * (1 Point)
 - A. Phân ly phát triển
 - B. Chênh phát triển
 - C. Chậm phát triển toàn thể
 - O. Tất cả đều đúng

- 26. Trẻ có rối loạn nào sau đây? * (1 Point)
 - A. Tự kỷ
 - B. Các vấn đề về ngôn ngữ
 - O. Chậm phát triển tâm thần
 - O. Bại não

Submit

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies | Terms of use