

ĐỀ NGOẠI NIỆU YHDP 2018-2019

Câu 1: Carcinom in situ ở bàng quang thường có triệu chứng gì nhất?

- ☒ A. Tiểu máu
- B. Triệu chứng kích thích như viêm bàng quang
- C. Sụt cân
- D. Suy thận
- E. Tất cả đều đúng

Tiểu máu: 85-90% trường hợp
- Bàng quang kích thích: tiểu gắt, tiểu gấp: 20%
- NT tiết niệu thứ phát 30%: tránh bỏ sót

Câu 2: Ngoài ung thư tiền liệt tuyến, PSA còn có thể tăng trong:

- A. Bướu lành tiền liệt tuyến
- B. Viêm tiền liệt tuyến
- C. Sau giao hợp hay sau khi thăm khám tiền liệt tuyến
- ☒ D. Tất cả đều đúng
- E. Tất cả đều sai

Câu 3: Tinh hoàn ẩn (cryptorchidism) là:

- A. Tinh hoàn không xuống bìu (undescended testis, testicular maldescent)
- B. Tinh hoàn ẩn dạng lâm sàng trong ống bẹn
- C. Tinh hoàn ẩn dạng lâm sàng trong ổ bụng
- ☒ D. A, B, C đúng
- E. A, B, C sai

Câu 4: Vị trí hẹp tự nhiên của niệu đạo không phải là vị trí nào sau đây

- ☒ A. Chỗ bắt chéo động mạch sinh dục
- B. Khúc nối bẹn thận niệu quản
- C. Đoạn niệu quản nội thành
- D. Chỗ bắt chéo bó mạch chậu
- E. Tất cả vị trí trên đều đúng

3 chỗ hẹp: khúc nối bể thận niệu quản - bắt chéo đm chậu, trong thành bàng quang

Câu 5: Nói về sỏi tiền liệt tuyến, chọn câu đúng:

- A. Nguyên nhân là do sỏi từ bàng quang rơi xuống
- B. Thường có triệu chứng rõ rệt
- ☒ C. Là sỏi phát triển trong nhu mô tuyến tiền liệt
- D. Là nguyên nhân chủ yếu gây rối loạn chức năng đường tiểu dưới (LUTS)
- E. Thường gặp ở người trẻ

Câu 6: Khoảng 10% nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới có triệu chứng ở phụ nữ trẻ ở lứa tuổi hoạt động tình dục gây ra bởi:

- A. Pseudomonas
- B. Staphylococcus epidermidis
- C. Proteus mirabilis

D. Escherichia coli

☒ E. Staphylococcus saprophyticus

70-85 là ecoli

10-20 là stap. sapro

Câu 7: Tỷ lệ sỏi nhỏ hơn 4mm vượt qua niệu quản tự nhiên là:

A. 70%

☒ B. >90%

C. 80%

D. 99%

E. <50%

Câu 8: Chẩn đoán suy thận do ung thư cổ tử cung dựa vào:

A. Tăng ure và creatinin huyết thanh

☒ B. Vô niệu, khám âm đạo ghi nhận cổ tử cung sưng cứng xâm lấn chu cung, tăng creatinin huyết thanh, siêu âm ghi nhận 2 thận ứ nước

C. Tiền căn ung thư cổ tử cung, hoặc thăm khám âm đạo thấy bướu cổ tử cung

D. Vô niệu

E. Siêu âm thấy hai thận đều ứ nước

Câu 9: Tăng sinh TLT các phương pháp điều trị hiện nay gồm:

A. Nội khoa, ngoại khoa, hóa trị

B. Nội khoa, ngoại khoa

C. Chỉ có ngoại khoa

D. Nội khoa, ngoại khoa, hóa trị, xạ trị, hóa miễn dịch liệu pháp

E. Nội khoa, ngoại khoa, hóa trị, xạ trị

Câu 10: Khẳng định nào sau đây về thang điểm IPSS là đúng:

A. Triệu chứng được gọi là nghiêm trọng khi IPSS từ 10-20 điểm

B. Điểm số IPSS chỉ ra triệu chứng tắc nghẽn và các vấn đề tiểu không kiểm soát

C. Điểm số IPSS đã được dịch và phổ biến trong nhiều ngôn ngữ

D. Bác sĩ và y tá có thể điền vào điểm số IPSS cho bệnh nhân của họ sau khi tham khảo ý kiến bệnh nhân

E. Tất cả sai

Câu 11: Bệnh nhân nam, 32 tuổi nhập viện vì đau quặn hông phải, không sốt. KUB sỏi niệu quản chậu, trên siêu âm sỏi kích thước 1.5 cm. Theo anh chị phương pháp nào thích hợp cho bệnh nhân?

A. Mở mổ lấy sỏi

☒ B. Nội soi niệu quản tán sỏi

C. Tán sỏi ngoài cơ thể

D. Lấy sỏi qua da

E. Nội soi sau phúc mạc lấy sỏi

Tán sỏi ngoài cơ thể: sỏi đài bể thận, sỏi niệu quản đoạn lưng <2cm (có thể chỉ định sỏi niệu quản đoạn chậu nhưng kết quả thành công thấp hơn nội soi tán sỏi ngược chiều

URS(nội soi tán sỏi ngược chiều): chỉ định cho sỏi đơn độc hoặc 2 viên sỏi, đường kính 7 - 15mm
tỷ lệ thành công sỏi NQ đoạn chậu là 98 - 99%

Câu 12: Sỏi niệu cản quang chiếm tỉ lệ:

A. 75%

B. 80%

C. 10%

D. 50%

☒ E. 90%

Câu 13: K tình hoàn thường cho di căn hạch nhiều nhất: đã check, sure C

A. Hạch thượng đòn trái

B. Hạch rốn thận

☒ C. Hạch dọc động mạch chủ

D. Hạch bẹn

E. Hạch chậu bịt

Câu 14: Khám một bệnh nhân mới bị chấn thương niệu đạo sau, sẽ ghi nhận được:

A. Không có cầu bàng quang

B. Thăm trực tràng tuyến tiền liệt bình thường

C. Màng máu hình cánh bướm ở tầng sinh môn lan xuống bìu

D. Có biểu hiện choáng nhiễm trùng nhiễm độc

☒ E. Có thể có chảy máu ở miệng niệu đạo

Câu 15: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành sỏi là:

A. Địa dư khí hậu, ăn uống, lao động nặng, bẩm sinh

B. Ăn uống, di truyền, lao động nặng, khí hậu

C. Lao động nặng, bẩm sinh, di truyền, nghề nghiệp

☒ D. Địa dư khí hậu, di truyền, ăn uống, nghề nghiệp

E. Ăn uống, lao động nặng, nghề nghiệp, bẩm sinh

Câu 16: BN 90 tuổi, K TLT giai đoạn T1aN0M0, hướng xử trí thế nào

A. Cắt TLT toàn phần

☒ B. Không làm gì hết, theo dõi

C. Xạ trị

D. Chụp XQ phổi mỗi 3 tháng

E. Điều trị bằng nội tiết tố

Câu 17: Nguyên nhân nào thường gặp của sỏi bàng quang ở người lớn:

A. Sỏi từ đường tiểu trên

☒ B. Bể tắc đường tiết niệu dưới

C. Dị tật bẩm sinh đường tiết niệu

D. Nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại

E. Tất cả sai

nam giới bể tắc đường tiểu
còn trẻ em: các nước kém phát triển

Câu 18: BN nữ, 38 tuổi, đến khám vì đau hông lưng trái, đang điều trị gout. siêu âm ghi nhận hình ảnh thận trái ứ nước độ II, KUB không thấy sỏi. CT Scan ghi nhận có sỏi niệu quản đoạn lưng kích thước 1,5*1 cm. trong trường hợp này sỏi có thể là:

A. Oxalate calci

B. Carbonate calci

C. Phosphate calci

☒ D. Sỏi urat

E. Tất cả sai

Câu 19: Đặc điểm của niệu đạo trước KHÔNG là:

- A. Niệu đạo trước có vật xốp bao bọc nên ra nhiều máu khi bị chấn thương
- B. Sau chấn thương, phần niệu đạo bị dập và vỡ sẽ biến thành tổ chức xơ gây hẹp niệu đạo
- C. Niệu đạo dương vật là phần di động nên ít khi bị chấn thương
- D. Niệu đạo trước là một thành phần cương của dương vật
- ☒ E. Niệu đạo trước nằm phía trước bìu, niệu đạo sau nằm phía sau bìu.

Câu 20: Những triệu chứng nào dưới đây không thuộc nhóm triệu chứng tắc nghẽn do tăng sinh tiền liệt tuyến:

- A. Tiểu khó
- ☒ B. Tiểu đêm
- C. Ngưng tiểu giữa dòng
- D. Tiểu ngập ngừng
- ☒ E. Tiểu gấp

Triệu chứng tắc nghẽn: biểu hiện bằng đái khó, đái nhỏ giọt, ngập ngừng, gián đoạn, tia nhỏ và yếu, có cảm giác đái không hết, bí đái.

- Triệu chứng kích thích: biểu hiện bằng đái gấp, đái đêm, đái rỉ, không nhịn tiểu được.
(sách bệnh học niệu)

Câu 21: Nội tiết tố nào kích thích sự phát triển của ung thư tiền liệt tuyến (carcinoma tuyến):

- ☒ A. Androgen
- B. Estrogen
- C. Cả 2 loại
- D. Không có loại nào
- E. Progesteron

Câu 22: Hậu quả lâu dài của nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát đơn thuần là:

- A. THA
- B. Ngược dòng BQ_NQ
- C. Sẹo thận
- D. Tăng ure máu
- E. Không đáng kể

Câu 23: Sỏi nào sau đây là sỏi không cản quang

- A. Sỏi calci
- B. Sỏi cystin
- C. Sỏi magie
- D. Sỏi phosphate
- ☒ E. Tất cả sai

Câu 24: Nạo hạch chậu bịt 2 bên trong K TLT nhằm mục đích:

- A. Giảm tỉ lệ tái phát
- B. Cải thiện khả năng sống còn
- ☒ C. Định giai đoạn và trị liệu
- D. A, B đúng
- E. Tất cả sai

Câu 25:

Câu 26: Các chất ức chế hình thành sỏi niệu trong nước tiểu:

- A. Pyrophosphate, Oxalate, Magné, kẽm
- ☒ B. Pyrophosphate, Citrate, Magné, kẽm
- C. Citrate, Oxalate, Magné
- D. Oxalate, kẽm, Pyrophosphate
- E. Tất cả đều sai

Câu 27: Ung thư cổ tử cung gây suy thận do:

- A. Ung thư giai đoạn 4 xâm lấn vào hai niệu quản
- B. Hạch vàng chậu chèn ép hai niệu quản
- C. Xơ hóa sau phúc mạc sau xạ trị chèn ép hai niệu quản
- ☒ D. Tất cả câu trên đều đúng
- E. Tất cả câu trên đều sai

Câu 28: Xét nghiệm có giá trị nhất để chẩn đoán có tình trạng bế tắc sau thận là:

- A. CT scan thấy thận ứ nước
- B. Siêu âm thấy thận ứ nước
- C. UIV thấy thận cầm
- D. Chụp đồng vị phóng xạ thận dùng chất mang DTPA có tiêm thuốc Lasix
- ☒ E. Chụp đồng vị phóng xạ thận dùng chất mang DMSA có tiêm thuốc Lasix

Câu 29: Triệu chứng thường thấy của ung thư tinh hoàn là:

- ☒ A. Bìu to
- B. Xuất tinh máu
- C. Nhũ hóa (Gynecomastia)
- D. Hạch bẹn to
- E. Đau ở bìu

Câu 30: Tinh hoàn ản là yếu tố nguy cơ gây tăng tỉ lệ K tinh hoàn lên

- A. 4 lần
- ☒ B. 10-15 lần
- C. Không thay đổi tỉ lệ nguy cơ
- D. 8 lần
- E. 2 lần

Câu 31: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, chọn câu SAI:

- A. Bệnh lành tính của tuyến tiền liệt
- ☒ B. Cần chỉ định cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt nếu kích thước tuyến tiền liệt >80 ml
- C. Có thể kèm theo ung thư tuyến tiền liệt
- D. Bướu lành tính tuyến và ung thư tuyến tiền liệt khác nhau hoàn toàn về điều trị học
- E. Triệu chứng đường tiết niệu dưới đôi khi không tương quan với kích thước tuyến tiền liệt

Câu 32: Trên BN ứ nước nhiễm trùng, vấn đề quan trọng nhất thường gặp là

- A. Mô mỡ lấy sỏi niệu quản
- B. Nội soi tán sỏi sớm

- C. Bổ sung kháng sinh
- ☒ D. Thực hiện dẫn lưu và kháng sinh
- E. Thực hiện dẫn lưu

Câu 33: Biến chứng có thể gặp của tăng sinh TLT, ngoại trừ:

- A. Nhiễm khuẩn niệu
- B. Ngược dòng BQ-NQ
- C. Suy thận
- D. Tiểu máu
- E. Tiểu đường thấp

Câu 34: Loại tế bào thường gặp trong bướu bàng quang là

- A. Tế bào vảy
- ☒ B. Tế bào chuyển tiếp
- C. Tế bào tuyến
- D. Tế bào nhỏ
- E. Tế bào mầm tinh

Câu 35: Nam 65 tuổi, ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn T2N0M0, Gleason 7 (4+3), điều trị:

- A. Nội tiết trị liệu + xạ trị
- ☒ B. Cắt tiền liệt tuyến tận gốc
- C. Cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến
- D. Cắt hai tinh hoàn đơn thuần
- E. Nội tiết trị liệu

Câu 36: ???? bướu hình thành ở tinh hoàn có nguồn gốc:

- A. Thuộc loại carcinoma
- B. Thuộc loại sarcom
- C. A và B đều sai
- ☒ D. A và B đều đúng
- E. Là loại bướu lành tính

Câu 37:

Câu 38: Nguyên nhân của vết thương thể hang thường gặp nhất:

- A. Do chó cắn, lợn cắn
- B. Do hỏa khí
- C. Bị người khác cắn
- ☒ D. Tai nạn sinh hoạt
- E. Tai nạn giao thông

Câu 39: Sỏi thận thường kèm theo NTT hay gặp nhất là:

- A. Tất cả đúng
- ☒ B. PAM
- C. Phosphate calci

- D. Carbonate calci
- E. Oxalate calci

Câu 40: Đặc điểm của niệu đạo sau, KHÔNG là:

- A. Niệu đạo màng mỏng nên dễ bị vỡ khi bị chấn thương
- ☒ B. Phần niệu đạo đi từ phía sau búi cho đến bàng quang
- C. Niệu đạo màng bám chặt vào cân đáy chậu giữa
- D. Gồm có niệu đạo màng và niệu đạo tiền liệt tuyến
- E. Vùng có các cơ thắt bao bọc

Câu 41: Choáng nhiễm khuẩn niệu thường do tác nhân:

- A. Cầu trùng gram âm
- B. Vi khuẩn yếm khí
- C. Cầu trùng gram dương
- D. Trùng gram dương
- ☒ E. Trùng gram âm

Câu 42: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, về đánh giá triệu chứng cơ năng, người ta thường nhắc tới:

- A. LUTS (lower urinary symptom): triệu chứng đường tiết niệu dưới
- B. IPSS (international Prostatic Score): Bảng đánh giá triệu chứng tiền liệt tuyến
- C. QoL (quality of life): chất lượng cuộc sống
- D. Triệu chứng gây khó chịu (bothersomeness)
- ☒ E. Tất cả câu trên đều đúng



Câu 43: Trong thận ứ nước nhiễm trùng, cấy nước tiểu – KSD khi nào cho kết quả chính xác nhất:

- A. Ngay sau đặt dẫn lưu giải áp
- B. Sau khi dùng kháng sinh
- C. Lúc mới nhập viện
- D. Sau ngưng kháng sinh 3-5 ngày
- E. Trước khi dùng kháng sinh

Câu 44: Sỏi đường tiết niệu đứng hàng thứ ba sau các bệnh lý:

- A. Nhiễm trùng tiểu và chấn thương thận
- B. Nhiễm trùng tiểu và bướu thận
- ☒ C. Nhiễm trùng tiểu và các bệnh lý tuyến tiền liệt
- D. Nhiễm trùng tiểu và chấn thương đường tiểu dưới
- E. Nhiễm trùng tiểu và bệnh bẩm sinh đường tiểu

Câu 45: Trong ung thư tinh hoàn, nạo hạch:

- A. Có thể tăng khả năng sống còn
- B. Có thể giảm tái phát
- C. Có thể xác định giai đoạn
- ☒ D. Tất cả đều đúng
- E. A, B đúng

Câu 46: Nguyên nhân của vỡ niệu đạo sau là:

- A. Do đặt thông để lâu trong niệu đạo
- ☒ B. Tổn thương trong gãy xương chậu do chấn thương
- C. Là biến chứng của cắt đốt nội soi
- D. Té ngồi xoạc chân trên một vật cứng
- E. Cho thông vào niệu đạo, ống thông lạc đường

Câu 47: Khi thăm khám và làm siêu âm phát hiện một khối đặc ở tinh hoàn một bệnh nhân, anh chị sẽ làm:

- A. Mở bìu sinh thiết
- B. Xét nghiệm các chất chỉ điểm bướu, và các xét nghiệm hình ảnh học
- C. Cắt tinh hoàn bệnh ngã bẹn không cần làm giải phẫu bệnh trước
- ☒ D. B và C đúng
- E. Tất cả đều đúng

Câu 48: Chọn câu SAI: ung thư bàng quang không xâm lấn cơ, yếu tố tiên lượng tái phát bao gồm:

- A. Hiện diện carcinoma in situ
- B. Độ mô học của bướu
- C. Số lượng bướu
- ☒ D. Phẫu thuật viên lúc nội soi cắt đốt bướu, đánh giá nghi ngờ còn sót bướu
- E. Kích thước bướu

Câu 49: K TLT thường gặp ở vị trí:

- A. Vùng chuyển tiếp
- B. Tỷ lệ các vùng bị K TLT là như nhau
- C. Vùng cổ TLT
- D. Vùng trung tâm TLT
- ☒ E. Vùng ngoại vi TLT

Câu 50: Bệnh nhân bị suy thận do sỏi niệu có thể tử vong do:

- A. Kiềm chuyển hóa do không thải được H^+ qua nước tiểu
- B. Do ứ đọng azote trong máu
- C. Ngộ độc tim do tăng ure máu
- D. Phù phổi cấp
- E. Phù, hạ natri máu

Câu 51: Bệnh nhân 65 tuổi, đã được chẩn đoán tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt gây bí tiểu nhiều lần dù đã điều trị nội khoa trước đó. Siêu âm ghi nhận thể tích tuyến tiền liệt là 60 ml thì điều trị nào sau đây là thích hợp:

- A. Mở mổ bóc bướu tuyến tiền liệt
- B. Thuốc ức chế men 5 alpha reductase
- C. Thuốc ức chế alpha
- ☒ D. Cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo
- E. Thuốc lợi tiểu

Câu 52: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì đau hông lưng bên trái kèm sốt 39°C. Kết quả chụp hình cắt lớp CT scan thấy thận Trái ứ nước độ III kèm sỏi bể thận 29mm. Công thức máu thấy bạch cầu 15.000/ μ L, tổng phân tích nước tiểu có bạch cầu 250 BC/ μ L, nitrit (+). Xử trí tiếp theo:

- A. Dẫn lưu để giải áp thận
- B. Mở mổ lấy sỏi ngay
- ☒ C. Cấy nước tiểu, cấy máu/ kháng sinh đồ, hạ sốt, kháng sinh và chuyển lưu nước tiểu sớm
- D. Uống nhiều nước
- E. Kháng sinh + Giảm đau

Câu 53: Bướu tinh hoàn thuộc loại mầm sinh:

- ☒ A. Nhảy xạ trị và hóa trị
- B. Không xác định được
- C. Chỉ nhảy với xạ trị
- D. Chỉ nhảy với hóa trị
- E. Kháng xạ trị lẫn hóa trị

Câu 54: Triệu chứng chính của lao niệu- sinh dục:

- A. Cấy nước tiểu vô khuẩn trong môi trường thường
- B. Tiểu nhiều lần
- C. Tiểu mủ vô khuẩn
- D. Tiểu máu đại thể hoặc vi thể
- ☒ E. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 55: Triệu chứng thường gặp nhất của bướu bàng quang là:

- A. Khối u hạ vị
- B. Phù 2 chân
- ☒ C. Tiểu máu
- D. Tiểu lát nhất
- E. Tất cả đều đúng

Câu 56: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có chỉ định điều trị ngoại khoa khi:

- A. Bệnh nhân có triệu chứng bí tiểu
- B. Bệnh nhân có triệu chứng tiểu máu
- C. Bệnh nhân có sỏi bàng quang
- D. Bệnh nhân có sỏi niệu đạo
- ☒ E. Tuyến tiền liệt có kích thước rất lớn

Câu 57: Loại tế bào thường gặp trong bướu bàng quang là:

- A. Tế bào vảy
- ☒ B. Tế bào chuyển tiếp
- C. Tế bào tuyến
- D. Tế bào nhỏ
- E. Tế bào mầm tinh

Câu 58: Hình ảnh bàng quang trong lao niệu – sinh dục:

- A. Bàng quang chống đối
- B. Bàng quang phì đại
- C. Bàng quang có túi ngách
- ☒ D. Bàng quang teo nhỏ, giảm đàn hồi
- E. Thở tích bình thường

Câu 59: Nguyên nhân chủ yếu của sỏi bàng quang thường gặp là:

- A. Sỏi đường tiểu trên
- B. Nhiễm khuẩn niệu
- C. Nhóm nguyên nhân gây tình trạng ứ đọng nước tiểu trong bàng quang, bứu tiền liệt, hẹp niệu đạo, bàng quang thần kinh
- D. Do dị vật
- ☒ E. Tất cả đúng

Câu 60: Để chẩn đoán vỡ niệu đạo sau, trong điều kiện của các bệnh viện ở nước ta cần:

- A. Thăm dò niệu đạo sau bằng thông tiểu
- B. Chụp X-quang bụng đứng không sửa soạn
- C. Chụp niệu đạo ngược dòng cấp cứu
- D. Nội soi niệu đạo
- ☒ E. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 61: nguyên nhân thường gặp của sỏi niệu quản là:

- ☒ A. Do sỏi từ thận rơi xuống
- B. Do ứ đọng nước tiểu lâu ngày
- C. Do dị vật
- D. Do viêm xơ hóa gây hẹp niệu quản
- E. Do sỏi thứ phát tại niệu quản do hẹp dị tật bẩm sinh

Câu 62: Ung thư bàng quang có suất độ:

- ☒ A. Đứng hàng thứ 2 trong các loại bứu đường niệu
- B. Đứng hàng thứ 7 trong các loại ung thư ở phụ nữ nói chung
- C. Luôn cao hơn ung thư tiền liệt tuyến
- D. Ở nam và nữ tương đương nhau
- E. Tất cả các câu trên đúng.

Tần suất: hàng thứ 2/Uthư hệ tiết niệu-sinh dục
• Tuổi: 50-70
• Giới: nam/nữ =3/1

Câu 63: Bệnh nhân bị sỏi niệu quản hai bên bị suy thận do:

- A. Sự bế tắc làm giảm cung lượng máu tới thận
- B. Sự bế tắc làm giảm tưới máu bên trong nhu mô thận
- ☒ C. Sự bế tắc gây tăng áp lực bên trong hệ thống đài bể thận, dẫn đến giảm áp lực lọc cầu thận

D. Sự bế tắc gây tăng áp lực bên trong hệ thống đài bể thận, dẫn đến tăng áp lực lọc cầu thận

E. Sự bế tắc làm tăng tưới máu bên trong nhu mô thận

Câu 64: Ung thư tuyến tiền liệt gây suy thận do:

A. Ung thư xâm lấn vào hai niệu quản

☒ B. Ung thư xâm lấn vào bàng quang

C. Ung thư di căn vào hạch ở rốn thận

D. Ung thư làm tăng tưới máu đến vùng chậu vì mạch máu tăng sinh

E. Ung thư làm giảm tưới máu đến nhu mô thận

Câu 65: Xét nghiệm KHÔNG sử dụng để chẩn đoán suy thận do bế tắc niệu quản là:

A. CT scan bụng không tiêm thuốc cản quang

B. Siêu âm bụng

C. CT scan có tiêm thuốc cản quang

D. Đồng vị phóng xạ thận không tiêm thuốc Lasix

E. Đồng vị phóng xạ thận có tiêm thuốc Lasix

Câu 66: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt:

A. Chỉ định mổ cắt bướu khi kèm theo viêm tuyến tiền liệt cấp

B. Bướu to luôn có chỉ định mổ cắt bướu

C. Chỉ định mổ cắt bướu nếu bướu gây bế tắc, ngược dòng bàng quang niệu quản hai bên, suy thận cấp

D. Chỉ định mổ cắt bướu khi PSA tăng cao

☒ E. Chỉ định mổ cắt bướu phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của triệu chứng do bướu gây ra (bí tiểu không đáp ứng điều trị hoặc điểm IPSS không đáp ứng điều trị)

Câu 67: Loại bướu nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong ung thư tinh hoàn:

A. Bướu tế bào Leyding

B. Choriocarcinom

C. Teratocarcinom

D. Carcinoma tế bào tuyến

☒ E. Seminom

Câu 68: Các ung thư tiền liệt tuyến có cùng giai đoạn nhưng có các độ biệt hóa khác nhau loại nào có dự hậu xấu nhất:

A. Gleason 3 (2+1)

☒ B. Gleason 9 (5+4)

C. Gleason 9 (4+5)

D. Gleason 8 (4+4)

E. Gleason 3 (1+2)

Câu 69: Cấy nước tiểu không được khuyến cáo thường quy trong thực hành lâm sàng cho bệnh nhân viêm bàng quang cấp trong trường hợp nào sau đây:

A. Bệnh nhân có tiểu máu

- B. Phụ nữ lớn tuổi
- C. Trẻ em
- D. Nam giới
- ☒ E. Phụ nữ trẻ

Câu 70: Trong các loại ung thư tinh hoàn sau đây, loại nào chiếm tỉ lệ cao nhất:

- A. Teratoma
- B. Không xác định được
- ☒ C. Seminoma
- D. Yolk sac tumor
- E. Choriocarcinoma

Câu 71: Bệnh nhân có sỏi niệu quản bên trái, thường đến nhập cấp cứu trong trường hợp nào:

- A. Đau bụng cấp và dễ nhầm với bụng ngoại khoa
- B. Tiểu máu đại thể
- C. Vỡ niệu
- D. Suy thận cấp
- ☒ E. Đau quặn thận trái

Câu 72: Seminoma:

- A. Ít nhạy tia xạ hơn loại không phải seminoma
- B. Cả hai loại đều kháng tia xạ
- C. Cả hai loại đều nhạy với tia xạ như nhau
- D. Không xác định được
- ☒ E. Nhạy tia xạ hơn loại không phải seminoma

Câu 73: Khảo sát hình ảnh học đường tiết niệu trên được chỉ định cho trường hợp nào sau đây:

- A. Xét nghiệm nước tiểu cho thấy có tiểu máu
- B. Bí tiểu nhiều lần.
- C. Bàng quang giảm trương lực
- D. Tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt
- E. Tuyến tiền liệt có thể tích trên 50 ml

Câu 74: Khi bệnh nhân nam lớn tuổi có các triệu chứng sau thì cần nghĩ đến chẩn đoán tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, ngoại trừ:

- A. Tiểu khó
- B. Tiểu ngập ngừng
- C. Tiểu đêm
- ☒ D. Tiểu máu cuối dòng
- E. Tiểu nhiều lần

Câu 75: Vì trùng trong nước tiểu tiết ra men (enzyme)

- A. Urease
- B. Protesae
- C. Reptlase
- D. A và B đúng**
- E. B và C đúng

Câu 76: Nguyên nhân KHÔNG gây vỡ niệu đạo trước là:

- A. Khi đặt ống thông to trên bệnh nhân có niệu đạo đường kính nhỏ
- B. Khi bệnh nhân ngã ngối xoạc hai chân trên một vật cứng
- C. Do chấn thương gãy xương chậu**
- D. Trường hợp bệnh nhân bị ngã xoạc chân trên cầu khi
- E. Khi đặt thông niệu đạo bị lạc đường

Câu 77: Bệnh nhân suy thận cấp sau thận có thể bị tử vong do:

- A. Tăng CO2 máu
- B. Tăng đường huyết
- C. Tăng kali máu hoặc toan máu**
- D. Tăng Natri máu và Clo máu
- E. Tăng acid uric máu

Câu 78: Khi quan sát dưới kính hiển vi mẫu mô của tuyến tiền liệt trong tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì thành phần nào tỷ lệ nhiều nhất:

- A. Mô xơ
- B. Mô sợi xơ**
- C. Mô nền
- D. Mô sợi tuyến
- E. Mô cơ

Tổ chức sợi chiếm trung bình 60%, tổ chức tuyến và tổ chức cơ mỗi loại chiếm trung bình 20%. Tổ chức sợi càng nhiều thì bước càng xơ cứng gây ra hiện tượng bế tắc càng cao

Câu 79: Một người bạn cùng tuổi với bệnh nhân trên có cha bị ung thư tiền liệt tuyến nên lo sợ cũng xin khám. Anh (chị) sẽ làm gì?

- A. Thăm khám hậu môn trực tràng
- B. B+ làm thêm CT scan
- C. B+ làm thêm MRI (cộng hưởng từ)
- D. A+ làm thêm PSA**
- E. Xạ hình tiền liệt tuyến

Câu 80: Ở phụ nữ, dây chằng tròn, nằm trước niệu quản chậu. Một ứng dụng trong giải phẫu học ứng dụng ở người phụ nữ là:

- A. Dây chằng tròn là phương tiện cố định tử cung vào sàn chậu
- B. Mốc phẫu thuật: Khi vào niệu quản chậu, dây chằng tròn, nằm trước niệu quản.
- C. Trong phẫu thuật đường Gibson ngã ngoài phúc mạc, có thể không cần cắt dây chằng tròn vẫn có thể tiếp cận niệu quản chậu.

D. Dây chằng tròn có mạch máu bên trong, nên dễ chảy máu nếu không cột kỹ

E. Không nhất thiết phải phục hồi lại dây chằng tròn để dự phòng sa tử cung.

Câu 81: Yếu tố nào sau đây có liên quan với bí tiểu cấp, ngoại trừ:

A. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng

B. Lứa tuổi

C. Tiểu đạm

D. Kích thước tuyến tiền liệt

E. Tiền sử có chẩn đoán bướu tuyến tiền liệt

Câu 82: Chẩn đoán suy thận cấp ở một bệnh nhân bị sỏi niệu quản hai bên dựa vào:

A. Đột ngột bí tiểu

☒ B. Đột ngột vô niệu

C. Tăng ure, creatinin huyết thanh

D. Biết có sỏi niệu quản hai bên từ trước

E. Tiền căn bị suy thận cấp do sỏi trước đây

Câu 83: Sỏi đường tiết niệu được phát hiện cách nay:

A. 3000 năm

B. 6000 năm

☒ C. 7000 năm

D. 5000 năm

E. 4000 năm

Câu 84: Loại thụ thể alpha nào chiếm ưu thế ở tuyến tiền liệt của người:

A. 1A

B. 1B

C. 1C

D. 1D

E. Tất cả sai

Câu 85: Ung thư tiền liệt tuyến thường cho di căn nhiều nhất đến:

☒ A. Xương

B. Phổi

C. Não

D. Thận

E. Gan

Câu 86:

Câu 87: Ống Wolf (Wolffian duct) còn gọi là ống thận (nephric duct), chọn câu SAI:

A. Có nguồn gốc trung phôi điệp (mesoderm), thoái hóa khi thai nhi là nữ

☒ B. Vòi trứng là phần còn lại của ống Wolf ở phụ nữ

C. Vùng tam giác bàng quang phát triển từ đoạn cuối của ống Wolf

D. Ống dẫn tinh chính là phần còn lại của ống Wolf trên người đàn ông

E. Nụ niệu quản (ureteral bud) sinh ra từ đoạn cuối của ống Wolf trên nam và nữ trước

khi phần còn lại bị thoái hóa

Câu 88: Triệu chứng lâm sàng của vỡ niệu đạo trước KHÔNG gồm:

- A. Tụ máu hình cánh bướm ở tầng sinh môn
- B. Bệnh nhân bí tiểu sau chấn thương
- C. Bệnh nhân có cơ chế chấn thương là té xoạc chân ngồi trên một vật cứng
- D. Có ra máu nhiều ở miệng niệu đạo
- ☒ E. Có dấu hiệu gãy xương chậu

Câu 89: Hiện nay phương pháp ngoại khoa nào thường được dùng nhất trong điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt với thể tích tuyến tiền liệt lớn hơn 100ml?

- A. Siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU)
- B. Cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo bằng điện đơn cực
- ☒ C. Mở mở bóc bướu tuyến tiền liệt
- D. Cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo bằng Laser Thulium
- E. Nút mạch tuyến tiền liệt

Câu 90: Viêm thận bể thận cấp (pyelonephritis) được chẩn đoán khi bệnh nhân có những biểu hiện lâm sàng sau:

- ☒ A. Ốn lạnh, sốt và đau hông lưng
- B. Sẹo ở vỏ thận
- C. Khuẩn niệu và mủ niệu
- D. Ngược dòng bàng quang niệu quản
- E. Giảm chức năng thận.

Câu 91: IPSS 21 điểm thì thể hiện rối loạn nào sau đây là nặng:

- ☒ A. Triệu chứng đường tiết niệu dưới
- B. Rối loạn chức năng bàng quang
- C. Rối loạn chức năng cương dương
- D. Triệu chứng bế tắc nặng hơn kích thích
- E. Triệu chứng bàng quang tắc nghẽn

Câu 92: Tỷ lệ tái nhiễm khuẩn niệu bị ảnh hưởng bởi:

- A. Sẹo thận
- B. Điều trị kháng sinh
- C. Rối loạn chức năng bàng quang
- ☒ D. Ngược dòng bàng quang niệu quản
- E. Tuổi

Câu 93: Sỏi niệu nào không cản quang:

- A. Phosphate
- B. Oxalate calci

- ☒ C. Urate
- D. Carbonate
- E. Ammonium

Câu 94: Chỉ định điều trị ngoại khoa trong tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ngoại trừ:

- ☒ A. Tiểu không kiểm soát
- B. Sỏi bàng quang
- C. Nhiễm khuẩn niệu tái phát nhiều lần
- D. Ngược dòng bàng quang niệu quản
- E. Bí tiểu

Câu 95: Cắt tiền liệt tuyến tận gốc để:

- A. Cắt triệt tiền liệt tuyến
- B. Cắt triệt tiền liệt tuyến và túi tinh thành một khối
- ☒ C. Câu B và nạo hạch chậu bịt hai bên
- D. Tất cả đều sai
- E. Chỉ có A và B đúng

Câu 96: pH = 8 trong nước tiểu, sỏi dễ hòa tan nhất:

- A. Phosphate
- B. Amm
- ☒ C. Cystine
- D. Oxalate calci
- E. Carbonate

Câu 97: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, khám lâm sàng quan trọng nhất là:

- A. Khám trực vì bệnh nhân tiểu khó phải rặn tiểu dễ bị trĩ
- B. Thăm dò niệu đạo bằng thông Foley để đánh giá bế tắc cổ bàng quang
- C. Khám thoát vị bẹn vì bệnh nhân tiểu khó, phải rặn tiểu dễ bị thoát vị bẹn
- D. Khám và thăm dò niệu đạo bằng que nong kim loại
- ☒ E. Thăm khám tuyến tiền liệt qua trực tràng bằng ngón tay

Câu 98: Bàng quang hỗn loạn thần kinh có mấy dạng chính:

- A. 3 dạng
- B. 5 dạng
- ☒ C. 2 dạng
- D. 1 dạng
- E. 4 dạng

Câu 99: Bệnh nhân nam 50 tuổi vào viện vì đau hông lưng bên trái, không sốt. Bạch cầu máu 8000/ μ L, tổng phân tích nước tiểu không bạch cầu, BUN 17 mg%, creatinine 1.1 mg%. KUB: Có sỏi thận bên trái to 30 mm ngay bể thận, siêu âm bụng: Thận trái có sỏi, ứ nước độ II, thận phải bình thường, UIV: 2 thận bài tiết tốt, sỏi thận trái 30 mm, chọn lựa phương pháp điều trị nào thích hợp:

F. Nội soi tán sỏi ngược dòng bằng máy soi thận mềm

☒ G. Tán sỏi thận qua da (PCNL)

H. Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)

I. Mổ nội soi sau phúc mạc lấy sỏi

J. Mổ mở lấy sỏi kết hợp tạo hình khúc nối

Câu 100: Một bệnh nhân bị bướu tinh hoàn đã mổ cắt tinh hoàn, giải phẫu bệnh là seminoma đơn thuần, bướu còn khu trú trong vỏ bọc tinh hoàn CT scan không phát hiện hạch. Anh (chị) sẽ:

☒ A. Không cần điều trị tiếp

B. Cho hóa trị bổ túc

C. Cho xạ trị bổ túc

D. Kết hợp hóa và xạ trị bổ túc

E. Tất cả đều đúng.

Câu 101: Sử dụng thuốc ức chế 5 alpha – reductase để điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có thể làm PSA giảm đi bao nhiêu sau 12... điều trị:

A. 60%

☒ B. 50%

C. 30-40%

D. 30%

E. 40%

Câu 102: Tinh hoàn ẩn là yếu tố nguy cơ gây tăng tỉ lệ ung thư tinh hoàn lên:

A. Gấp 2 lần

B. Không thay đổi tỉ lệ nguy cơ

☒ C. Gấp 4 lần

D. Gấp 10-15 lần

E. Gấp 8 lần

Câu 103: Vô niệu trên bệnh nhân bị sỏi niệu quản có đặc điểm nào, chọn câu ai:

A. Khi sỏi niệu quản trên thận độc nhất

B. Là tình huống cấp cứu ngoại khoa trong tiết niệu

C. Khi sỏi ở niệu quản 2 bên

D. Suy thận cấp do sỏi niệu quản có khả năng phục hồi tốt.

☒ E. Thường diễn ra từ từ

Câu 104: Loại tế bào thường gặp nhất trong ung thư tiền liệt tuyến là:

A. Tế bào chuyển tiếp

B. Lympho bào

☒ C. Tế bào tuyến

D. Tế bào nhỏ

E. Sarcoma

Câu 105: Nam < 25 tuổi có cha bị ung thư tiền liệt tuyến, khi nào nên xét nghiệm PSA?

#Tán sỏi ngoài cơ thể ESWL: Sỏi đài bể thận, niệu quản <2cm=20mm, (chậu thì tán sỏi ngược chiều thành công cao hơn)
#Tán sỏi qua da PCNL: thành công 3-4cm là 90%
#tán sỏi nội soi ngược chiều URS: sỏi niệu quản đơn độc hoặc 2 viên, 7-15mm
#mổ mở

Trong những trường hợp sỏi niệu quản gây nhiễm khuẩn và sốc nhiễm khuẩn cần xử trí như sau: (1) Mở thận ra da (2) Hoặc đặt thông niệu quản và phối hợp với kháng sinh thích hợp. Điều trị sỏi niệu quản trong trường hợp này được dời lại đến khi nào tình trạng nhiễm khuẩn được giải quyết.
Ngoài ra, chỉ định cấp cứu còn được thực hiện trong những trường hợp sỏi niệu quản hai bên hay sỏi niệu quản một bên trên thận độc nhất, gây tắc nghẽn với tổn thương thận cấp tính.

70% là tế bào tuyến

- A. Không liên quan vì ung thư tuyến tiền liệt không di truyền
- B. Nên xét nghiệm ở độ tuổi 30
- C. Nên xét nghiệm ngay
- D. Nên xét nghiệm ở tuổi 50-70 tuổi
- ☒ E. Nên xét nghiệm ở tuổi 40

Câu 106: Kháng sinh được lựa chọn đầu tay cho bệnh nhân nữ trẻ bị viêm bàng quang đơn thuần là:

- ☒ A. TMP-SMX
- B. Penicillin
- C. Flouroquinolone
- D. Cephalosporin
- E. Nitrofurantoin

A hay E đều được theo guideline Bình dân và nội Y6

Câu 107: Một bệnh nhân nam người Việt 45 tuổi, tiền sử gia đình không có ai bị bệnh ung thư, muốn đi khám truy tìm ung thư tiền liệt tuyến. Anh (chị) nên làm gì?

- A. B+ làm thêm CTscan
- ☒ B. A+ làm thêm PSA
- C. Thăm khám hậu môn trực tràng
- D. B+ làm thêm MRI (cộng hưởng từ)
- E. Phải sinh thiết thường qui

Câu 108: Tần suất ung thư tiền liệt tuyến ở ung thư tiết niệu nam giới là:

- A. Đứng hàng thứ 2
- B. Đứng hàng thứ 3
- C. Đứng hàng thứ 4
- D. Đứng hàng thứ 5
- ☒ E. Đứng hàng thứ nhất

Câu 109: Khi bị tinh hoàn ẩn tỉ lệ bị bướu tinh hoàn tăng lên:

- A. Gấp 2 lần những người bình thường
- B. Không tăng lên so với người bình thường
- ☒ C. Gấp 5-10 lần những người bình thường
- D. Không xác định được
- E. 10-20 lần những người bình thường

Câu 110: Một bệnh nhân nam 30 tuổi, đi khám sức khỏe định kỳ, khám thấy tinh hoàn phải có một khối u 1cm, mào tinh hoàn bình thường. Theo ý anh chị nên hướng tới:

- ☒ A. Bướu tinh hoàn
- B. Lao tinh hoàn
- C. Sẹo cũ của tinh hoàn
- D. Viêm tinh hoàn
- E. Carcinom tinh hoàn

Câu 111: Ung thư tinh hoàn thường cho di căn hạch nhiều nhất:

- A. Tất cả các nơi trên
- B. Hạch chậu bịt
- C. Hạch bẹn
- D. Hạch thượng đòn trái
- ☒ E. Hạch dọc động mạch chủ

Câu 112: Về giải phẫu, niệu đạo trước:

- A. Gồm niệu đạo dương vật và niệu đạo tiền liệt tuyến
- B. Niệu đạo trước không có gì bảo vệ nên dễ bị chấn thương
- C. Là phần niệu đạo nằm phía trước bìu
- D. Gồm niệu đạo dương vật và niệu đạo màng
- ☒ E. Gồm niệu đạo dương vật và niệu đạo hành

Câu 113: Nguyên nhân chủ yếu của sỏi niệu đạo là:

- A. Hẹp da quy đầu
- B. Hẹp niệu đạo
- C. Túi thừa niệu đạo
- ☒ D. Sỏi từ bàng quang rơi xuống rồi kẹt ở niệu đạo
- E. Viêm niệu đạo

Câu 114: Bệnh nhân nam thấy bìu một bên to. Đi khám được cho làm siêu âm phát hiện một khối u ở mào tinh. Chẩn đoán:

- A. Bướu tinh hoàn ăn lan mào tinh
- B. Ung thư mào tinh
- C. Ung thư nơi khác di căn đến mào tinh
- ☒ D. Hầu như không nghi ngờ ác tính
- E. Tất cả đều đúng

Câu 115: pH nước tiểu < 5 sỏi dễ hình thành là:

- A. Oxalate – Calci
- B. Carbonate – Phosphate
- ☒ C. Urate, Cystine
- D. Urate, Carbonate
- E. Phosphate - Calci

Câu 116: Dạng lâm sàng chính của bàng quang hỗn loạn thần kinh là:

- A. Bàng quang hỗn loạn thần kinh tăng trương lực và bàng quang hỗn loạn thần kinh dạng giảm trương lực
- ☒ B. Bàng quang hỗn loạn thần kinh dạng tăng hoạt và bàng quang hỗn loạn thần kinh dạng giảm hoạt động
- C. Bàng quang hỗn loạn thần kinh co tổn thương trung tâm Burst và bàng quang hỗn loạn thần kinh không tổn thương trung tâm Burst

- D. Bàng quang hỗn loạn thần kinh cấp và bàng quang hỗn loạn thần kinh mạn
- E. Bàng quang hỗn loạn thần kinh do tổn thương não và bàng quang hỗn loạn thần kinh do tổn thương não?

Câu 117: Hầu hết nhiễm khuẩn niệu ở phụ nữ là:

- A. Do vi khuẩn đề kháng
- B. Do các yếu tố nhạy cảm di truyền
- C. Nhiễm khuẩn niệu phức tạp
- D. Bao gồm nhiều tác nhân
- ☒ E. Tái nhiễm

Câu 118: Một bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn T2aN0M0 đã mô tả cắt tiền liệt tuyến tận gốc. PSA sau mổ 6 tuần 0.091 ng/ml

- A. Chỉ theo dõi
- B. Điều trị liệu pháp nội tiết ngắn hạn + xạ trị hỗ trợ để tiêu diệt tế bào bướu còn sót lại
- C. Xạ trị áp sát
- D. Điều trị nội tiết tố hỗ trợ để giảm PSA xuống bằng 0
- E. Hóa trị hỗ trợ Docetaxel

Câu 119: Chọn câu SAI: Trong trường hợp chấn thương thận kín, những việc cần phải làm là:

- ☒ A. Chỉ định mổ cắt thận khi chấn thương thận độ 4, độ 5 (theo AAST)
- B. Hầu hết các trường hợp chấn thương thận đều điều trị bảo tồn thận thành công
- C. Theo dõi sinh hiệu, mạch huyết áp, nhiệt độ, tri giác thường xuyên sau chấn thương
- D. Khám bụng thường xuyên, theo dõi tình trạng khối máu tụ sau phúc mạc
- E. Theo dõi máu mát qua đếm hồng cầu và dung tích hồng cầu.

Câu 120: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, chọn câu sai:

- A. Bế tắc là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị học tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
- ☒ B. Bí tiểu là chỉ định phẫu thuật tuyệt đối.
- C. Tùy độ bế tắc mà ta có các thái độ điều trị nội khoa hay ngoại khoa
- D. PSA huyết thanh tăng khi thể tích tuyến tiền liệt tăng
- E. Điểm số IPSS đôi khi không tương quan đến kích thước tuyến tiền liệt