THU: gneen

407-ALL

ĐỀ 2 - THI NGOẠI LẪN 1 HỌC KỦ I Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

1. Xếp giai đoạn của ung thư dạ dày theo TNM. CHỌN CÂU SAI

- A. Giai đoạn 0: ung thư khu trú ở lớp biểu mô của niêm mạc dạ dày
- B., Giai đoạn 1: ung thư còn khu trú ở thành dạ dày
- C. Giai đoạn 4: đã di căn xa
- D. Giai đoạn 3: ung thư đã ra khỏi dạ dày, lan tới các hạch chặng N2

Giai đoạn 2: ung thư đã xâm lấn các tạng lân cận

- Siêu âm trong chân đoán tắc ruột cơ học. CHỌN CÂU SAI
  - A. Là xét nghiệm chân đoán xác định tắc ruột do lồng ruột
  - B. Có thể chấn đoán được vị trí và nguyên nhân gây tắc
  - C. Giúp phân biệt được các nguyên nhân khác gây đau và trướng bụng khi lâm sàng không rõ ràng

Siêu âm có độ nhạy thấp hơn X-quang bụng không sửa soạn trong chân đoán tắc ruột cơ học

E. Dấu hiệu siêu âm tắc ruột cơ học là thấy quai ruột giản hơn 2,5cm, nằm cạnh quai ruột kẹp


- 3. Chân đoán phân biệt viêm túi mật với các bệnh lí sau. NGOẠI TRÙ
  - Viêm gan
  - B. Viêm tụy cấp
  - C. Sòi niệu quản phải
  - D. Viêm dạ dày
  - E. Áp-xe gan
- 4. Ung thư gan nguyên phát phần lớn bắt nguồn từ tế bào gan (phần còn lại từ tế bào ống mật), có rất nhiều yếu tố nguy co. CHON CÂU SAI
  - Kháng thể chống viêm gan C chiếm tỉ lệ thấp hơn 50% trong ung thư gan Nói chung, hon 60% ung thư gan trên nền xơ gan
  - C. Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) chiếm ti lệ cao trong ung thư gan 81%
  - D. Dioxin có thể gây ung thư gan
  - E. Aflatoxin B1 có thể gây ung thư gan
- 5. Yếu tố thuận lọi để tạo sỏi đường mật, NGOẠI TRÙ
  - Nữ nhiều hon nam
  - B. Đời sống <del>Tiấp, ăn u</del>ống thiếu đạm
  - C. V<del>ệ sinh</del> kém
  - D. Thường gặp ở tuổi trung niên (40 60 tuổi)

Có sỏi to ở túi mật

6. Hep môn vị

- Diễn tiến qua 2 giai đoạn: tăng trương lực (sóm) và giảm trương lực (muộn)
- B. Là bệnh khó chấn đoán sớm vì triệu chứng âm thẩm không có âm thầm, troh sớm nhất là đầy bugnj khó tiêu
- C. Là biến chứng thường gặp nhất của bệnh loét đạ đày tá tràng chảy máu và thủng nhiều hơn
- D. Hẹp môn vị do loét tá tràng ít gặp hơn hẹp môn vị do ung thư cũ là nhiều hơn
- E. Là bệnh lý do tồn thương gây hẹp từ môn vị trở lên trên nhú Vater
- Các thành ống ben gồm có. CHỌN CÂU SAI
  - A. Thành dưới là dây chẳng bẹn và dải chậu mu

Cách chọn: chọn A→ B Bò A, chọn D→



# ĐỂ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 HỌC KÌ I

Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT) Chon một câu phù họp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ Thành trước là phần đười cơ chéo bụng ngoài Thành trong là bờ ngoài của cơ thẳng bụng Thành trên là bờ dưới cơ chéo bụng trong và cân cơ ngang bụng Thành sau là mạc ngang và một ít cân cơ ngang bụng Nguyên nhân nào sao đây KHÔNG gây tắc ruột non do thắt A. Lông ruột cấp < B. Xoàn ruột non / Tắc ruột do dây chẳng chen quai ruột -9 Thoát vị nghet -Tắc ruột sau viêm nhiễm 9. Một bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh sản, vào viện vì đau hố chậu phải nhiều, da niêm phot nhat, kinh cuối cách nhập viện 15 ngày, chẩn đoàn có thể nghĩ đến nhiều nhất là Nang hoàng thể xuất huyết **REVISED** · Sỏi thận phải B., Viêm ruột thừa C. Thai ngoài tử cung vỡ D. Viêm manh tràng \_. E. 10. Thương tổn giải phẫu bệnh trong ung thư đại tràng, CHON CÂU SAI Ung thư tế bào tuyến chiếm khoảng 50% 90-95% Có thể gặp dạng sarcom, u lympho C. Thể thâm nhiễm Thể sùi D. Thể loét 11. Tràn khí dưới da trong chấn thương ngực là một biến chúng Nặng nề trong chân thường ngực Phát hiện nhờ các dấu hiệu lép bép dưới da < Thường đị kèm với gãy xương sườn Khí thường đi ra từ xoang màng phổi 12. Một bệnh nhân nữ, 17 tuổi, đau hố chậu phải, sốt và đau họng nhiều có thể nghĩ đến các bênh sau **REVISED** Sởi niệu quản phải Viêm đại tràng В. đỉnh là 20-40y Viêm ruột thừa sau đó giảm dần theo tuổi Viêm hạch mạc treo hồi manlı tràng Viêm phân phụ 13. Ung thư đại tràng là bệnh thường gặp tại Việt Nam, yếu tố nguy cơ gây ra bệnh này CHON CÂU SAI Polyp có đường kính trên 1cm dễ bị ung thư Đa polyp dễ bị ung thư Bệnh viêm loét đại trực tràng xuất huyết An nhiều mỡ, ít chất sợi từ thực vật

Cách chọn: chọn A→ Bỏ A, chọn D→

## ĐỀ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 HỌC KÌ I Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

<u>Chon</u> E.	một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và m Polyp tuyến nhánh tỉ lệ hóa ác cao hơn tuyến ống	nuc đỏ	
14. Chẩn A. loé	n đoán nguyên nhân hẹp môn vị Hẹp do ung thư thường có triệu chứng âm I lâu dài khô t	ông đột ngột như hẹp d	0
C. D., E.	Thường chẩn đoán được trước khi mổ X-quang có hình ảnh cắt cụt, bờ cứng trong hẹp môn vị Dạ đày giãn lớn và dấu hiệu Bouveret thường gặp trong Hẹp do loét thường gặp ở tuổi thanh niên, hẹp do ung th	ung thu hon trong loct	
. 120/7 kháng	h nhân nữ, 28 tuổi, bị xe tài tông phải. Vào viện: Mạch 'OmmHg, Glasgow 15 điểm, có dấu chạm thương ở vùng khắp bụng, ống thông dạ dày và ống thông tiểu không a đầu tụy khỏi thân tụy. Thương tồn tụy độ mấy (theo Mo	thượng vị, ấn đau và đồ g có máu, CT-Scan thấy	è
B	5	the special sp	ι.
	4	3. 40.	
7 <sup>D</sup> .	3 2		
B. C. D. E. 17. Thu	n câu đúng trong chẩn đoán Việm phúc mạc Chẩn đoán Việm phúc mạc chủ yếu dựa vào triệu chứng Chẩn đoán và chỉ định mỗ phải dựa chủ yếu vào kết quả Công thức máu cho biết mức độ nặng của tinh trạng Việ Siêu âm cho biết chính xác Viêm phúc mạc do có dịch t CT-Scan luôn luôn chẩn đoán được nguyên nhân viêm p  ng dạ dày – tả tràng do loét Chiếm thiệ khoảng 5 - 10%	à Cận lâm sàng êm phúc mạc trong bụng, phúc mạc	, ,
B. C. D. E.	Chiếm tỉ lệ khoảng 5 – 10% sáng sớn thà thà chảy máu > tỉ Là biến chứng gặp nhiều nhất của bệnh loét đạ đầy – tấ Thường gặp ở độ tuổi lao động, nữ nhiều hơn nam nam > Chủ yếu xảy ra ở người làm công việc trí óc	trang hepmin vin	quá n
18. Giải	i phẫu vùng bẹn. CHỌN CÂU SAI	7.50	ı'.
A. B.	Dây chẳng bẹn là thành dưới ổng bẹn Thành trước ổng bẹn là cân chéo ngoài		1
i C	Dây chẳng Cooper không là thành phần của ống bẹn Mạc ngang luôn luôn bị phá võ trong thoát vị bẹn gián Gân kết hợp là do 2 cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụ		
A.	a âm trong chấn thương bụng. CHỌN CÂU SAI  Có thể thay thế được biện pháp chọc rửa ổ bụng tro  ng ổ bụng V	i de la respect	iu
E)	Dễ đánh giá mức độ tổn thương tạng đặc Có thể lặp lại nhiều lần ✓		•
D. E.	Dễ phát hiện tụ dịch dù ít ở túi cùng Douglas  Thực hiện ngay tại giường bệnh		

Cách chọn: chọn A→ B C D E Bỏ A, chọn D→

### ĐÈ 2 - THI NGOẠI LẬN 1 HỌC KÌ I Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chỉ, bút xóa và mực đỏ

- 20. Việm tùi mật cấp. CHON CÂU SAI
  - A. Diều trị bằng phẫu thuật cắt túi mật.
  - B. Có thể do ung thư túi mật
  - C. Thường gặp ở nữ giới hơn nam giới.
  - Thường gặp ở nông dân hơn dân thành thị
    - E. Bệnh nhân bị bệnh Crohn là một yếu tố nguy cơ.
- 21. Triệu chúng thùng ổ loét đạ dày. CHỌN CÂUSAI
  - A. Nôn
  - B. Mất vùng đục trước gan
  - C. Đau bụng dữ đội và đột ngột
  - D. Bung co cung
- Tiêu long
- 22. Bù đắp nước-điện giải và điều chính thăng bằng kiểm-toạn ở bệnh nhân tắc ruột cần dựa vào các yếu tố sau đây, NGOẠI TRÙ
  - A. Urê và Creatinin máu.
  - B. Ion đồ, dự trữ kiểm
  - C. Vị tri tắc và thời gian tắc
  - D. Hematocrit \*
  - Nguyên nhân tắc 🕅
- 23. Trên một con tàu viễn dương, còn 2 ngày nữa mới vào đến đất liền, một thủy thủ được chân đoán là viêm ruột thừa, xử lí của thấy thuộc trên tàu như thế nào là thích hơn
  - A. Truyền dịch và cho kháng sinh
  - Nhịn ăn uống, truyền dịch, cho giảm đạu và kháng sinh
  - C. Nhịn ăn uống và truyền dịch
  - D. Nhịn ăn uống, truyền dịch và cho giảm đầu
  - E. Nhin ăn uống, truyền dịch và cho kháng sinh
- 24. Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, bị té xe, có một vết thương 1x0.5cm ở niềm mạc môi dưới, có ít máu đông ở vết thương, không có dị vật. Thay bằng vết thương này, cần ưu tiên chọn dụng dịch sát khuẩn nào
  - A. ' NaCl 0,9%
  - Povidin A
  - C. Oxy già
  - D. Thuốc tim
  - E. Dung dich Dakin
- 25. Điểm Clado trong chân đoán viêm ruột thừa là;
  - A. Điểm nối 1/3 phải và 2/3 trái của đường nối hai gai chậu trước trên
  - B. Điểm nối 2/3 ngoài và 1/3 trong của đường nối rồn và gai chậu trước trên bên phải
  - Điểm gặp nhau của bờ ngoài cơ thẳng bụng bên phải và đường nổi hai gai chậu trước trên
  - D. Điểm nối 1/3 ngoài và 2/3 trong của đường nối rốn và gai chậu trước trên bên phải

Cách chọn: chọn  $A \rightarrow B C D E$ Bỏ A, chọn  $D \rightarrow B C E$ 

## ĐỀ 2 - THỊ NGOẠI LẬN 1 HỌC KÌ I . Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

('họn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chỉ, bút xóa và mực đỏ

- Điểm giữa của đường nối rốn và gai chậu trước trên bên phải
- 26. Rồi loạn sinh lí bệnh trong tắc ruột phụ thuộc vào các yếu tố sau đây. ĐIỀU NÀO KHÔNG ĐÚNG

Tắc ruột non xấu hơn tắc ruột già

- Bệnh nhân có bệnh mạn tính xấu hơn người không bệnh mạn tính
- Bệnh nhân lớn tuổi xấu hơn trẻ tuổi
- Bệnh nhân đến bệnh viện muộn xấu hơn đến sớm D.
- Tắc ruột do thất năng hơn do bít
- 27. Triệu chứng của thoát vị ben đùi. CHON CÂU SAI
  - Thoát vị kẹt là khối thoát vị không đầy xẹp được và không đau
  - Thoát vị gián tiếp làm nghiệm pháp chặn lỗ ben sâu khối phồng sẽ không xuất В. hiên
  - Thoát vị nghẹt là khối thoát vị bị chèn ép ở cổ túi và thiếu máu nuôi tạng thoát C.



Thoát vị ben trực tiếp làm nghiệm pháp chạm ngón sẽ chạm đầu ngón Khối thoát vị đùi nằm dưới nếp bẹn

- 28. Những trường hợp khó khám bướu tuyến giáp, khuynh hướng hiện nay cần có sự trợ giúp của
  - Xa ký tuyển giáp Α.
  - Sờ nắn kỹ trong khi khám В.
  - Siêu âm tuyến giáp Xa hình tuyên giáp
  - Cho bênh nhân uống nước
- 29. Dấu hiệu của thùng dạ dày tá tràng. CHỌN CÂU SAI
  - Đau bụng dữ đội và đột ngột Λ.
  - X-quang bụng đứng có liềm hơi dưới hoành В.
  - Tiền căn có đau bụng do loét dạ dày tá tràng hay gặp: C.
  - Bụng gồng cứng và ấn rất đau
    - Mất vùng đục trước gan lúc nào cũng có
- 30. Bệnh nhân nam, 30 tuổi, bị tế xe máy. Vào viện: Mạch 90 lần/phút, Huyết áp 120/60mmHg, Glasgow 15 điểm, có dấu chạm thương ở thượng vị, ấn đau nhẹ hổ chậu phải không đề kháng, CT-Scan thấy võ gan hạ phân thủy II, III và có dịch bụng lượng vừa. Thương tổn gan độ mấy (theo Moore)
  - Λ.
- 31. Biểu hiện lâm sàng thông động tĩnh mạch. NGOẠI TRÙ

  - Λ. Dấu hiệu Branham
     γβ. Thiếu máu nuôi chỉ do huyết khối tắc mạch
  - C. Sờ thấy rung miu, nghe âm thổi liên tục tại phần chi tồn thương
  - Phù chi, dãn tĩnh mạch nông, da sậm màu, loét

Cách chọn: chọn A→ B C D E . Bồ A, chọn D→

# ĐỀ 2 - THI NGOẠI LÂN 1 HỌC KÌ T Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

Chon một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

- E. Mệt, tim đập nhanh
- 32. Sinh lý bệnh của hẹp môn vị. CHON CÂU SAI
  - Toan chuyển hóa
    - B. Mất điện giải -
    - C. Rối loan dinh dưỡng /
    - D. Mật nước-
  - E. Suy thận trước thận
- 33. Tư thế của thầy thuốc khi khám một bệnh nhân bướu tuyến giáp
  - Không có tư thể nào đặc biệt
  - B Đứng trước mặt bệnh nhân
    - Dứng sau lưng bệnh nhân
  - D. Bệnh nhân nằm trên giừong
  - E. .... Đứng bên cạnh bệnh nhân
- 34. Biến chứng của sỏi đường mật. NGOẠI TRÙ
  - Viêm gan cấp

渦

- B. Suy thận cấp, hội chững gan -/thận
- C. Viêm túi mật cấp
- D. Viêm mù đường mật
- E. Nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng
- 35. Thuyết khíc tuyến là giả thuyết sinh bệnh học của rò hậu môn do nguyên nhân
  - Vi trùng đường ruột
  - B. Ung thu true trang
  - C. viêm trực tràng
  - D. bệnh Crohn
  - E. Vi trùng lao
- 36. Triệu chứng của ung thư dạ dày. CHON CÂU SAI
  - Không thể chấn đoán sớm được bệnh trừ khi phát hiện tình cờ
  - B. Không phải lúc nào cũng sở được khổi u đạ dày tiên lâm sàng
  - C. Giai đoạn sớm biểu hiện rất mơ hồ
  - D. Thường biểu hiện bởi chán ăn, đầy bụng, sụt cân và thiệu máu
  - E. Hẹp môn vị là biến chứng thường gặp nhất của ung thư dạ dày
- 37. Viêm túi mật cấp. CHỌN CÂU SAI
  - Δ. Dùng nhiều thuốc tránh thai là một yếu tố nguy cơ
    - Gây phản xạ ói kèm giảm đau sau khi ói
    - Thường ở người 30 70 tuổi
  - D. 90 95% do sỏi túi mật
  - E. Túi mật to
- 38. Ung thư gan. CHON CÂU ĐƯNG.
  - A. AFP > 500ng/ml là chắc chắn ung thư gan kèm xơ gan...
  - B. Sinh thiết gan được thực hiện qua da dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ cho kết quả chính xác nhất
  - C. Dấu hiệu Rim trên siêu âm là bằng chứng có tăng sinh mạch màu

Cách chọn: chọn A→ B C D E (chỉ được chọn tối đa 2 lần)
Bỏ A, chọn D→ B C D E

## ĐỀ 2 - THỊ NGOẠI LẬN 1 HỌC KỲ I Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)


Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

Sinh thiết được thực hiện để phân loại ung thư gan

Trên hình ảnh cắt lớp điện toán dấu xâm lấn tĩnh mạch cửa là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư gan

- 39. Có thể phân loại Viêm phúc mạc theo các CẶP dữ kiện sau, CHỌN CÂU SAI
  - A. Vi trùng thường vi trùng lao
  - B. Cấp tính man tính
  - C. Nhiễm trùng vô trùng
- D. Nguyên phát thứ phát Hóa học – cơ học
- 40. Xét nghiệm nào sau đây KHÔNG được thực hiện trong bệnh cảnh Viêm phúc mạc
  - A. Soi da dày
  - B. CT-Scan bung can quang
  - Soi đại tràng
  - D. Soi bàng quang \_ \_
  - E., Soi thực quản
- 41. Trong thoát vị thành bụng. CHỌN CÂU SAI '
  - A. Thóat vị trên rốn xảy ra ở đường giữa
  - B. Ö nữ, thóat vị ben gặp nhiều hơn thóat vị đùi
    - Thóat vị bịt gặp nhiều ở phụ nữ trẻ, mập
  - D. Ö nam, thóat vị ben nhiều hơn thóat vị đùi -
  - E. Thóat vị Spieghel thường gặp ở nữ giới hơn nam giới
- 42. Xếp các dấu hiệu sau theo thứ tự mức độ đặc hiệu GIẢIM ĐẦN để chẩn đoán Viêm phúc mạc: Cảm ứng phúc mạc (A). Co cứng thành bụng (B). Đề kháng thành bụng (C). Phản ứng đội thành bụng (D)
  - A. A,B,C,D
  - B. A,C,D,B
  - C. B,C,D,A
  - D. A,D,C,B
- B,A,C,D
- 43. Triệu chứng X-quang của tắc ruột non. CHỌN CÂU SAI
  - A. Mực nước hơi nằm giữa bụng
    - Nếp niêm mạc chiếm một phần của lòng ruột
  - C. Mực nước hơi chênh nhau trên cùng một quai ruột
  - D. Nếp niêm mạc thường nằm sát nhau
  - E. Có chân rộng
- 44. Một bệnh nhân đến khám với triệu chứng đi cầu ra máu, Bác sĩ bắt buộc phải thăm khám
  - A. bung
  - B. dấu hiệu sinh tồn
  - C. âm đạo
  - D. niêm mạc
- trực tràng

Cách chọn: chọn A→ Bỏ A, chọn D→



## ĐỀ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 HỌC KÌ I Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

Chon một câu phù họp nhất. Không dùng bút chỉ, bút xóa và mực đỏ

- 45. Chuẩn bị trước mô thùng dạ dày tá tràng, NGOẠI TRỦ
  - Bồi hoàn nước và điện giải
  - Hồi sức tuần hoàn, nâng đỡ tổng trạng

Không được dùng giảm đau làm che lấp triệu chứng

- Hút đạ dày qua ống thông mũi-đạ dày
- E. Dùng kháng sinh phố rộng
- 46. Bệnh nhân được chẳn đoán là rò hậu môn với nhiều lỗ rò ngoài, nguyên nhân là. CHON CÂU SAI
  - Rò phức tạp
  - Rò chột

    - Rò móng ngựa
    - Rò dd Crohn
    - Rò do lao
- 47. Triệu chứng thường gặp trong viêm túi mật cấp: CHON CÂU SAI
  - À. · Đau dưới sườn phải
  - В. Siêu âm túi mật căng, thành dày
  - Sốt C.
  - Túi mật to và ấn đau
- Vàng mắt
- 48. Nêu sự khác biệt chính trên lâm sàng giữa áp xe nóng và áp xe lạnh

  - B. Mu ·
  - Vi khuẩn
- Sự lan rồng cho nên áp xe nóng là phải rạch dẫn lưu còn áp xa lạnh thì ko đc rạch
  - Nóng
- 49. Cân lâm sàng chấn đoán xác định và chấn đoán giai đoạn ung thư đại tràng. CHỌN CÂU SAI
  - CEA máu
  - Nội soi đại tràng
  - Siêu âm bung
  - Chup X-quang ngực thẳng D.
  - Chup đại tràng đối quang kép E.
- 50. Viêm phúc mạc do LAO là loại
  - Thường diễn tiến cấp tính do sớm gây tắc ruột
  - Là loại Viêm phúc mạc nhiễm trùng В.
  - Viêm phúc mạc thứ phát vì thường từ lao phổi đến C.
- Do trực khuẩn lao, diễn tiến âm thầm và không có dấu hiệu Viêm phúc mạc điển hình
  - Điều trị bằng phẫu thuật và thuốc kháng lao E.
- 51. Theo thuyết huyết động học trong sinh bệnh học trĩ, trĩ là. CHỌN CÂU SAI
  - Các búi tĩnh mạch nằm ở lớp dưới niêm mạc trong ống hậu môn không đối xứng nhau

Cách chọn: chọn A-Bỏ A, chọn D→

#### ĐÈ 2 - THI NGOẠI LẬN 1 HỌC KÌ I Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

Chon một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

Không có sự thông nối giữa động mạch và tĩnh mạch ở lớp dưới niêm mạc vùng thấp trực tràng và ống hậu môn

C. Nằm ở các vị trí 7g, 4g, 11g lại có tính cách cương cử nên có chức năng của

một cái đệm

- D. Có rất nhiều khoang mạch ở vùng dưới niệm mạc trực tràng thấp và ống hậu môn, vách các khoang này chỗ dày chỗ mỏng, tạo thành các hang
- E. Tạo ra đệm hậu môn giúp cho hậu môn khép kín hơn và đóng vai trò trong việc đi cầu có tự chủ
- 52. Bệnh nhân nhập viện vì đau nhẹ ở hố chậu phải, sốt không rõ, siêu âm bụng bình thường, để loại trừ viêm ruột thừa, người thầy thuốc cần những kết quả cận lâm sàng nào sau đây

A. CRP âm tính, Bạch cầu<9000, bạch cầu đa nhân trung tính<70% và CT scan

không ghi nhận hình ảnh viêm ruột thừa

B. Bạch cầu<9000, bạch cầu đa nhân trung tính<70% và CT scan không ghi nhận hình ảnh viêm ruột thừa

CRP âm tính và Bạch cầu<9000/mm3, bạch cầu đa nhân trung tính<70%

- D. CRP âm tính và CT scan không ghi nhận hình ảnh viêm ruột thừa
- E. CT scan không ghi nhận hình ảnh viêm ruột thừa
- 53. Chọc rửa ổ bụng được gọi là dương tính khi
  - A. Hồng cầu >500.000/mm3, bạch cầu >5.000/mm3
  - B. Hồng cầu >50.000/mm3, bạch cầu >50/mm3
- Hồng cầu >100.000/mm3, bạch cầu >500/mm3
- D. Hồng cầu >100.000/mm3, bạch cầu >5.000/mm3
  - E. Hồng cầu >50.000/mm3, bạch cầu >500/mm3
- 54. Tiên lượng ung thư dạ dày phụ thuộc vào. CHỌN CÂU SAI
- A. Giai đoạn bệnh
- B. Tính biệt hóa của mô ung thư
- C. Phương pháp và chất lượng phẫu thuật
- D. Vị trí thương tôn Giới tính
- 55. Chụp X-quang đường mật, CHON CÂU SAI
  - A. Chup đường mật trong mổ là phương pháp kinh điển để tìm sỏi trong gan

Chụp mật qua da là phương pháp hay dùng nhất để chẩn đoán sởi mật

D. Là phương pháp khảo sát cây đường mật phổ biến

- E. Chụp mật qua nội soi mật tụy ngược dòng có độ chính xác cao
- 56. Cận lâm sàng nào có giá trị nhất trong chẩn đoán ung thư tụy Chụp cắt lớp vi tính
  - B. Siêu âm
  - C. Chụp đường mật
  - D. CA 19-9
  - E. Chụp động mạch
- 57. Chân đóan phân biệt của triệu chứng sa trĩ với

Cách chọn: chọn A→ B C D E Bỏ A, chọn D→

(chỉ được chọn tối đa 2 lần).

9

N

the with

## ĐÈ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 HỌC KỈ I - Y6 (NH 2012-2013) NGÀY 09/12/2012 (45 PHÚT)

Chon một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chỉ, bút xóa và mực đỏ

Sa true trang

B. Ung thu true trang

C. Polype true trang

D. Ung thư ông hậu môn

E. Nút hậu môn

58. Triệu chứng của hẹp môn vị. CHON CÂU SAI

A. Dâu hiệu Bouveret

B. Dau bung

Nôn ra thức ăn chưa được tiêu hóa kèm cảm giác đẳng

D. Cảm giác đầy bụng âm ạch

E. Bụng có hình lõm lòng thuyền

59. Soi ổ bụng chấn đoán. CHON CÂU SAI

A. Giảm tỉ lệ mở bụng trắng

Có giá trị cao trong chấn đoán vết thương thấu bụng Có giá trị cao trong chẩn đoán thương tổn gan, lách

Thường phải gây mê bệnh nhân

E. Có giá trị cao trong chấn đoán thương tổn cơ hoành

60. Bệnh nhân, nam 76 tuổi, có biểu hiện của nhọt chùm ở vùng lưng, bệnh khởi phát 8 ngày. Khi thăm khám có các tình trạng cao huyết áp, suyễn, viêm xoang, viêm dạ dày, thoái hóa khớp, gầy ốm do ăn uống kém. Yếu tố nào được xem là yếu tố thuận lợi nhất gây nhọt chùm ở bệnh nhân này

A. Suyễn

B. Viêm da dày

C. Thoái hóa khóp

D. Viêm xoang

Suy dinh dưỡng