
(a) Shifted Kernel $K_1 = \frac{1}{\pi}\widetilde{W}$ vs. F_{off}
Ξ: $d = 0$ ($\frac{1}{\pi}L_1(\Xi; t)$)
Ξ: $d = 0.20$ ($\frac{1}{\pi}\widetilde{W}$)
$F_{\text{off}}/20$: $d = 0.15$ (off-line zero)
Envelope-scaled $e^{\pi t/2}K_1(t - id, t - id)$
Spectral height t
(b) Order-m Jet $\frac{m}{(m!)^2}d^{2m-2}$ ($m = 1, \ldots, 4$)
Normalized $\widetilde{W}_{f_m}(d, \gamma_1)/(f_m^{(m)}(\gamma_1))^2$
$m = 1$: slope $2m - 2 = 0$
$m = 2$: slope $2m - 2 = 2$
$m = 3$: slope $2m - 2 = 4$
$m = 4$: slope $2m - 2 = 6$
Transverse offset d
(c) Real ($\mu > 0$) vs. Off-Line ($\mu < 0$) Bowl
Real pair ($\mu = +\delta^2$), $d = 0$
Real pair ($\mu = +\delta^2$), $d = 0.06$
Off-line pair ($\mu = -\delta_0^2$), $d = 0$
Off-line pair ($\mu = -\delta_0^2$), $d = 0.06$
Local parity-reduced $\widetilde{W}_f(d, \tau_* + \tau)$
Local offset $\tau = t - \tau_*$