
(a) Bounded $b_n^{\mathcal{E}}(10) \in [0,1]$ vs. Möbius
Residual coefficient b_n
Dirichlet index n
Unit ceiling $b_n = 1$
Window $10 < n < 11^2$
Truncated Möbius $b_n^{\mu}(10)$
Exponential $b_n^{\mathcal{E}}(10) \in [0,1]$
(b) $1/d$ Singularity of E_X vs. Smooth $\mathcal{M}_X^{\mathrm{sym}}$
Intrinsic multiplier term $|d^{-1}W_{1,\mathcal{M}}|$
Transverse offset d
$|d^{-1}W_{1,E_7}(d, 18.5)| \sim c/d$ (non-real on $\mathbb{R}$)
$|\widetilde{W}_{1,\mathcal{M}_7^{\mathrm{sym}}}(d, 18.5)| = \mathcal{O}(1)$ (Schwarz-real)
(c) Strip Residue Jump Across $d_0 = 0.30$
Convolved zero contribution $\Delta\mathcal{L}_U(d,t)$
Transverse abscissa $d = \sigma - 1/2$
Zero abscissa $d_0 = 0.30$
Euler line $d = 1/2$ ($\sigma = 1$)
Naive $\sigma > 1$ continuation
Exact integral (jump $-2\pi \mathrm{Re}\, K_U$)