
Wann kippt die Prognose in C?

Zwei unabhängig veränderte Gewichte zeigen, bei welcher Mischung die Interferenz die Grenze 1/21 überschreitet. Das Zweiggewicht für eine späte Schichtbreite von zwei oder drei bleibt im gesamten Quadrat über 99 %.

ZWEIDIMENSIONALE ROBUSTHEITSKARTE



Wie die Achsen zu lesen sind

0 % steht jeweils für die ursprüngliche Symmetriegewichtung, 100 % für den entsprechenden Anteil aus der Gleichzählung der 840 Geometrien. α mischt die Gesamtgewichte der Breitenklassen, β die Gewichte der Geometrien innerhalb jeder Klasse. Für jedes β gibt es genau eine Grenze. Auf der Grenze besteht das Gate.

Was die Rechnung absichert

Für jedes β besteht das Gate bis mindestens α = 21,2 %. Ab α = 23,9 % scheitert es für jedes β. Die Kurve verbindet 101 einzeln eingeschlossene Grenzpunkte. Die Aussagen über die ganze Fläche folgen aus Bernstein-Koeffizienten in 160-Bit-Intervallarithmetik. Alle vier publizierten Eckwerte wurden reproduziert.

Modellgrenze

Feste Randfamilie C und feste Dynamik aus PR 211. Die Achsen sind diagnostische Eingriffe. Ein physikalisches Fortsetzungsmass und eine kalibrierte Einzelordnungsobservable bleiben offen.