Nutramigen PURAMINO® JUNIOR

En hypoallergen spesialnæring basert på frie aminosyrer
Et næringsmiddel til spesielle medisinske formål



Indikasjoner
Til kostbehandling av:
- Alvorlig kumelkproteinallergi
- Multiple matvallergier
- Når et høygradig hydrolysat ikke har hatt effekt
- Andre indikasjoner som krever elementaldiett inkl. eosinofil øsofagitt og manglende vekst

Bruksområde
Nutramigen PURAMINO JUNIOR er ernæringsmessig fullverdig og kan brukes fra 1-års alder og fremover. Den kan benyttes som en del av en variert kost som barnets melk og/eller brukes som berikning i barnets mat. Produktet kan også brukes som barnets eneste næringskilde ved for eksempel sonding.[1] Produktet skal ikke brukes parenteralt.

Fakta
- Basert på 100 % frie aminosyrer
- Inneholder 33 % MCT-olje# som er gunstig for barn med ulike malabsorpsjonstilstander[2]
- Laktosefri
- Inneholder DHA (dokosaheksaensyre) i mengder som anbefales av EFSA[3]
- Kosher og halalsertifisert
- Uten smakstilsetning

Tilberedning
1. Vask hendene grundig. Vask og kok flasker, smokker, lokk og andre redskaper (minst 5 minutter i kokende vann).
2. Kok opp rent vann. Kjøl ned til 70 grader. Hell ønsket mengde vann i en ren flaske.
3. Fyll måleskjeen med pulver (måleskjeen skal **kun** brukes til å måle pulver). Ikke press pulveret ned i måleskjeen. Stryk av måleskjeen med baksiden av en ren, tørr kniv. Ha i det riktige antallet måleskjeer i flasken, og oppbevar måleskjeen **tørr** i boksen.
4. Lukk flasken, snu og rist godt til pulveret er helt oppløst. I en kopp røres rundt til produktet er jevnt. Kjøl blandingen ned til spisetemperatur før du gir den til barnet. Kontrollér temperaturen på innsiden av håndleddet.
5. **Når spesialnæringen er tilberedt, har den svært kort holdbarhet.** Gi den til barnet umiddelbart etter at den er tilberedt, innen to timer, eller dekk den til og sett den i kjøleskap ved 2-4°C i maksimalt 24 timer. Når du har begynt å gi barnet spesialnæringen, skal den brukes innen én time eller kastes. **Tilberedt spesialnæring må ikke fryses.**

Veiledende dosering
Det anbefalte inntaket av **Nutramigen PURAMIO JUNIOR** bestemmes av lege eller dietetiker og avhenger av barnets alder, kroppsvekst, type medisinsk tilstand og inntaket av andre matvarer.
- 1 strøken måleskje (6,8 g) til 30 ml vann gir en konsentrasjon på ca. 1 kcal/ml.
- 20,4 gram pulver (3 måleskjeer) + 90 ml vann = ca. 100 ml ferdig blanding.

Holdbarhet
Boksen skal oppbevares tørt i romtemperatur. Etter åpning skal boksen oppbevares tett lukket og tørt, og innholdet må brukes innen 1 måned. Ikke frys pulveret og unngå sterk varme.

Distribusjon
NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR kan forskrives på blå resept av lege eller kjøpes reseptfritt på apotek. Varenummer: 830756

Pakning
Boks 400 g

Av toltalt fett, MCT = mellomlange kjedede triglyserider

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Nutramigen PURAMINO* JUNIOR

INGREDIENSER:

GLUKOSESIRUP, VEGETABILSKE OLJER (SOLSIKKEOLJE MED HØYT OLJESYREINNHOLD, MELLOMLANGE KJEDEDE TRIGLYSERIDER FRA KOKOSNØTT/PALMEKJERNE (7,3 %), SOYA), MODIFISERT TAPIOKASTIVELSE, KALIUMASPERTAT, L-LEUCIN, L-LYSINHYDROKLORID, L-PROLIN, L-ALANIN, KALSIUMFOSFAT, L-VALIN, L-ISOLEUCIN, MONONATRIUM-GLUTAMAT, L-TREONIN, L-SERIN, L-TYROSIN, L-ASPARTAT, L-ARGININ, L-FENYLALANIN, MAGNESIUMFOSFAT, KALSIUMSITRAT, L-HISTIDIN, L-CYSTIN, GLYSIN, L-TRYPTOFAN, L-METIONIN, NATRIUMSITRAT, OLJE FRA MIKROALGEN *SCHIZOCHYTRIUM SP.*, KOLINKLORID, INOSITOL, VITAMIN C (ASKORBINSYRE), TAURIN, JERNSULFAT, SINKSULFAT, L-KARNITIN, VITAMIN E (DL-ALFA-TOKOFERYL-ACETAT), NIACIN (NIKOTINAMID), PANTOTENSYRE (KALSIUMPANTOTENAT), KOBBERSULFAT, VITAMIN A (RETINYL PALMITAT), VITAMIN B6 (PYRIDOKSINHYDROKLORID), MANGANSULFAT, TIAMIN (TIAMINHYDROKLORID), RIBOFLAVIN, VITAMIN D (KOLEKALSIFEROL), NATRIUMJODID, FOLSYRE, NATRIUMMOLYBDAT, NATRIUMSELENITT, KROMKLORID, VITAMIN K (FYTOMENADION), BIOTIN (D-BIOTIN), VITAMIN B12 (CYANOKOBALAMIN).



NÆRINGSINNHOLD	ENHET	PER 100 G PULVER	PER 100 ML FERDIG BLANDING**
ENERGI	KJ (kcal)	2050 (490)	285 (68)
FETT	g	22	4,5
HVORAV			
- METTEDE FETTSYRER	g	8,3	1,69
- LINOLENSYRE	g	2,9	0,59
- α-LINOLENSYRE	mg	310	63
- DOKOSAHEKSAENSYRE (DHA)	mg	113	23
KARBOHYDRATER	g	59	12,1
HVORAV SUKKERARTER	g	5,3	1,08
PROTEIN	g	13,7	2,8
SALT	g	0,49	0,1
VITAMIN A, RE	µg	300	61
VITAMIN D	µg	6,75	1,4
VITAMIN E, α-TE	mg	5,9	1,2
VITAMIN K	µg	19,6	4
VITAMIN C	mg	49	10
TIAMIN	mg	0,37	0,075
RIBOFLAVIN	mg	0,49	0,1
NIACIN	mg	4,9	1
VITAMIN B6	mg	0,49	0,1
FOLSYRE	µg	74	15
VITAMIN B12	µg	1,23	0,25
BIOTIN	µg	10,8	2,2
PANTOTENSYRE	mg	2,1	0,43
NATRIUM	mg	196	40
KALIUM	mg	490	100
KLORID	mg	300	61
KALSIUM	mg	490	100
FOSFOR	mg	290	60
MAGNESIUM	mg	78	16
JERN	mg	4,9	1
SINK	mg	4,4	0,9
KOBBER	mg	0,54	0,11
MANGAN	mg	0,28	0,057
SELEN	µg	15,7	3,2
KROM	µg	14,7	3
MOLYBDEN	µg	22	4,5
JOD	µg	74	15
KOLIN	mg	108	22
INOSITOL	mg	83	17
L-KARNITIN	mg	9,8	2
TAURIN	mg	29	6

OSMOLARITET 480 mOsm/L

** 20,4 gram pulver (3 måleskjeer) + 90 ml vann = ca. 100 ml ferdig blanding

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Referanser:

1. Norsk legemiddelhåndbok (2017, 20. febr.). Kap. T23.1.4.1 Enteral ernæring av barn. Oppslagsbok for helsepersonell utgitt av Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
2. Bach AC, Babayan VK. Medium-chain triglycerides: an update. Am J Clin Nutr.1982;36(5):950-62.
3. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union, EFSA Journal 2013;11(10):3408.

* Varemerke tilhører Mead Johnson og Company, LLC © 2024 Mead Johnson & Company, LLC. Alle rettigheter forbeholdes.

RKT-M-49058

SCANDINAVIAN BIOPHARMA

Scandinavian Biopharma
Industrivägen 1, 171 48 Solna, Sverige
Kundesenter: 23 96 23 00