

Tutorium 1

Dienstag, 28. April 2020 11:48

Aufgabe 1:

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

- a) Bestimmen Sie die Definitheit der Matrizen **A** und **B**
- b) Führen Sie für Matrix **C** eine Spektralzerlegung durch

a) $\det(B_{\text{sym}} - \lambda I)$ B ist nicht sym.!

$$\Rightarrow B_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(B + B^T) = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\right) \\ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2.5 \\ 2.5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2.5 \\ 2.5 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) - 2.5^2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$4 - \lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 6.25 = \lambda^2 - 5\lambda - 2.25 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 1 \cdot (-2.25)}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm \sqrt{34}}{2}$$

$$\lambda_1 = 5.41 \quad \lambda_2 = -0.415$$

$\Rightarrow B$ ist indefinit

1b) Spektralzerlegung \rightarrow EW & EV

$$\det(C - \lambda \cdot I) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\det\begin{pmatrix} 6-\lambda & -3 \\ -3 & 6-\lambda \end{pmatrix} = (6-\lambda)^2 - 9 \stackrel{!}{=} 0$$

$$(6-\lambda)^2 = 9 \quad (\Leftrightarrow) \quad 6-\lambda = \pm 3$$

$$\lambda = 6 \pm 3 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 9$$

$$\underline{\lambda_1 = 3}: \text{EV} \quad (C - \lambda I) \cdot x = 0$$

$$\begin{pmatrix} 6-3 & -3 \\ -3 & 6-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{I. } 3x_1 - 3x_2 = 0 \Leftrightarrow 3x_1 = 3x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

$$\text{II. } -3x_1 + 3x_2 = 0 \Leftrightarrow 3x_2 = 3x_1 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |u_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Eigenvektor

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\lambda_2 = 9}} \quad \begin{pmatrix} 6-9 & -3 \\ -3 & 6-9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-3x_1 - 3x_2 = 0 \Leftrightarrow -3x_1 = 3x_2 \Leftrightarrow -x_1 = x_2$$


$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow |u_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\rightarrow v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2) Q^T$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = Q^T$$

$$\operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$



$$C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2:

Gegeben sei die Matrix

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie die Cholesky-Zerlegung $D = LL^T$

$$l_{ii} = (a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$l_{ji} = \frac{1}{l_{ii}} (a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} (l_{jk} l_{ik}))$$

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}$$

$$l_{11} = \left(4 - \sum_{k=1}^{1-1} l_{1k}^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (4)^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$l_{21} = \frac{1}{2} \left(2 - \sum_{k=1}^0 \dots \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

$$l_{12} = \left(5 - \sum_{k=1}^1 l_{2k}^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(5 - l_{21}^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (5 - 1^2)^{\frac{1}{2}} = (4)^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$l_{31} = \frac{1}{2} \left(0 - \sum_{k=1}^0 l_{3k} l_{1k} \right) = 0$$

$$l_{32} = \dots = 1$$

$$l_{33} = \dots = 2$$

$$D = L \cdot L^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$