

**Exercício 1** .....

Sejam  $OABC$  um tetraedro e  $M$  o ponto médio do segmento  $\overline{BC}$ .

- (a) Explique por que o conjunto  $\mathcal{E} = \{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\}$  é uma base para  $V^3$ .

**Solução:** Os três vetores em questão não são todos paralelos a um mesmo plano, e portanto são LI, e constituem uma base ordenada para  $V^3$ .

- (b) Determine as coordenadas do vetor  $\overrightarrow{AM}$  em relação à base acima.

**Solução:** Podemos escrever  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}$ , e como  $M$  é o ponto médio do segmento  $\overline{BC}$ , o vetor  $\overrightarrow{OM}$  representa a mediana do triângulo  $OBC$ , e assim  $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ . Assim temos

$$\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC},$$

e portanto

$$\overrightarrow{AM} = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)_{\mathcal{E}}$$

**Exercício 2** .....

Seja  $\mathcal{E} = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$  uma base ordenada de  $V^3$  e  $\vec{x}$  um vetor qualquer de  $V^3$ . Sabemos que existem únicos  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tais que  $\vec{x} = (a, b, c)_{\mathcal{E}}$ . Mostre que o conjunto

$$\{\vec{u} + \vec{x}, \vec{v} + \vec{x}, \vec{w} + \vec{x}\}$$

é LI se, e somente se,  $a + b + c + 1 \neq 0$ .

**Solução:** Tome  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  tais que

$$\alpha(\vec{u} + \vec{x}) + \beta(\vec{v} + \vec{x}) + \gamma(\vec{w} + \vec{x}) = \vec{0}. \quad (1)$$

Os vetores em questão serão LI se, e somente se, pudermos mostrar que obrigatoriamente  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ . Note que, usando que  $\vec{x} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$ , a equação (1) é equivalente a

$$[\alpha + a(\alpha + \beta + \gamma)]\vec{u} + [\beta + b(\alpha + \beta + \gamma)]\vec{v} + [\gamma + c(\alpha + \beta + \gamma)]\vec{w} = \vec{0},$$

e como  $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$  é uma base, eles são LI, e portanto

$$\begin{cases} \alpha + a(\alpha + \beta + \gamma) = 0, \\ \beta + b(\alpha + \beta + \gamma) = 0, \\ \gamma + c(\alpha + \beta + \gamma) = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Somando as três equações obtemos  $(a + b + c + 1)(\alpha + \beta + \gamma) = 0$ . Assim se  $a + b + c + 1 \neq 0$  temos  $\alpha + \beta + \gamma = 0$ , e assim o sistema (2) nos dá  $\alpha = \beta = \gamma = 0$  e os vetores  $\vec{u} + \vec{x}, \vec{v} + \vec{x}, \vec{w} + \vec{x}$  são LI. Reciprocamente, se  $\vec{u} + \vec{x}, \vec{v} + \vec{x}, \vec{w} + \vec{x}$  são LI, então  $\alpha = \beta = \gamma = 0$  é a única solução do sistema (2) que pode ser reescrito na forma matricial  $Ax = b$ , onde

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & a & a \\ b & b+1 & b \\ c & c & c+1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Isto nos dá que  $\det(A) \neq 0$ , e conclui o resultado, já que

$$\det(A) = a + b + c + 1.$$

**Exercício 3** .....

Fixe uma base ordenada  $\mathcal{E}$  de  $V^3$ . Encontre o valor de  $m \in \mathbb{R}$  para que, em cada um dos itens, os vetores sejam LD.

- (a)  $(3, 5, 1)_{\mathcal{E}}, (2, 0, 4)_{\mathcal{E}}, (1, m, 3)_{\mathcal{E}}$ .

**Solução:** Sabemos que os vetores em questão serão LD se, e somente se,

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & m & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

Resolvendo a equação para  $m$ , encontramos  $m = -1$ .

- (b)  $(1, 3, 5)_{\mathcal{E}}, (2, m+1, 10)_{\mathcal{E}}$ .

**Solução:** Neste caso, os vetores serão LD se, e somente se, forem paralelos, isto é, existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que

$$(2, m+1, 10)_{\mathcal{E}} = \alpha(1, 3, 5)_{\mathcal{E}}.$$

Assim, se tal  $\alpha$  existe, usando a primeira (ou a terceira) coordenada, obtemos  $\alpha = 2$ . Assim devemos ter  $m+1 = 6$ , e portanto  $m = 5$ .

**Exercício 4** .....

Sejam  $\mathcal{E}$  uma base ordenada,  $\vec{u} = (2, -2, -4)_{\mathcal{E}}, \vec{v} = (0, -1, -3)_{\mathcal{E}}$ . Os vetores  $\vec{w} = (1, -2, 3)_{\mathcal{E}}$  e  $\vec{x} = (4, 0, 13)_{\mathcal{E}}$  podem ser escritos como combinação linear de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ ? Justifique sua resposta.

**Solução:** Assuma que  $\vec{w}$  pode ser escrito como combinação linear de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ . Então existem  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tais que

$$(1, -2, 3)_{\mathcal{E}} = \alpha(2, -2, -4)_{\mathcal{E}} + \beta(0, -1, -3)_{\mathcal{E}},$$

o que nos dá o sistema

$$\begin{cases} 2\alpha = 1 \\ -2\alpha - \beta = -2, \\ -4\alpha - 3\beta = 3, \end{cases}$$

que é um SI, e portanto  $\vec{w}$  não pode ser escrito como combinação linear de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ . Fazendo o raciocínio análogo para  $\vec{x}$  obtemos também um SI, e assim  $\vec{x}$  também não pode ser escrito como combinação linear de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .

**Exercício 5** .....

Sejam  $\mathcal{E}$  uma base ordenada de  $V^3$ ,  $\vec{u} = (1, 2, 2)_{\mathcal{E}}, \vec{v} = (m-1, 1, m-2)_{\mathcal{E}}$  e  $\vec{w} = (m+1, m-1, 2)_{\mathcal{E}}$ . Determine  $m \in \mathbb{R}$ , se possível, para que:

- (a)  $\vec{u}$  seja combinação linear de  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$ .

**Solução:** Para que  $\vec{u}$  seja combinação linear de  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  devem existir  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tais que

$$\begin{cases} (m-1)\alpha + (m+1)\beta = 1 \\ \alpha + (m-1)\beta = 2, \\ (m-2)\alpha + 2\beta = 2. \end{cases}$$

Mas somando a segunda e a terceira linha deste sistema obtemos  $(m-1)\alpha + (m+1)\beta = 4$ , e comparando com a primeira linha, vemos que se trata de um SI. Logo não é possível encontrar  $m$  para que  $\vec{u}$  seja combinação linear de  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$ .

(b)  $\vec{u}, \vec{v}$  e  $\vec{w}$  sejam LD.

**Solução:** Devemos neste caso encontrar  $m$  para que

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ m-1 & 1 & m-2 \\ m+1 & m-1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Isto é equivalente a  $m^2 - 3m = 0$ , ou seja,  $m = 0$  ou  $m = 3$ .

### Exercício 6 .....

Seja  $\mathcal{E}$  uma base ordenada de  $V^3$ . Determine  $m \in \mathbb{R}$ , se possível, para que os vetores em cada item abaixo sejam LD.

(a)  $(m, 1, m)_{\mathcal{E}}, (1, m, 1)_{\mathcal{E}}$ .

**Solução:**  $m = 1$  ou  $m = -1$ .

(b)  $(1 - m^2, 1 - m, 0)_{\mathcal{E}}, (m, m, m)_{\mathcal{E}}$ .

**Solução:**  $m = 0$  ou  $m = 1$ .

(c)  $(m, 1, m+1)_{\mathcal{E}}, (1, 2, m)_{\mathcal{E}}, (1, 1, 1)_{\mathcal{E}}$ .

**Solução:** Não existe  $m$  para o qual os três vetores sejam LD.

(d)  $(m, 1, m+1)_{\mathcal{E}}, (0, 1, m)_{\mathcal{E}}, (0, m, 2m)_{\mathcal{E}}$ .

**Solução:**  $m = 0$  ou  $m = 2$ .

### Exercício 7 .....

Sejam  $\mathcal{E} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$  uma base ordenada de  $V^3$  e defina

$$\vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \quad \vec{f}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad \vec{f}_3 = \vec{e}_1.$$

Mostre que  $\mathcal{F} = \{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  é uma base ordenada de  $V^3$  e encontre as coordenadas do vetor  $\vec{u} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_3$  em relação às bases  $\mathcal{E}$  e  $\mathcal{F}$ .

**Solução:** Para mostrar que  $\mathcal{F}$  é uma base ordenada, basta mostrar que  $\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3$  são LI. Para isso seja

$$\alpha \vec{f}_1 + \beta \vec{f}_2 + \gamma \vec{f}_3 = \vec{0}.$$

Devemos mostrar que  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ . Mas esta igualdade acima é equivalente a

$$(\alpha + \beta + \gamma)\vec{e}_1 + (\alpha + \beta)\vec{e}_2 + \alpha\vec{e}_3 = \vec{0},$$

o como  $\mathcal{E}$  é uma base, temos

$$\alpha + \beta + \gamma = \alpha + \beta = \alpha = 0,$$

o que nos dá  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ , e mostra que  $\mathcal{F}$  é uma base ordenada de  $V^3$ .

Agora, claramente  $\vec{u} = (-3, 0, -1)_{\mathcal{E}}$ . Note que  $\vec{e}_1 = \vec{f}_3$  e que  $\vec{e}_3 = \vec{f}_1 - \vec{f}_2$ , assim

$$\vec{u} = -3\vec{f}_3 - \vec{f}_1 + \vec{f}_2,$$

e assim  $\vec{u} = (-1, 1, -3)_{\mathcal{F}}$ .

Outra maneira é ver que a matriz mudança de base de  $\mathcal{E}$  para  $\mathcal{F}$  é

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

e sua inversa, que é  $\mathcal{M}_{\mathcal{F}\mathcal{E}}$  é dada por

$$\mathcal{M}_{\mathcal{F}\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

e assim

$$(\vec{u})_{\mathcal{F}} = \mathcal{M}_{\mathcal{F}\mathcal{E}}(\vec{u})_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

### Exercício 8 .....

Sejam  $\mathcal{E}$  uma base ordenada de  $V^3$ ,  $\vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$ ,  $\vec{f}_2 = m\vec{e}_1 + 2m\vec{e}_2 - \vec{e}_3$  e  $\vec{f}_3 = 4\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$ .

- (a) Para quais valores de  $m \in \mathbb{R}$  o conjunto  $\mathcal{F} = \{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  forma uma base ordenada de  $V^3$ ?

**Solução:** Para que seja uma base, devemos ter (por quê?)

$$\begin{vmatrix} 1 & m & 0 \\ 1 & 2m & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0,$$

o que nos dá  $m \neq -\frac{4}{7}$ .

- (b) Encontre  $m \in \mathbb{R}$ , se possível, para o qual o vetor  $\vec{u} = (1, 2, -1)_{\mathcal{E}}$  satisfaça  $\vec{u} = (0, 1, 0)_{\mathcal{F}}$ .

**Solução:** Sabemos que

$$(\vec{u})_{\mathcal{E}} = \mathcal{M}_{\mathcal{E}\mathcal{F}}(\vec{u})_{\mathcal{F}},$$

assim devemos ter

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m & 0 \\ 1 & 2m & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Encontramos então  $m = 1$ . (Note que neste caso, simplesmente encontramos que  $\vec{f}_2 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3$ .)

### Exercício 9 .....

Sejam  $\mathcal{E} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$  uma base ordenada de  $V^3$ ,  $\vec{f}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$ ,  $\vec{f}_2 = \vec{e}_2 - \vec{e}_3$  e  $\vec{f}_3 = 3\vec{e}_3$ .

- (a) Mostre que  $\mathcal{F} = \{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  é uma base ordenada de  $V^3$ .

**Solução:** Basta mostrar que  $\mathcal{F}$  é LI. De fato, se  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  são tais que

$$\alpha \vec{f}_1 + \beta \vec{f}_2 + \gamma \vec{f}_3 = \vec{0},$$

então

$$\alpha \vec{e}_1 + (\beta - \alpha) \vec{e}_2 + (3\gamma - \beta) \vec{e}_3 = \vec{0},$$

e como  $\mathcal{E}$  é LI, temos  $\alpha = \beta - \alpha = 3\gamma - \beta = 0$ , o que implica que  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ , e portanto  $\mathcal{F}$  constitui uma base ordenada para  $V^3$ .

Equivalentemente, podemos simplesmente notar que

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0,$$

para concluir que  $\mathcal{F}$  é LI.

- (b) Encontre  $m$ , se possível, para que os vetores  $\vec{u} = (0, m, 1)_{\mathcal{E}}$  e  $\vec{v} = (0, 1, -1)_{\mathcal{F}}$  sejam LD.

**Solução:** Primeiro vamos encontrar as coordenadas de  $\vec{v}$  na base  $\mathcal{E}$ . Temos

$$\vec{v} = (0, 1, -1)_{\mathcal{F}} = \vec{f}_2 - \vec{f}_3 = \vec{e}_2 - \vec{e}_3 - e\vec{e}_3 = \vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 = (0, 1, 4)_{\mathcal{E}}.$$

Agora para que  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  sejam LD, eles devem ser paralelos, ou seja, deve existir  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $\vec{u} = a\vec{v}$ . Assim

$$(0, m, 1)_{\mathcal{E}} = a(0, 1, 4)_{\mathcal{E}},$$

e nos dá  $m = a$  e  $1 = -4a$ , assim obtemos  $m = -\frac{1}{4}$ .

### Exercício 10 .....

Sejam  $\mathcal{E} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$  uma base ordenada de  $V^3$ ,  $\vec{f}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 - \vec{e}_3$ ,  $\vec{f}_2 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3$  e  $\vec{f}_3 = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 4\vec{e}_3$ .

- (a) Verifique que  $\mathcal{F}$  é uma base ordenada de  $V^3$ .

**Solução:** Note que

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 12 \neq 0,$$

e portanto  $\mathcal{F}$  é uma base de  $V^3$ .

- (b) Encontre a matriz mudança de base de  $\mathcal{E}$  para  $\mathcal{F}$ .

**Solução:** Por definição, a matriz é dada por:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- (c) Sendo  $\vec{u} = 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3$ , encontre a expressão do vetor  $\vec{u}$  na base  $\mathcal{F}$ .

**Solução:** Vamos encontrar as coordenadas de  $\vec{u}$  em relação à base  $\mathcal{F}$ , usando a matriz  $\mathcal{M}_{\mathcal{F}\mathcal{E}}$ , que é a inversa da matriz  $\mathcal{M}_{\mathcal{E}\mathcal{F}}$ . Calculando a inversa (confira o cálculo da inversa, com o passo a passo do Método da Eliminação de Gauss-Jordan, no site <https://>

//matrixcalc.org/pt/) temos

$$\mathcal{M}_{\mathcal{F}\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Assim

$$(\vec{u})_{\mathcal{F}} = \mathcal{M}_{\mathcal{F}\mathcal{E}}(\vec{u})_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{19}{12} \\ -\frac{11}{4} \\ \frac{25}{12} \end{pmatrix},$$

ou seja,  $\vec{u} = \frac{19}{12}\vec{f}_1 - \frac{11}{4}\vec{f}_2 + \frac{25}{12}\vec{f}_3$ .

### Exercício 11 .....

Sejam  $\mathcal{E}$  e  $\mathcal{F}$  duas bases ordenadas de  $V^3$  e  $\vec{u} = (x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{E}} = (y_1, y_2, y_3)_{\mathcal{F}}$ . Suponha que

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - y_3, \\ x_2 = y_1 + 2y_2 + y_3, \\ x_3 = 2y_1 + y_2 + 4y_3. \end{cases}$$

Determine, se possível, a matriz mudança de base de  $\mathcal{E}$  para  $\mathcal{F}$ .

**Solução:** Não é possível determinar a matriz mudança de base somente com essa informação. De fato, se o vetor  $\vec{v}$  for o vetor nulo, então as bases  $\mathcal{E}$  e  $\mathcal{F}$  podem ser quaisquer. Mesmo que  $\vec{v}$  não seja nulo não é possível dizer nada. Por exemplo, suponha  $\vec{v} = (1, 0, 0)_{\mathcal{F}}$ . Logo  $\vec{v} = (1, 1, 2)_{\mathcal{E}}$ . Qualquer matriz da forma

$$A = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 2 & * & * \end{pmatrix} \text{ com } \det(A) \neq 0,$$

poderia ser uma matriz de mudança de base de  $\mathcal{E}$  para  $\mathcal{F}$ , onde  $*$  representa um número qualquer.

### Exercício 12 .....

Seja  $\mathcal{E}$  uma base ordenada de  $V^3$ . Qual o valor de  $x \in \mathbb{R}$  para que os vetores  $\vec{u} = (3, -x, -2)_{\mathcal{E}}$ ,  $\vec{v} = (3, 2, x)_{\mathcal{E}}$  e  $\vec{w} = (1, -3, 1)_{\mathcal{E}}$  sejam paralelos a um mesmo plano no espaço?

**Solução:** Para que  $\vec{u}, \vec{v}$  e  $\vec{w}$  sejam paralelos a um mesmo plano no espaço, eles devem ser LD, ou seja, devemos ter

$$\begin{vmatrix} 3 & -x & -2 \\ 3 & 2 & x \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

ou seja,  $x^2 - 12x - 28 = 0$ , o que nos dá  $x = 14$  ou  $x = -2$ .

### Exercício 13 .....

Seja  $\mathcal{E}$  uma base ordenada de  $V^3$ .

(a) Para quais valores de  $a, b \in \mathbb{R}$  os vetores  $\vec{u} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$  e  $\vec{v} = 2\vec{e}_1 + (a - b)\vec{e}_2 + \vec{e}_3$  são LI em  $V^3$ ?

**Solução:** Determinaremos antes para quais valores de  $a, b \in \mathbb{R}$  os vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  são LD em  $V^3$ , e para tal, deve existir  $\gamma \in \mathbb{R}$  tal que

$$(a, b, 3)_\mathcal{E} = \gamma(2, a - b, 1)_\mathcal{E}.$$

Assim encontramos  $\gamma = 3$ , e teremos  $a = 6$  e  $b = \frac{9}{2}$ . Desta maneira, para qualquer par de números  $(a, b)$  com  $(a, b) \neq (6, \frac{9}{2})$ , os vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  serão LI.

- (b) Encontrar uma base ordenada  $\mathcal{F} = \{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  de  $V^3$  tal que se  $\vec{u} = (1, 2, 3)_\mathcal{E}$ , tenhamos  $\vec{u} = (1, 0, 0)_\mathcal{F}$ .

**Solução:** Definindo  $\vec{f}_1 = \vec{u}$ , já garantimos que  $\vec{u} = (1, 0, 0)_\mathcal{F}$ . Nos resta definir  $\vec{f}_2$  e  $\vec{f}_3$  de modo que  $\mathcal{F}$  seja uma base. Por exemplo, tomando  $\vec{f}_2 = \vec{e}_2$  e  $\vec{f}_3 = \vec{e}_3$ , temos

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

e portanto  $\mathcal{F} = \{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  é uma base ordenada de  $V^3$ .

- (c) Qual a relação deve haver entre  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  para que os vetores  $\vec{u} = (1, 1, 1)_\mathcal{E}$ ,  $\vec{v} = (1, \alpha, \alpha^2)_\mathcal{E}$  e  $\vec{w} = (1, \beta, \beta^2)_\mathcal{E}$  sejam LD?

**Solução:** Devemos ter

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \end{vmatrix} = \alpha\beta^2 - \alpha^2\beta + \alpha^2 - \beta^2 + \beta - \alpha = 0,$$

isto é,  $(\beta - \alpha)(\alpha(\beta - 1) + 1 - \beta) = 0$ . Assim  $\alpha = \beta$  ou  $\alpha(\beta - 1) = \beta - 1$ .

Analisando a segunda relação, vemos que ela está satisfeita para qualquer valor de  $\beta$  se  $\alpha = 1$ , também para qualquer valor de  $\alpha$  se  $\beta = 1$ .

Resumidamente, as relações são

- $\alpha = \beta$ , ou;
- $\alpha$  qualquer e  $\beta = 1$ , ou;
- $\alpha = 1$  e  $\beta$  qualquer.

#### Exercício 14.....

Sejam  $\mathcal{E}$  base ordenada de  $V^3$ ,  $\mathcal{F} = \{(1, 1, 1)_\mathcal{E}, (1, 2, 0)_\mathcal{E}, (1, 1, 0)_\mathcal{E}\}$  e  $\mathcal{G} = \{(2, 1, -1)_\mathcal{E}, (3, 0, 1)_\mathcal{E}, (2, 0, 1)_\mathcal{E}\}$ .

- (a) Mostre que  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  são bases ordenadas de  $V^3$ .

**Solução:** De fato, temos

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \quad \text{e} \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

logo ambas  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  são bases ordenadas de  $V^3$ .

- (b) Determine as matrizes mudança de base de  $\mathcal{E}$  para  $\mathcal{F}$  e de  $\mathcal{E}$  para  $\mathcal{G}$ .

**Solução:** Pela definição, temos

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathcal{M}_{\mathcal{E}\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (c) Se  $\vec{u} = (m, 2, 1)_{\mathcal{E}}$ ,  $\vec{v} = (1, 1, 1)_{\mathcal{F}}$  e  $\vec{w} = (2, -1, 1)_{\mathcal{G}}$ , determine se possível  $m \in \mathbb{R}$  para o qual os vetores  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  não formem uma base ordenada de  $V^3$ .

**Solução:** Encontrando as coordenadas de  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  na base  $\mathcal{E}$ , usando as matrizes mudança de coordenadas, obtemos

$$\vec{v} = (3, 4, 1)_{\mathcal{E}} \quad \text{e} \quad \vec{w} = (3, 2, -2)_{\mathcal{E}}.$$

Assim  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  não formarão uma base ordenada de  $V^3$  se forem LD, isto é, se

$$\begin{vmatrix} m & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0,$$

o que nos dá  $m = \frac{6}{5}$ .