



1

## Sinais de alarme

Febre

Dor lombar ou Flanco

Comprometimento do estado geral (adinamia, palidez, vômitos)

Giordano + (Giordano positivo indica grande probabilidade doença renal (litíase e pielonefrite aguda))

2

## Indicação de urocultura

Suspeita de resistência

Gestante

Sexo masculino

Suspeita de ITU alta complicada

Uso de dispositivo em via urinária

### Exames laboratoriais iniciais:

Urina I

Hemograma

Creatinina

PCR

Uréia

3

## Infecção urinária

**NÃO COMPLICADA:** infecção em indivíduos com trato urinário normal e sem alteração de função renal aguda, exceto: diabéticos, litíase renal, doença do trato urinário, história de infecção por germe multirresistente, instrumentação recente do trato urinário.

**COMPLICADA:** infecção em trato urinário superior (pielonefrite) ou inferior (cistite) associada a condições clínicas que aumentam o risco de falência terapêutica: diabetes, gestação, doenças de base ou alterações funcionais ou anatômicas que aumentam risco de infecção, patógeno multirresistente.

4

## Protocolo de ureterolitíase

## Conduta clínica

Analgesia

Hidratação cautelosa

1º opção: Tansulosina 0,4mg / dia - VO (não-padronizada)

2º opção: Doxazosina 4mg / dia - VO (padronizada)