

Estratégia de Recomposição Corporal

Programa de 12 semanas · baseado em evidência

Atleta: Tiago Sousa Amorim · 42 anos · 1,75 m

Base: Avaliação física de 08/06/2026 (85,1 kg · 26,77% GC)

Meta do bloco: recomposição — perder gordura e ganhar músculo

01 Seu ponto de partida

Antes de treinar mais, vale reconhecer o que você já construiu. Entre fevereiro e junho de 2026 você entregou uma das transformações mais difíceis de conseguir: **recomposição corporal real** — perdeu gordura enquanto preservou (e até ganhou) massa magra. Os números:

Indicador	03/02/2026	08/06/2026	Variação
Peso total	93,3 kg	85,1 kg	-8,2 kg
% Gordura	33,95%	26,77%	-7,2 p.p.
Massa gorda	31,7 kg	22,8 kg	-8,9 kg
Massa magra	61,6 kg	62,3 kg	+0,7 kg
IMC	30,5 (obes.)	27,8 (sobrepeso)	-2,7
Cintura	97,5 cm	90,5 cm	-7,0 cm
Abdômen	107,0 cm	100,3 cm	-6,7 cm

Leitura técnica. Perder ~8,9 kg de gordura ganhando massa magra num déficit é exatamente o cenário que a literatura chama de **recomposição**, e ele acontece com mais força em quem parte de um percentual de gordura mais alto — o seu caso (Barakat et al., 2020). Ou seja: você ainda tem uma janela biológica muito favorável pela frente.

Contexto: uso de tirzepatida (desde março/2026)

Parte dessa perda de peso foi favorecida pela tirzepatida (agonista GLP-1/GIP), que reduz o apetite — somada aos seus treinos. Isso importa para a estratégia: nos estudos, **26–40% do peso perdido com esse tipo de medicamento pode ser massa magra** quando não há treino de força e proteína suficientes. Só que você fez o contrário — **preservou e ainda ganhou massa magra**, prova de que treino + proteína estão neutralizando o principal risco do medicamento. A missão do próximo bloco é manter exatamente essa proteção do músculo enquanto a gordura continua caindo. Qualquer ajuste de dose é decisão do médico que prescreveu.

O que a avaliação pede para o próximo bloco:

- **Gordura central ainda é o alvo nº 1.** As dobras subescapular (33 mm), abdominal (50 mm) e supra-íliaca (48 mm) seguem altas, e a relação cintura/quadril ($90,5/102 = 0,89$) está elevada — marcador de risco metabólico que melhora com déficit + força + sono. Não existe redução localizada; o abdômen afina quando a gordura corporal cai.
- **Proteger e reconstruir as pernas.** Coxa proximal caiu de 64,3 → 60,8 cm e panturrilha de 38,5 → 37,0 cm. Parte é gordura, mas parte é volume que queremos de volta — por isso mantemos um dia de Legs completo e pesado, somado ao estímulo do futebol.
- **Braços e antebraços estáveis** (braço contraído ~37,5 cm) — bom sinal de que a massa magra foi preservada. Vamos manter estímulo direto para não perder terreno.

02 O objetivo e a lógica do plano

A meta declarada é **recomposição equilibrada**: continuar reduzindo gordura (rumo aos 16% no médio prazo) e, ao mesmo tempo, ganhar músculo — treinando perto da manutenção calórica. Todo o desenho abaixo serve a essa meta, apoiado em cinco pilares que a ciência do treino considera não-negociáveis:

Pilar	O que fazer	Por quê (evidência)
1. Força com sobrecarga progressiva	4 treinos/semana (Push/Pull/Legs/Upper); tronco 2× por semana, pernas 1× forte + futebol, com carga/reps subindo ao longo do bloco.	É o estímulo que retém e constrói músculo no déficit. Frequência 2× ≥ 1× com volume igualado.
2. Volume na dose certa	≈ 10–16 séries por músculo por semana, subindo por fase.	Relação dose-resposta: ganhos crescem até ~10–20 séries/semana, com retornos decrescentes (Schoenfeld/Krieger).
3. Proximidade da falha (RIR)	Trabalhar a 0–3 repetições da falha, mais intenso nas fases finais.	Hipertrofia ocorre em várias faixas de reps desde que perto da falha.
4. Proteína e calorias	~1,8–2,2 g de proteína por kg/dia; calorias perto da manutenção.	Proteína alta + força no déficit gera ganho de magra e perda de gordura (Longland 2016; Morton 2018).
5. Recuperação e conditioning	Sono 7–9 h, futebol como HIIT, Zona 2 e passos; deload na semana 12.	Sono curto desloca a perda para a massa magra; conditioning acelera a gordura sem "comer" músculo.

03 A semana de treino

Mantemos a divisão que você já conhece — **Push / Pull / Legs / Upper**, 4 treinos por semana — organizada para preencher a quinta e proteger as pernas. Com o Upper somado ao Push e ao Pull, cada grupo do tronco é treinado **2× por semana** (melhor para hipertrofia). As pernas ficam num dia forte e completo, mais o estímulo do futebol. O cuidado central é não colocar Legs logo depois do futebol — por isso ele cai na segunda, descansado.

Dia	Sessão	Foco
Segunda	Legs	Quadríceps, posterior, glúteo, panturrilha
Terça	Push	Peito, ombros, tríceps
Quarta	Futebol (noite)	Condicionamento / HIIT natural
Quinta	Pull	Costas, deltoide posterior, bíceps
Sexta	Descanso ou bike Zona 2	Recuperação / base aeróbica
Sábado	Upper	Corpo superior completo
Domingo	Descanso	Recuperação total

Por que assim: Legs na segunda fica a 48 h do futebol e longe de qualquer outro dia de perna; a quinta deixa de ser vazia com o Pull (tronco, então as pernas descansam do futebol); Push e Upper espaçados garantem peito/ombro 2× por semana. O futebol permanece intocável.

04 Os quatro treinos

Seleção com as máquinas Hammer Strength da sua academia. As **séries** abaixo são a faixa do bloco (o número exato por fase está na Seção 5). Os grupos do tronco aparecem 2× na semana (Push/Pull + Upper); as pernas num dia dedicado.

LEGS — pernas (segunda)

Exercício	Séries	Reps	Alvo / observação
V-Squat	4	6–10	Padrão de força; desça controlado e suba com potência
Leg Press	3	10–12	Pés na largura do quadril; amplitude completa
Cadeira Extensora	3	12–15	Quadríceps isolado; pausa de 1 s no topo
Seated Leg Curl	4	10–12	Posterior de coxa; controle a volta
Glute Drive	3	10–12	Glúteo; segure 1 s na contração
Panturrilha em pé	4	12–15	Pausa embaixo (alongado) e no topo
Panturrilha sentado	3	15	Foco no sóleo; reps controladas

PUSH — peito/ombros/tríceps (terça)

Exercício	Séries	Reps	Alvo / observação
Incline Chest Press	4	6–10	Peitoral superior; principal empurrão do dia
Chest Press	3	8–12	Peitoral médio; não trave os cotovelos
Pec Deck	3	12–15	Isolamento de peito; alongue bem na abertura
Shoulder Press	3	8–12	Deltoide anterior; amplitude confortável
Elevação Lateral	4	12–20	Deltoide lateral; controle total, sem embalo
Pushdown	3	10–15	Tríceps; cotovelos fixos
Tríceps Iso	3	10–12	Extensão iso-lateral; corrige assimetrias

PULL — costas/ombro post./bíceps (quinta)

Exercício	Séries	Reps	Alvo / observação
High Row	4	8–12	Costas na horizontal; puxe com os cotovelos
Front Pulldown	3	8–12	Puxada vertical; latíssimo
Low Row	3	10–12	Aperte as escápulas 1 s
Face Pull	3	15–20	Deltoide posterior e saúde do ombro
Scott	3	10–12	Bíceps; sem balançar, desça controlado
Martelo	3	10–12	Bíceps/braquial, pegada neutra

UPPER — corpo superior completo (sábado)			
Exercício	Séries	Reps	Alvo / observação
Incline Chest Press	3	8–12	Peitoral superior
High Row	3	8–12	Remada alta apoiada
Shoulder Press	3	8–12	Deltoide anterior
Front Pulldown	3	8–12	Puxada frontal; latíssimo
Elevação Lateral	3	12–20	Deltoide lateral
Scott	3	10–12	Bíceps
Pushdown	3	10–12	Tríceps; cotovelos fixos

05 Como progredir — periodização de 12 semanas

O bloco é dividido em três fases de 4 semanas (a última com deload). A ideia é entrar com margem e ir acumulando intensidade: mais séries e mais perto da falha à medida que o corpo se adapta. Assim você progride de forma sustentável e chega ao fim recuperado — pronto para reavaliar e começar o próximo bloco mais forte.

Fase	Semanas	RIR alvo	Volume	Faixa de reps	Objetivo
1. Fundação	1–4	2–3	≈10–12 séries/músculo	8–12	Técnica, base e capacidade de trabalho
2. Intensificação	5–8	1–2	≈13–15 séries/músculo	6–8 + 10–15	+1 série nos principais; introduzir carga pesada nos compostos
3. Pico	9–11	0–1	≈14–16 séries/músculo	6–15	Máxima intensidade; 1 técnica avançada por músculo (drop/rest-pause)
Deload	12	3–4	–40 a 50% do volume	8–12	Recuperar, dissipar fadiga e reavaliar composição

Método de progressão — dupla progressão (o motor do plano):

- Comece na base da faixa de reps com o RIR da fase. Ex.: 3×8 no Incline com 2 reps na reserva.
- A cada semana, tente **somar repetições** mantendo a carga, até bater o topo da faixa em todas as séries.
- Quando conseguir o topo em todas as séries no RIR alvo, **aumente a carga** ~2–5% e volte à base da faixa.
- Registre **carga por série** no app Project Titan e acompanhe o gráfico de evolução — a curva subindo ao longo das semanas é a prova de que a sobrecarga progressiva está acontecendo.

06 Cardio e condicionamento

No seu contexto, cardio não é para 'queimar' e sim para ampliar o gasto e a saúde metabólica sem prejudicar o ganho de força. A regra é separar dos treinos pesados e não exagerar em endurance de alta intensidade (para minimizar o efeito de interferência).

- **Futebol (quarta, à noite):** mantenha. Ele já é um HIIT natural — ótimo para condicionamento, sensibilidade à insulina e gasto calórico. Conta como o seu trabalho intenso da semana.
- **Zona 2 (2× por semana, 30–45 min):** bike ou caminhada em ritmo confortável (dá para conversar). Encaixe na sexta e/ou domingo, ou após a musculação. Melhora recuperação e queima gordura como combustível.

- **Passos / NEAT (diário):** mire 8–10 mil passos. É uma das maiores alavancas contra a gordura central e quase não gera fadiga.
- **Evite** adicionar corrida intensa/longa além do futebol — mais que isso começa a competir com a recuperação das pernas.

Cardio em casa — bike de spinning. A bike nova é ideal justamente para o trabalho de Zona 2 (que apoia a perda de gordura sem prejudicar o músculo). Com a tirzepatida em jogo, priorize baixa intensidade: mais Zona 2, pouco HIIT — o futebol já é o seu trabalho intenso da semana.

Sessão	Duração	Como fazer	Quando
Zona 2 (base)	30–45 min	Ritmo confortável, dá para conversar (RPE 3–4/10). Cadência 80–90 rpm, resistência leve-moderada.	Sexta e domingo (base). Uso principal.
Regenerativo	15–20 min	Bem leve (RPE 2–3), só para circular sangue e ajudar a recuperação.	Opcional, em dias de perna dolorida ou após treino superior.
Intervalado (HIIT)	20–25 min	5 min aquecer + 8–10× (30 s forte RPE 8–9 / 90 s leve) + 5 min soltar.	No máx. 1×/semana e opcional. Nunca véspera/dia seguinte de perna ou futebol.

07 Nutrição de apoio

O treino constrói o estímulo; a comida decide o resultado. Para recomposição perto da manutenção, a prioridade é proteína alta e um déficit pequeno e paciente.

Atenção redobrada com a tirzepatida

Como o medicamento reduz o apetite, o erro mais provável agora é **comer proteína de menos sem perceber**. Trate a proteína como um **piso diário**, não uma meta: bata os ~155–190 g todos os dias, mesmo sem fome, distribuídos em porções menores (protein pacing) — mais fácil de atingir com apetite baixo. E não aprofunde o déficit: o remédio já corta calorias; empilhar muito cardio + comer pouco é justamente o que faz perder músculo.

Alavanca	Alvo para você (85 kg)	Como aplicar
Proteína	~1,8–2,2 g/kg/dia ≈ 155–190 g/dia	Distribua em 4 refeições de ~35–45 g. Aos 42 anos, dose por refeição importa (resistência anabólica).
Calorias	Perto da manutenção; déficit leve	Ritmo de perda de ~0,25–0,5% do peso/semana (~0,2–0,4 kg). Mais lento = mais músculo preservado.
Carboidrato	Prioridade peri-treino	Concentre em torno da musculação e do futebol para sustentar performance e recuperação.
Creatina	3–5 g/dia	Monohidratada, todo dia (inclusive de descanso). Suplemento mais bem documentado para força e massa; seguro.
Sono	7–9 h/noite	Menos que 7 h desloca a perda de peso para a massa magra e piora a fome. É "treino invisível".
Álcool / fibra	Álcool baixo · fibra alta	Controlar álcool e priorizar fibra/proteína aumentam saciedade e ajudam justamente na gordura central.

Observação: você já tem acompanhamento com o Dr. Daniel Nascimento. Estes alvos são pontos de referência da literatura — ajuste os detalhes de dieta com ele, que conhece seus exames e sua rotina.

08 Acompanhamento e metas realistas

Meça poucas coisas, mas com constância. O que não é medido não é gerenciado — e a recomposição é lenta o bastante para enganar o olho no dia a dia.

- **Toda semana:** peso em jejum, mesma hora, e use a **média semanal** (não o número de um dia).
- **A cada 2 semanas:** foto (frente/lado/costas) e medida de cintura e abdômen — muitas vezes a fita se move quando a balança trava.
- **No app Project Titan:** carga por série a cada treino; a evolução do gráfico é o seu principal indicador de progresso muscular.
- **Na semana 12:** refaça a avaliação de dobras/perímetros com o Dr. Daniel para fechar o bloco com dados.

Indicador	Hoje (08/06)	Meta em 12 semanas*
% Gordura	26,8%	~22–24%
Cintura	90,5 cm	~86–87 cm
Massa magra	62,3 kg	manter ou +0,5–1,5 kg
Cargas (app)	referência atual	PRs subindo em todos os padrões

*Estimativas conservadoras e realistas para recomposição. Os **16% de gordura** são uma meta de médio prazo (provavelmente 2 blocos como este). O caminho aqui não é 'ir com tudo' — é sustentar por 12 semanas e reavaliar. Consistência > intensidade heroica.

09 Referências

- Morton RW, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6):376–384.
- Longland TM, et al. (2016). Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss. *American Journal of Clinical Nutrition*, 103(3):738–746.
- Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass. *Journal of Sports Sciences*, 35(11):1073–1082.
- Schoenfeld BJ, et al. (2016). Effects of resistance training frequency on measures of muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 46(11):1689–1697.
- Barakat C, et al. (2020). Body recomposition: can trained individuals build muscle and lose fat at the same time? *Strength and Conditioning Journal*, 42(5):7–21.
- Jastreboff AM, et al. (2022). Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity (SURMOUNT-1). *New England Journal of Medicine*, 387(3):205–216. — perda de peso com composição corporal (~fração de massa magra).
- Evidência emergente (2025) indica que treino de resistência + ingestão adequada de proteína reduzem de forma marcante a perda de massa magra durante terapia com agonistas de GLP-1/GIP.

Material de caráter educativo, construído a partir da sua avaliação antropométrica. Não substitui a orientação individual de médico, nutricionista ou educador físico responsável.