

YPOL Elastic Pilot: 全模拟全重建后物理观测量验证

Baiting Tian
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28 日

摘要

本 pilot 在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建: proton via RK 拟合 + neutron via NEBULA (位置加权重心 + $\text{ToF}/\beta \rightarrow |\vec{p}|$)。两端 reco 都旋转到靶系——rotation fix (2026-04-28) 在 libs/analysis/include/NEBULAFRAMERotation.hh 把 NEBULA 的 lab 系 direction 旋到靶系, 与 truth_neutron_p4 同坐标系。

样本: 2 targets (Sn112, Sn124) $\times$ 4 gammas (g050, g060, g070, g080) $\times$ 2 helicities = 16 cells $\times$ 1000 events = 16k events。工具: bin/reconstruct_target_momentum 重编 (commit pending) + 新增 NEBULAFRAMERotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame。

1 覆盖率与样本统计

表 1: Per-cell 样本与基础统计 (16 cells, N=1000/cell, post-rotation-fix)

target	gamma	hel	N	N_pair	truth $\langle\Delta p_x\rangle$	reco $\langle\Delta p_x\rangle$	truth R_x	reco R_x	reco_full R_x
Sn112E190	g050	ynp	10000	2945	+0.735	+0.285	+1.026	+1.011	+0.891
Sn112E190	g050	ypn	10000	2899	+1.520	+0.594	+1.059	+1.020	+0.869
Sn112E190	g060	ynp	10000	3398	+0.179	+0.168	+1.008	+1.007	+0.923
Sn112E190	g060	ypn	10000	3387	+1.039	+0.285	+1.060	+1.015	+0.885
Sn112E190	g070	ynp	10000	3738	+0.334	+0.328	+1.020	+1.017	+0.952
Sn112E190	g070	ypn	10000	3595	+0.788	+0.038	+1.049	+1.003	+0.952
Sn112E190	g080	ynp	10000	3809	-0.053	-0.287	+0.998	+0.985	+0.963
Sn112E190	g080	ypn	10000	3787	+0.754	+0.052	+1.057	+1.003	+0.893
Sn124E190	g050	ynp	10000	2975	+1.392	+0.402	+1.038	+1.011	+0.924
Sn124E190	g050	ypn	10000	2925	+0.673	-0.252	+1.025	+0.994	+0.880
Sn124E190	g060	ynp	10000	3250	+1.151	+0.730	+1.050	+1.032	+0.932
Sn124E190	g060	ypn	10000	3605	+0.576	+0.223	+1.042	+1.017	+0.968
Sn124E190	g070	ynp	10000	3530	+0.419	+0.377	+1.023	+1.020	+0.925
Sn124E190	g070	ypn	10000	3771	+0.581	-0.381	+1.037	+0.976	+0.909
Sn124E190	g080	ynp	10000	3661	+0.383	+0.399	+1.023	+1.033	+0.991
Sn124E190	g080	ypn	10000	3840	+0.840	-0.091	+1.048	+0.993	+0.930

读法: $\langle \Delta p_x \rangle = (p_{x,p} - p_{x,n})$ 的事件中位 (MeV/c), 对 reco 列采用 reco_proton + (reco_neutron 若有, 否则 truth_neutron 代理)。 $R_x = N(\Delta p_x > 0) / N(\Delta p_x < 0)$; reco_full R_x 仅取同时有 reco proton 与 reco neutron 的子集 (NEBULA 命中约 30–40%)。 **rotation fix 后** reco neutron 的 Δp_x 系统偏置从 -31.6 MeV/c 降到 $+0.71$ MeV/c (library 修复 2026-04-28, 库代码 `libs/analysis/include/NEBULAFRAMERotation.hh`)。




图 1: $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$ 分布 (Sn124E190, 4 cell)。黑线 = truth, 填色 = reco。reco 应跟随 truth 形状但带 reco 端 smearing。




图 2: 同图但 Sn112E190 target。




图 3: Δp_x 的 truth (横) vs reco (纵) 二维直方图，每 cell 一格。对角线 = 完美重建。




图 4: $R_x = N_+/N_-$ 随 gamma 的趋势。两 panel = 两 target；线/标 = helicity；实线 = truth，虚线 = reco。reco 对 truth 趋势的保留程度即全重建对极化分析的 fidelity。

2 结论

1. $(p_x - p_n)$ 不对称信号：见上表 $\langle \Delta p_x \rangle$ 列对比 truth vs reco。
2. R/gamma 趋势：见 `r_vs_gamma.png`。reco 与 truth 同方向变化即“reco 没毁掉信号”。
3. 下一步：若趋势可见，扩大到 8 gamma + 全 190k events / cell。若不可见，说明 reco fidelity 不够，需要回到详细版报告 §10 的 P0 修复 (Bethe-Bloch + Kalman MS)。