
Wigner $d^{1/2}$ ¤¤ (cos(θ/2), ± sin(θ/2))
$d^{1/2}_{m'm}(\theta)$
θ
$d^{1/2}_{+0.5,+0.5}$
$d^{1/2}_{+0.5,-0.5}$
$d^{1/2}_{-0.5,+0.5}$
$d^{1/2}_{-0.5,-0.5}$


Wigner d^{1} ¤¤ (9 ¤¤¤)
$d^{1}_{m'm}(\theta)$
θ
$d^{1}_{+1,+1}$
$d^{1}_{+0,+1}$
$d^{1}_{-1,+1}$
$d^{1}_{+1,+0}$
$d^{1}_{+0,+0}$
$d^{1}_{-1,+0}$
$d^{1}_{+1,-1}$
$d^{1}_{+0,-1}$
$d^{1}_{-1,-1}$


$\int d^{j_1}_{1,0} d^{j_2}_{1,0} \sin\theta\, d\theta$ vs $\frac{2}{2j+1}\delta_{j_1 j_2}$
j_1
j_2
+0.667
+0.000
-0.000
-0.000
+0.000
+0.400
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
+0.286
+0.000
-0.000
-0.000
+0.000
+0.222


¤¤¤¤¤ φ ¤¤ (θ = 1.05)
Re S/|S|
φ
Δλ = 0 Re/|S|
Δλ = 1 Re/|S|
Δλ = 2 Re/|S|
cos(Δλ φ)